

RETINITIS AUTOINMUNE EXPERIMENTAL

Hugo N. Charnpredonde

RESUMEN: 1. - Se logra la producción de RAE mediante la aplicación de la técnica apropiada. 2. Se estudian los aspectos histopatológicos consecuentes al proceso que desencadena la administración de una emulsión de retina de bovino con adyuvante de Freund completo 3. La administración del material inmunógeno (retina heteróloga más adyuvante de Freund completo) repetida, origina una retinitis demostrable histológica y clínicamente; esta última por la hiperreflexia palpebral, buftalmía, exoftalmia y congestión de los capilares de la retina. **Veterinaria 4 (2,3)/5 (1,2,3): 33-39, 1972/3**

EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE RETINITIS

SUMMARY: 1.-It was obtained the production of EIR by means of adequate method. 2 - After the process was desencadenated by the administration of bovine retina emulsified in Freund's adjuvant, the histopathological features were studied.. 3 Repeated administration of immunogenic material, originate a retinitis which could be histological and clinically demonstrated; the last, manifested by palpebral hyperreflexia, buphthalmia and congestion of the retine capillary blood - vessels. **Veterinaria 4 (2,3)/5 (1,2,3): 33-39, 1972/3**