LA ATROFIA DEL SECTOR POSTERIOR Y LA SOLUCIÓN MÁS PREDECIBLE. E.P.S.

MANCUSO, PABLO; DALESSANDRO JOSÉ; ESCOBAR, JUAN; JACOD, JUAN;
MARINELLI, MARIANO. GRUPO. R.O.I.
Facultad de Odontología. U.N.L.P

Introducción: La colocación de implantes en el sector posterior del maxilar superior puede verse limitada, en primer lugar, por el descenso del seno maxilar que resulta en pérdida posterior del hueso alveolar, por la pérdida de las piezas dentarias y, en segundo lugar, por las características cuantitativas y cualitativas óseas propias de esta zona. Numerosos tratamientos han emergido en los últimos cincuenta años para corregir parcialmente esta dificultad, pero desde los años ochenta surge la elevación de piso de seno maxilar (E.P.S.) como una alternativa quirúrgica predecible para mejorar las condiciones de la zona receptora del implante. **Descripción del caso:** paciente masculino, adulto, sin particularidades en su H.C., concurre a la consulta para solucionar su edentulismo bilateral postero-superior. (1.5 al 1.8 y 2.5 al 2.8) Al análisis clínico el mismo porta una prótesis removible de cromo-cobalto, sujeta en forma deficiente por dos ball- attach en las piezas 1.4 y 2.4. El Diagnóstico radiográfico revela una pérdida de hueso basal, que reduce las posibilidades de la colocación de implantes y la rehabilitación con coronas fijas sobre los mismos, ya que en algunos sectores llega a los 2 mm. Se decide realizar la Técnica de Elevación de Piso de Seno Maxilar y colocación diferida de cuatro implantes, dos en cada maxilar. **Conclusiones:** Actualmente la E.P.S. se ha convertido en el procedimiento de elección preimplantar más solicitada por profesionales, a la hora de mejorar las condiciones de la zona receptora del implante en zona posterior superior.