

47

**DISPOSICIÓN DEL ORIFICIO PALATINO POSTERIOR EN CRÁNEOS HUMANOS DENTADOS ADULTOS.**

AUTORES: IRIGOYEN, S.; ABILLEIRA, E.; SEGATTO, R.; BUSTAMANTE, C.;  
MANCUSO, P.; DELOCCA, S.; FINGERMAN, G; MAZZEO, D.  
FOLP. (UNLP.).50 e/1 y 115

El orificio palatino posterior es considerado la terminación del conducto homónimo que se origina en el vértice de la fosa ptérigomaxilar y cuyos elementos anatómicos alcanzan la bóveda palatina para dar irrigación e inervación sensitiva a su mucosa. Los avances en la profesión odontológica en relación a técnicas anestésicas e implantología oral, y la evolución en el desarrollo del cráneo desde los clásicos anatomistas hasta nuestros días hacen relevante un estudio exhaustivo de la ubicación del orificio, acorde a los tiempos modernos.

Los objetivos fueron determinar la ubicación del orificio inferior del conducto palatino posterior en cráneos humanos dentados adultos. Establecer si existen diferencias significativas según el lado. Se realizó el análisis sobre cráneos humanos adultos dentados secos, obtenidos de la osteoteca de la Facultad de Odontología U.N.L.P. se utilizaron para la muestra 100 (cien) unidades experimentales, considerando a cada hemicráneo dentado como una unidad experimental. Para las mediciones se emplearon calibres milimetrados. Los datos se volcaron en tablas de registro para su posterior análisis estadístico. Los resultados parciales obtenidos se analizaron teniendo en cuenta diferentes accidentes anatómicos, en forma global y por lado. Se observaron diferencias significativas en las mediciones realizadas.