

21

CARACTERIZACION DE UNA SERIE DE CARCINOMAS A CELULAS ESCAMOSAS.

AUTORES: MICINQUEVICH S.; CASARIEGO Z.; DORATI P.; GOMEZ M. FOLP. (UNLP.).50 e/1 y 115

INTRODUCCIÓN: el carcinoma a células escamosas oral constituye una patología de suma importancia en estomatología. Reconoce una etiología multifactorial. entre los factores asociados al cáncer bucal figuran entre otros el tabaco, el alcohol, la nutrición, radiación, virus, etc. entre los últimos hay evidencias a nivel epidemiológico y experimental del rol del virus papiloma humano (HPV).

OBJETIVO: caracterizar una serie de carcinomas escamosos en sus aspectos clínicos y su asociación con HPV.

MATERIALES Y MÉTODOS: se analizaron muestras de CCE con diagnóstico confirmado (16) extrayendo de los protocolos datos referentes a edad, sexo, localización y grados de diferenciación. Se aplicó la técnica de PCR con dos pares de cebadores: My05/My11 como externos y Gp5/gp6 como internos. para la tipificación se utilizó la técnica PCR-Lis-SSCP. las lecturas se hicieron en minigeles.

RESULTADOS: el 68 % de los casos corresponden a hombres. la edad media fue de 58,1, con extremos entre 34 y 77. la localización fue: lengua (2); encía (3), reborde alveolar (3); labio (3); piso de boca (2); carrillo (2) y paladar (2). El 68% mostró positivo para HPV; resultando el tipo prevalente el 16 (54%), siguiendo el 11 (27%).La distribución de grados de diferenciación fue: grado I (5); grado II (5); grado III (2); grado I-II (4).

CONCLUSION: la caracterización clínica de la serie es coincidente con otros datos bibliográficos. la positividad al HPV resulto significativa. El tipo viral prevalente fue el 16.