

32

**MALOCCLUSIONES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN  
COMUNIDADES DE BAJOS RECURSOS.**

AUTORES: BLOTTO B.; CAPRARO C.; CAPRARO E.; MASTRANCIOLI MA.;  
MATTANO, C.  
FOLP. (UNLP.). - 50 e/1 y 115

Las maloclusiones son habitualmente variaciones clínicas significativas de la fluctuación normal del crecimiento y morfología de los maxilares. Los sitios etiológicos primarios de las maloclusiones son el esqueleto craneofacial, la dentición, la musculatura y otros tejidos blandos del sistema masticatorio.

Las causas de las maloclusiones son los hábitos lesivos, enfermedades nasofaríngeas, la caries dental y hábitos alimenticios.

Objetivos:

Estudiar las maloclusiones en niños y adolescentes pertenecientes a comunidades de bajos recursos.

Determinar la patología predominante en las comunidades seleccionadas. Se seleccionaron 50 niños y adolescentes de ambos sexos comprendidos en un rango de edad entre los 4 y 13 años, que concurren a los lugares de trabajo de la Asignatura Odontología Preventiva y Social.

Se confeccionaron Historias Clínicas donde se detallaron antecedentes de hábitos lesivos y alimenticios, desde temprana edad; odontograma y anexos Ad - Hoc, donde se consideraron las maloclusiones; confección de modelos e iconografías; tratamiento Interceptivo básico. Educación para la salud, control periódico y tabulación de resultados. Sobre un total de 50 pacientes, resultaron un 58% de sexo femenino y un 42 % de sexo masculino. Con respecto a las maloclusiones: apiñamiento dentario superior 8%, apiñamiento dentario inferior 20%, diastemas 14%, mordida abierta anterior 8%, mordida cruzada unilateral 6%, mordida invertida 4%, persistencia de dientes temporarios 10%, protrusión del maxilar superior 8%, sobremordida profunda 8% y succión digital 14%.