

LISTA ACTUALIZADA DE LAS

AVES

DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES



**Lista actualizada de las aves de la
provincia de Buenos Aires**

- ¹ Sección Ornitología, División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo U.N.L.P.
- ² División Ornitología (Adscripto), Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” y Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

C. A. Darrieu¹, A. R. Camperi¹(†), G. Piloni² y N. Bogado¹

Lista actualizada de las aves de la provincia de Buenos Aires

F H N
FUNDACIÓN
DE HISTORIA NATURAL
FÉLIX DE AZARA

 *Universidad Maimónides*

VAZQUEZ MAZZINI  EDITORES

Fundación de Historia Natural Félix de Azara
Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas
CEBBAD - Instituto Superior de Investigaciones
Universidad Maimónides
Hidalgo 775 - 7 piso (1405BDB),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Teléfonos: 011 - 4905-1100 (int. 1228)
E -mail: secretaria@fundacionazara.org.ar
Página web: www.fundacionazara.org.ar

Diseño y producción gráfica

José Luis Vázquez, Fernando Vázquez Mazzini, Cristina Zavatarelli

Dibujos

Natalia Bogado

Reservados los derechos para todos los países. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste electrónico, químico, mecánico, electro-óptico, grabación, fotocopia, CD Rom, Internet, o cualquier otro, sin la previa autorización escrita por parte de la Editorial. Este trabajo refleja exclusivamente las opiniones profesionales y científicas de los autores y no es responsabilidad de la Editorial el contenido de la presente obra.

Primera edición 2013

Impreso en Argentina

Se terminó de imprimir en el mes de _____ de _____, en _____ - Ciudad de Buenos Aires

Vazquez Mazzini Editores

Tel./Fax: (54-11) 4905-1232

info@vmeditores.com.ar

www.vmeditores.com.ar

Lista actualizada de las aves de la provincia de Buenos Aires /

Carlos A. Darrieu ... [et.al.]. - 1a ed. - Buenos Aires : Fundación de Historia Natural Félix de Azara, 2013.

56 p. : il. ; 23x16 cm.

ISBN 978-987-29251-1-6

1. Ciencias Naturales. 2. Aves. I. Darrieu, Carlos A.
CDD 598.098 212

INTRODUCCIÓN

La avifauna es uno de los componentes de la diversidad biológica más conspicuo e importante de los ecosistemas terrestres (pastizales, bosques), acuáticos continentales (lagunas, ríos) y marinos costeros. Al mismo tiempo es un grupo heterogéneo en relación a las características biológicas de las especies y a su sensibilidad o respuesta frente a las distintas acciones humanas.

Ciertos factores afectan la conservación de numerosas especies de aves de la provincia. Uno de los problemas más graves es el originado por la destrucción de los ambientes naturales. Por ejemplo el pastizal pampeano ha sufrido profundas modificaciones, debido a la actividad agropecuaria. A partir de fines del siglo XIX comenzó una gran transformación de los mismos, ocasionada fundamentalmente por la cría extensiva de ganado. La vegetación original del pastizal fue sustituida parcialmente por pastos cortos debido a la acción conjunta del fuego, del pastoreo y del arado; esto produjo modificaciones en la presencia y el número de aves ligadas a ese hábitat.

El territorio bonaerense cuenta con numerosos cuerpos de agua, con alta bioproductividad y una avifauna acuática muy rica y variada. Entre las familias mejor representadas se encuentran Anatidae (patos, cisnes), Ra-

llidae (gallaretas, gallinetas, burritos), Podicipedidae (macaes) y Ardeidae (garzas). Estos ambientes están afectados fundamentalmente por la contaminación proveniente de desagües industriales o cloacales, y por el uso de pesticidas en áreas perimetrales a estos cuerpos de agua. La aplicación de plaguicidas incide negativamente en el ciclo reproductivo de varias especies. Las presas contaminadas con plaguicidas que ingieren las aves, incorporan tóxicos que se van acumulando en el organismo de éstas, produciendo efectos nocivos (infertilidad, debilitamiento de la cáscara del huevo, inviabilidad del embrión) o, en casos extremos, la muerte. Un ejemplo del impacto producido por los plaguicidas es el del Aguilucho Langostero (*Buteo swainsoni*), que ha sido objeto de numerosos artículos en revistas internacionales. Esta especie de Accipitridae llega a nuestro país como migrador desde América del Norte. Por medio del anillado y otros métodos de seguimiento, se detectó una alarmante disminución en las poblaciones. La mortandad masiva de individuos se produjo en una zona aledaña a Hilario Lagos (provincia de La Pampa, Argentina), debido al consumo de tucuras contaminadas con plaguicidas. Se determinó que el total de individuos

muerdos superaba los 5000 (aunque se infirió que esta cifra representaría la cuarta parte del número real de decesos). La Pampa, el noroeste de Buenos Aires y centro-sur de Córdoba resultaron ser las áreas más críticas.

Otro factor que afecta a las poblaciones es el de la caza comercial y deportiva. La primera, dedicada a la captura de aves destinadas al mascotismo, impacta especialmente a varias especies de Passeriformes (cardenales, corbatitas, mistos, jilgueros, etc.). En cuanto a la caza deportiva, ejerce una presión selectiva sobre un número limitado de especies de importancia cinegética. Entre los grupos más perseguidos se encuentran los integrantes de la familia Tinamidae (“perdices” o inambúes, martinetas, etc.), algunas de cuyas especies, como la Colorada (*Rhynchotus rufescens*), son escasas y están protegidas. También deben mencionarse a los patos silvestres (Anatidae), que son cazados en menor medida, y al Ñandú (*Rhea americana*), especie perseguida para extraer sus plumas y su carne a lo que se le suma la progresiva destrucción de su hábitat lo cual ha producido su extinción en la provincia de Buenos Aires, quedando pequeños grupos en semicautiverio dentro de las estancias.

En la provincia de Buenos Aires existen especies autóctonas que por su numerosidad, potencial biótico y hábitos alimentarios son consideradas plaga o dañinas para la agricultura. Las de mayor importancia son el Cauquén Común (*Chloephaga picta*), la Torcaza (*Zenaida uriculata*), el Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*)

y la Cotorra (*Myiopsitta monachus*). Estas aves son combatidas empleando diversos métodos. En el caso de la Cotorra se utilizó la pulverización y el uso de biocidas, que afectaron por igual a muchas otras especies no perjudiciales.

Un factor negativo que debe afrontar la avifauna bonaerense es la competencia con especies introducidas por el hombre, las cuales en su mayoría poseen gran plasticidad adaptativa y alto potencial biótico. Como ejemplos más representativos pueden mencionarse a la Paloma Doméstica (*Columba livia*) y al Gorrión (*Passer domesticus*). Entre las especies más recientemente introducidas podemos citar al Estornino Crestado (*Acridotheres cristatellus*) y al Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*). Este último ha incrementado notablemente sus poblaciones y su área de distribución en la República Argentina (Peris, 2006).

Durante la última década tuvo lugar un marcado incremento de observaciones de campo y publicaciones sobre las aves de la Argentina, lo cual nos ha impulsado a realizar una versión actualizada de la “Nueva lista de aves de la provincia de Buenos Aires” de Darrieu y Camperi (2001).

Siguiendo el esquema del trabajo anterior, se incluyen sólo las especies de aves que conforman la avifauna de Buenos Aires, es decir aquellas que nidifican o pasan gran parte del año en la citada provincia. Las accidentales, ocasionales o que poseen un régimen de vida pelagial y llegan a las costas bonaerenses en forma esporádica, se mencionan en el Apéndice.

Para indicar la distribución geográfica se siguió el esquema propuesto por Ringuelet y Arámburu (1957), en el cual se divide a la provincia en cuatro áreas: 1) avifauna de tipo subtropical, 2) avifauna pampeana con ingesión de especies de la Provincia Chaqueña (Distrito Occidental), 4) especies que llegan por el sur desde la Provincia del Monte (Distrito Meridional) y la Provincia Patagónica (Distrito Oriental) y 3) de transición, con aporte de especies de las otras zonas.

En el caso de que, a partir de una cita posterior a la lista de 2001, una especie haya expandido su distribución a un área nueva o con registros muy antiguos, se menciona la cita correspondiente con localidad incluida.

Para el ordenamiento sistemático, la nomenclatura científica y los

nombres vulgares en inglés se siguió a Remsen *et al.* (2012). Para los nombres vulgares en español se siguió a Navas *et al.* (1995). Se incluye además una lista de las especies exóticas naturalizadas.

También se actualiza la categorización de las especies según su riesgo de extinción de acuerdo a los nuevos criterios aportados por López-Lanús *et al.* (2008), quienes renovaron la calificación de las especies de la avifauna argentina, que llevaba 25 años sin modificaciones y que, por lo tanto, no reflejaba los profundos cambios ocurridos en la situación ambiental del país. Las categorías son las siguientes: (EC) (en peligro crítico), (EN) (en peligro), (AM) (amenazada), (VU) (vulnerable), (NA) (no amenazada) e (IC) (insuficientemente conocida).

LISTA ACTUALIZADA DE LAS AVES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Orden STRUTHIONIFORMES



Familia RHEIDAE

Rhea americana (AM)

Ñandú – Greater Rhea

Toda la provincia, en semicautividad

Orden TINAMIFORMES



Familia TINAMIDAE

Rhynchotus rufescens (NA)

Colorada – Red-winged Tinamou

Toda la provincia

Nothoprocta cinerascens (NA)

Inambú Montaraz – Brushland

Tinamou

Área 4. Escasos registros en 2

Nothura darwinii (NA)

Inambú Pálido – Darwin's Nothura

Área 4. Escasos registros en 2 y 3

Nothura maculosa (NA)

Inambú Común – Spotted Nothura

Toda la provincia

Eudromia elegans (VU)

Martineta Común – Elegant Crested-

Tinamou

Áreas 2, 3 y 4. Escasos registros en 1

Orden ANSERIFORMES



Familia ANATIDAE

***Dendrocygna bicolor* (NA)**
Sirirí Colorado – Fulvous Whistling-Duck
Áreas 1, 2 y 3

***Dendrocygna viduata* (NA)**
Sirirí Pampa – White-faced Whistling-Duck
Áreas 1, 2 y 3

***Cygnus melancoryphus* (NA)**
Cisne Cuello Negro – Black-necked Swan
Toda la provincia

***Coscoroba coscoroba* (NA)**
Coscoroba – Coscoroba Swan
Toda la provincia

Familia ANHIMIDAE

***Chauna torquata* (NA)**
Chajá – Southern Screamer
Áreas 1, 2 y 3. Escasos registros en norte de 4

***Chloephaga picta* (VU)**
Cauquén Común – Upland Goose
Área 4, sur de 2 y 3. Escasos registros en 1 (Dieguez Urrutia y Alvez 2003: Uribelarrea) – Visitante invernal

***Chloephaga poliocephala* (AM)**
Cauquén Real – Ashy-headed Goose
Área 3. Escasos registros en áreas 1, 2 y norte de 4 – Visitante invernal

***Chloephaga rubidiceps* (EC)**
Cauquén Colorado – Ruddy-headed Goose
Sur de área 3. Escasos registros en norte de 4 – Visitante invernal

***Callonetta leucophrys* (NA)**
Pato de Collar – Ringed Teal
Área 1. Escasos registros en 2 y 3

***Amazonetta brasiliensis* (NA)**
Pato Cutirí – Brazilian Teal
Área 1. Escasos registros en 2 y 3

***Anas sibilatrix* (NA)**
Pato Overo – Chiloe Wigeon
Toda la provincia

***Anas flavirostris* (NA)**
Pato Barcino – Yellow-billed Teal
Toda la provincia

***Anas georgica* (NA)**
Pato Maicero – Yellow-billed Pintail
Toda la provincia

Anas bahamensis (NA)
Pato Gargantilla – White-cheeked
Pintail
Toda la provincia

Anas versicolor (NA)
Pato Capuchino – Silver Teal
Áreas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4

Anas cyanoptera (NA)
Pato Colorado – Cinnamon Teal
Toda la provincia

Anas platalea (NA)
Pato Cuchara – Red Shoveler
Toda la provincia

Netta peposaca (NA)
Pato Picazo – Rosy-billed Pochard
Áreas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4

Heteronetta atricapilla (NA)
Pato Cabeza Negra – Black-headed
Duck
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4

Nomonyx dominicus (NA)
Pato Fierro – Masked Duck
Área 1

Oxyura vittata (NA)
Pato Zambullidor Chico – Lake Duck
Áreas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4

Orden GALLIFORMES



Familia CRACIDAE

Penelope obscura (AM)
Pava de Monte Común – Dusky-
legged Guan
Escasos registros en el norte del área 1

Orden PODICIPEDIFORMES



Familia PODICIPEDIDAE

Rollandia rolland (NA)
Macá Común – White-tufted Grebe
Toda la provincia

Podilymbus podiceps (NA)
Macá Pico Grueso – Pied-billed
Grebe
Áreas 1 y 3. Escasos registros en
2 y 4

Podiceps major (NA)
Macá Grande – Great Grebe
Toda la provincia

Podiceps occipitalis (NA)
Macá Plateado – Silvery Grebe
Toda la provincia

Orden PHOENICOPTERIFORMES



Familia PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus chilensis (NA)
Flamenco Austral – Chilean Flamingo
Toda la provincia

Orden CICONIIFORMES



Familia CICONIIDAE

Ciconia maguari (NA)
Cigüeña Americana – Maguari Stork
Áreas 1, 2 y 3. Escasos registros en el norte de 4.

Mycteria americana (NA)
Tuyuyú – Wood Stork
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2

Orden SULIFORMES



Familia PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax brasilianus (NA)
Biguá – Neotropic Cormorant
Toda la provincia



Familia ANHINGIDAE

Anhinga anhinga (NA)

Aninga – Anhinga

Área 1

Orden PELECANIFORMES



Nycticorax nycticorax (NA)

Garza Bruja – Black-crowned Night-Heron

Áreas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4

Butorides striata (NA)

Garcita Azulada – Striated Heron

Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4

Bubulcus ibis (NA)

Garcita Bueyera – Cattle Egret

Toda la provincia

Familia ARDEIDAE

Tigrisoma lineatum (NA)

Hocó Colorado – Rufescent Tiger-Heron

Área 1

Botaurus pinnatus (NA)

Mirasol Grande – Pinnated Bittern

Área 1. Escasos registros en 3

Ixobrychus involucris (NA)

Mirasol Común – Stripe-backed Bittern

Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4

Ardea cocoi (NA)

Garza Mora – Cocoi Heron

Áreas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2

Ardea alba (NA)

Garza Blanca – Great Egret

Toda la provincia

Syrigma sibilatrix (NA)

Chiflón – Whistling Heron

Áreas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4

Egretta thula (NA)

Garcita Blanca – Snowy Egret

Toda la provincia

Familia
THRESKIORNITHIDAE



***Plegadis chihi* (NA)**
Cuervillo de Cañada – White-faced Ibis
Áreas 1, 2, 3 y norte de la 4

***Phimosus infuscatus* (NA)**
Cuervillo Cara Pelada – Bare-faced Ibis
Área 1. Escasos registros en 3

***Theristicus melanopis* (NA)**
Bandurria Austral – Black-faced Ibis
Toda la provincia – Visitante invernal

***Platalea ajaja* (NA)**
Espátula Rosada – Roseate Spoonbill
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4

Orden CATHARTIFORMES



Familia CATHARTIDAE

***Cathartes aura* (NA)**
Jote Cabeza Colorada – Turkey Vulture
Escasos registros en toda la provincia

***Coragyps atratus* (NA)**
Jote Cabeza Negra – Black Vulture
Escasos registros en toda la provincia

Orden ACCIPITRIFORMES



Familia ACCIPITRIDAE

***Elanus leucurus* (NA)**
Milano Blanco – White-tailed Kite
Toda la provincia

***Rostrhamus sociabilis* (NA)**
Caracolero – Snail Kite
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2

***Circus cinereus* (NA)**
Gavilán Ceniciento – Cinereous Harrier
Áreas 1, 3, 4 y sur de la 2

***Circus buffoni* (NA)**
Gavilán Planeador – Long-winged
Harrier
Toda la provincia

***Accipiter striatus* (NA)**
Esparvero Común – Sharp-shinned
Hawk
Escasos registros en áreas 1, 2 y 3
(Olveira 2001: Mar del Plata; Josens
2011: Laguna La Brava)

***Buteogallus coronatus* (EN)**
Águila Coronada – Crowned Eagle
Escasos registros en sudoeste de área
3 (Chebez 2008: Sistema de Ventania,
Pdo. Tornquist), sur de 2 (De Lucca
y Morici 2012: Bordenave, Paraje
Montelauquen, Pdo. Puán) y 4 (De
Lucca y Morici 2012: márgenes del
Río Colorado, Pdo. Villarino)

***Rupornis magnirostris* (NA)**
Taguató Común – Roadside Hawk
Áreas 1, 2 y 3

***Parabuteo unicinctus* (NA)**
Gavilán Mixto – Harris's Hawk
Área 1. Escasos registros en 3 y 4

***Geranoaetus albicaudatus* (NA)**
Aguilucho Alas Largas – White-tailed
Hawk
Área 1. Escasos registros en 2, 3 y 4

***Geranoaetus polyosoma* (NA)**
Aguilucho Común – Variable Hawk
Área 1. Escasos registros en 2, 3 y 4

***Geranoaetus melanoleucus* (NA)**
Águila Mora – Black-chested Buz-
zard-Eagle
Toda la provincia

***Buteo swainsoni* (VU)**
Aguilucho Langostero – Swainson's
Hawk
Áreas 1, 2, 3 y norte de 4 – Visitante
estival

Orden GRUIFORMES



Familia ARAMIDAE

***Aramus guarauna* (NA)**
Carau – Limpkin
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4

Familia RALLIDAE

***Coturnicops notatus* (IC)**
Burrito Enano – Speckled Rail
Escasos registros en áreas 1 y 3



***Aramides ypecaha* (NA)**
Ipacaá – Giant Wood-Rail
Área 1

***Aramides cajaneus* (NA)**
Chiricote – Gray-necked Wood-Rail
Área 1

***Laterallus melanophaius* (NA)**
Burrito Común – Rufous-sided Crake
Área 1

***Laterallus leucopyrrhus* (NA)**
Burrito Colorado – Red-and-white
Crake
Área 1

***Porzana flaviventer* (NA)**
Burrito Amarillo – Yellow-breasted
Crake
Escasos registros en áreas 1 y 3

***Porzana spiloptera* (VU)**
Burrito Negruzco – Dot-winged
Crake
Escasos registros en áreas 1, 2 y 3

***Porzana albicollis* (NA)**
Burrito Grande – Ash-throated Crake
Escasos registros en área 1

***Pardirallus maculatus* (NA)**
Gallineta Overa – Spotted Rail
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2

***Pardirallus sanguinolentus* (NA)**
Gallineta Común – Plumbeous Rail
Toda la provincia

***Gallinula galeata* (NA)**
Pollona Negra – Common Gallinule
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2
(Petracci 2004: Tornquist)

***Gallinula melanops* (NA)**
Pollona Pintada – Spot-flanked
Gallinule
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

***Porphyrio martinicus* (NA)**
Pollona Azul – Purple Gallinule
Área 1 (Petracci 2004: Ensenada;
Bodrati 2006: Vuelta de Obligado).
Escasos registros en 2 (Roesler 2003:
General Villegas)

***Fulica armillata* (NA)**
Gallareta Ligas Rojas – Red-gartered
Coot
Toda la provincia

***Fulica rufifrons* (NA)**
Gallareta Escudete Rojo – Red-fronted
Coot
Áreas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4

***Fulica leucoptera* (NA)**
Gallareta Chica – White-winged Coot
Toda la provincia

Orden CHARADRIIFORMES



Familia CHARADRIIDAE

***Vanellus chilensis* (NA)**
Tero Común – Southern Lapwing
Toda la provincia

***Pluvialis dominica* (NA)**

Chorlo Pampa – American Golden-Plover

Áreas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4 – Visitante estival

***Pluvialis squatarola* (NA)**

Chorlo Artico – Black-bellied Plover

Áreas 3 y 4 (Delhey 2001: Monte Hermoso) – Visitante estival

***Charadrius semipalmatus* (NA)**

Chorlito Palmado – Semipalmated Plover

Escasos registros en área 1, 4 y costa atlántica de 3 – Visitante estival



Familia

RECURVIROSTRIDAE

***Himantopus mexicanus* (NA)**

Tero-real – Black-necked Stilt

Toda la provincia

***Charadrius collaris* (NA)**

Chorlito de Collar – Collared Plover

Áreas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2

***Charadrius falklandicus* (NA)**

Chorlito Doble Collar – Two-banded Plover

Áreas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2

***Charadrius modestus* (VU)**

Chorlito Pecho Canela – Rufous-chested Dotterel

Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4 – Visitante invernal

***Oreopholus ruficollis* (NA)**

Chorlo Cabezón – Tawny-throated Dotterel

Toda la provincia – Visitante invernal

Familia

HAEMATOPODIDAE

***Haematopus palliatus* (NA)**

Ostrero Común – American

Oystercatcher

Costa atlántica de área 3. Escasos registros en 4





Familia CHIONIDAE

Chionis albus (VU)

Paloma-antártica – Snowy Sheathbill
Costa atlántica de área 3. Escasos registros en 4 – Visitante invernal

Familia SCOLOPACIDAE

Gallinago paraguaiiae (NA)

Becasina Común – South American Snipe
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4

Limosa haemastica (NA)

Becasa de Mar – Hudsonian Godwit
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4 – Visitante estival

Numenius phaeopus (NA)

Playero Trinador – Whimbrel
Escasos registros en áreas 1, 3 y 4 (Petracci 2004: Bahía Blanca) – Visitante estival

Bartramia longicauda (VU)

Batitú – Upland Sandpiper
Área 1. Escasos registros en 2, 3 y 4 – Visitante estival

Actitis macularius (NA)

Playerito Manchado – Spotted Sandpiper
Escasos registros en áreas 1 y 3 – Visitante estival

Tringa melanoleuca (NA)

Pitotoy Grande – Greater Yellowlegs
Toda la provincia – Visitante estival



Tringa flavipes (NA)

Pitotoy Chico – Lesser Yellowlegs
Toda la provincia – Visitante estival

Tringa solitaria (NA)

Pitotoy Solitario – Solitary Sandpiper
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4 – Visitante estival

Arenaria interpres (NA)

Vuelvepiedras – Ruddy Turnstone
Área 3. Escasos registros en 4 y 2 (Roesler 2001b: Laguna Hinojo Chico, Pdo. de Trenque Lauquen) – Visitante estival

Calidris canutus (EN)

Playero Rojizo – Red Knot
Costa atlántica de área 3. Escasos registros en costa atlántica de 1 y 4 – Visitante estival

***Calidris alba* (NA)**

Playerito Blanco – Sanderling
Costa atlántica de área 3. Escasos registros en 1 y 4 (Petracci y Delhey 2005: Bahía Blanca) – Visitante estival

***Calidris fuscicollis* (NA)**

Playerito Rabadilla Blanca – White-rumped Sandpiper
Áreas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2 – Visitante estival

***Calidris bairdii* (NA)**

Playerito Unicolor – Baird’s Sandpiper
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 4 y 2 (Roesler 2001a: Pdo. de General Villegas; Maugeri 2002b: Laguna Epecuén) – Visitante estival

***Calidris melanotos* (NA)**

Playerito Pectoral – Pectoral Sandpiper
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4 (Delhey 2001: Balneario Sauce Grande, Pdo. de Monte Hermoso) – Visitante estival



Familia JACANIDAE

***Jacana jacana* (NA)**

Jacana – Wattled Jacana
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4

***Calidris himantopus* (NA)**

Playerito Zancudo – Stilt Sandpiper
Área 1. Escasos registros en 3 y 4 (Delhey 2001: Laguna Chasicó; Petracci 2004: Monte Hermoso) – Visitante estival

***Tryngites subruficollis* (AM)**

Playerito Canela – Buff-breasted Sandpiper
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 4 (Delhey 2001: General Cerri; Coconier 2005, Di Giacomo 2005: Reserva de Uso Múltiple Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde) – Visitante estival

***Phalaropus tricolor* (NA)**

Falaropo Común – Wilson’s Phalarope
Áreas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2 – Visitante estival

Familia THINOCORIDAE

***Thinocorus rumicivorus* (NA)**

Agachona Chica – Least Seedsnipe
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4 – Visitante invernial





Familia ROSTRATULIDAE

Nycticryphes semicollaris (NA)
 Aguatero – South American Painted-snipe
 Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2

Familia STERCORARIIDAE

Stercorarius chilensis (NA)
 Escúa Común – Chilean Skua
 Escasos registros en costa atlántica de área 3 – Visitante invernal

Stercorarius parasiticus (NA)
 Salteador Chico – Parasitic Jaeger
 Costa atlántica de área 3. Escasos registros en 4 – Visitante estival



Familia LARIDAE

Chroicocephalus maculipennis (NA)
 Gaviota Capucho Café – Brown-hooded Gull
 Toda la provincia

Chroicocephalus cirrocephalus (NA)
 Gaviota Capucho Gris – Gray-hooded Gull
 Áreas 1, 3 y norte de 4. Escasos registros en 2

Larus atlanticus (AM)
 Gaviota Cangrejera – Olrog's Gull
 Costa atlántica en áreas 1, 3 y 4

Larus dominicanus (NA)
 Gaviota Cocinera – Kelp Gull
 Toda la provincia

Gelochelidon nilotica (NA)
 Gaviotín Pico Grueso – Gull-billed Tern
 Área 4. Escasos registros en 1, 2 y 3

Sterna hirundo (NA)
 Gaviotín Golondrina – Common Tern
 Costa atlántica de área 3 – Visitante estival

Sterna hirundinacea (NA)
 Gaviotín Sudamericano – South American Tern
 Costa atlántica de áreas 3 y 4. Escasos registros en 1

***Sterna trudeaui* (NA)**

Gaviotín Lagunero – Snowy-crowned Tern
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4

***Thalasseus sandvicensis* (NA)**

Gaviotín Pico Amarillo – Sandwich Tern
Costa atlántica de área 4. Escasos registros en costa atlántica de 3



***Thalasseus maximus* (NA)**

Gaviotín Real – Royal Tern
Costa atlántica de área 4. Escasos registros en 1 (costa del Río de la Plata) y costa atlántica de 3

Familia RYNCHOPIDAE

***Rynchops niger* (NA)**

Rayador – Black Skimmer
Costa del Río de la Plata y costa atlántica en áreas 1, 3 y norte de 4

Orden COLUMBIFORMES



Familia COLUMBIDAE

***Columbina talpacoti* (NA)**

Torcacita Colorada – Ruddy Ground-Dove
Escasos registros en el norte de área 1 y sur de 2 (Bruno y Morici 2009: Bordenave)

***Columbina picui* (NA)**

Torcacita Común – Picui Ground-Dove
Toda la provincia

Columba livia

Paloma Doméstica – Rock Pigeon
Toda la provincia – **Especie introducida**

***Patagioenas picazuro* (NA)**

Paloma Picazuro – Picazuro Pigeon
Toda la provincia

***Patagioenas maculosa* (NA)**

Paloma Manchada – Spot-winged Pigeon
Áreas 1, 2 y 4. Escasos registros en 3

***Zenaida auriculata* (NA)**

Torcaza – Eared Dove
Toda la provincia

***Leptotila verreauxi* (NA)**

Yerutí Común – White-tipped Dove
Áreas 1 y 3

Orden CUCULIFORMES



Familia CUCULIDAE

***Coccyua cinerea* (NA)**
Cuclillo Chico – Ash-colored Cuckoo
Áreas 1 y 4 – Visitante estival

***Piaya cayana* (NA)**
Tingazú – Squirrel Cuckoo
Área 1

***Coccyzus melacoryphus* (NA)**
Cuclillo Canela – Dark-billed Cuckoo
Área 1. Escasos registros en 2, 3 y 4
– Visitante estival

***Guira guira* (NA)**
Pirincho – Guira Cuckoo
Toda la provincia

***Tapera naevia* (NA)**
Crespín – Striped Cuckoo
Área 1 – Residente estival

Orden STRIGIFORMES



Familia STRIGIDAE

***Megascops choliba* (NA)**
Alilicucu Común – Tropical Screech-Owl
Área 1

***Bubo virginianus* (NA)**
Ñacurutú – Great Horned Owl
Área 1. Escasos registros en 2, 3 y 4

***Glaucidium brasilianum* (NA)**
Caburé Chico – Ferruginous Pygmy-Owl
Área 1

Familia TYTONIDAE

***Tyto alba* (NA)**
Lechuza-de-campanario – Barn Owl
Áreas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4



***Glaucidium nana* (NA)**
Caburé Austral – Austral Pygmy-Owl
Escasos registros en área 4

Athene cucularia (NA)
Lechucita Vizcachera – Burrowing Owl
Toda la provincia

Pseudoscops clamator (NA)
Lechuzón Orejudo – Striped Owl
Áreas 1, 2 (Roesler 2003: Carlos Tejedor) y 3 (Ferrero 2001: Mar

Chiquita; Leveau y Leveau 2001: Villa Cacique, Pdo. de Benito Juárez; Doiny Cabré 2006; Doiny Cabré y Lejarraga 2007: Sierra de la Ventana)

Asio flammeus (NA)
Lechuzón de Campo – Short-eared Owl
Toda la provincia

Orden CAPRIMULGIFORMES



Familia CAPRIMULGIDAE

Chordeiles nacunda (NA)
Ñacundá – Nacunda Nighthawk
Área 1. Escasos registros en 3 y 2 (Roesler 2001a: Pdo. de General Villegas) – Residente estival

Chordeiles minor (NA)
Añapero Boreal – Common Nighthawk
Escasos registros en áreas 1, 3, 4 y 2 (Maugeri 2002b: Carhué) – Visitante estival

Caprimulgus longirostris (NA)
Atajacaminos Ñañarca – Band-winged Nightjar
Área 1. Escasos registros en 2, 3 y 4 - Residente estival

Caprimulgus parvulus (NA)
Atajacaminos Chico – Little Nightjar
Área 1. Escasos registros en 2 y 3 - Residente estival

Hydropsalis torquata (NA)
Atajacaminos Tijera Común – Scissor-tailed Nightjar
Área 1. Escasos registros en 2, 3 y 4 - Residente estival

Orden APODIFORMES



Familia TROCHILIDAE

Chlorostilbon lucidus (NA)
Picaflor Común – Glittering-bellied Emerald
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4

Leucochloris albicollis (NA)
Picaflor Garganta Blanca – White-throated Hummingbird
Áreas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2
(Carrizo 2001: Saavedra)

Hylocharis chrysura (NA)
Picaflor Bronceado – Gilded Hummingbird
Área 1. Escasos registros en 3

Orden CORACIIFORMES



Familia ALCEDINIDAE

Megaceryle torquata (NA)
Martín Pescador Grande – Ringed Kingfisher
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2

Chloroceryle amazona (NA)
Martín Pescador Mediano – Amazon Kingfisher
Área 1. Escasos registros en 3 y 2
(Roesler 2003: General Villegas)

Chloroceryle americana (NA)
Martín Pescador Chico – Green Kingfisher
Área 1. Escasos registros en 2 y 3

Orden PICIFORMES



Familia PICIDAE

Picumnus cirratus (NA)
Carpinterito Común – White-barred Piculet
Escasos registros en el norte de área 1

Veniliornis mixtus (NA)
Carpintero Bataráz Chico – Checkered Woodpecker
Áreas 1 y 4. Escasos registros en 3 (Savigny 2002: Laguna de los Padres)

Colaptes melanochloros (NA)
Carpintero Real – Green-barred Woodpecker
Toda la provincia

Colaptes campestris (NA)
Carpintero Campestre – Campo Flicker
Toda la provincia

Orden FALCONIFORMES



Familia FALCONIDAE

Spizaeryx circumcincta (VU)

Halconcito Gris – Spot-winged Falconet

Área 4. Escasos registros en 1, 2 y 3 (Leveau y Leveau 2003: Villa Cacique, Pdo. de Benito Juárez; Sánchez y Savigny 2005: Mar Chiquita)

Caracara plancus (NA)

Carancho – Southern Caracara
Toda la provincia

Milvago chimango (NA)

Chimango – Chimango Caracara
Toda la provincia

Falco sparverius (NA)

Halconcito Colorado – American Kestrel
Toda la provincia

Falco femoralis (NA)

Halcón Plomizo – Aplomado Falcon
Toda la provincia

Falco peregrinus (NA)

Halcón Peregrino – Peregrine Falcon
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4

Orden PSITTACIFORMES



Familia PSITTACIDAE

Aratinga acuticaudata (NA)

Calancate Común – Blue-crowned Parakeet

Escasos registros en áreas 2, 4 y 3 (Jaramillo 2000: Punta Rasa)

Aratinga leucophthalma (NA)

Calancate Ala Roja – White-eyed Parakeet
Área 1

Nandayus nenday (AM)

Ñanday – Nanday Parakeet
Área 1. Escasos registros en 3 (Savigny 2002: Colinas Verdes, Pdo. de General Pueyrredón)

Cyanoliseus patagonus (NA)

Loro Barranquero – Burrowing Parakeet
Áreas 3 y 4. Escasos registros en 1 y 2

Pyrrhura frontalis (NA)

Chiripepé Cabeza Verde – Maroon-bellied Parakeet
Escasos registros en área 1

Myiopsitta monachus (NA)

Cotorra – Monk Parakeet
Toda la provincia

Orden PASSERIFORMES



Familia THAMNOPHILIDAE

Thamnophilus ruficapillus (NA)
Choca Corona Rojiza – Rufous-capped Antwren
Área 1

Thamnophilus caerulescens (NA)
Choca Común – Variable Antwren
Área 1

Familia RHINOCRYPTIDAE

Rhinocrypta lanceolata (NA)
Gallito Copetón – Crested Gallito
Área 4. Escasos registros en 2



Drymornis bridgesii (NA)
Chincherro Grande – Scimitar-billed Woodcreeper
Escasos registros en áreas 1 y 4

Lepidocolaptes angustirostris (NA)
Chincherro Chico – Narrow-billed Woodcreeper
Área 1. Escasos registros en 2, 3 y 4



Familia FURNARIIDAE

Geositta cunicularia (NA)
Caminera Común – Common Miner
Toda la provincia

Tarphonomus certhioides (NA)
Bandurrita Chaqueña – Chaco Earthcreeper
Escasos registros en áreas 1, 4 y 2
(Roesler 2001a: Pdo. de General Villegas; Maugeri 2002b: Carhué)

Furnarius rufus (NA)
Hornero – Rufous Hornero
Toda la provincia

***Phleocryptes melanops* (NA)**
Junquero – Wren-like Rushbird
Áreas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4

***Upucerthia dumetaria* (NA)**
Bandurrita Común – Scale-throated
Earthcreeper
Área 4. Escasos registros en 1, 2 y 3

***Limnornis curvirostris* (VU)**
Pajonalera Pico Curvo – Curve-billed
Reedhaunter
Área 1

***Cinclodes fuscus* (NA)**
Remolinera Común – Buff-winged
Cinclodes
Toda la provincia

***Syndactyla rufosuperciliata* (NA)**
Ticotico Común – Buff-browed Fo-
liage-gleaner
Área 1

***Leptasthenura platensis* (NA)**
Coludito Copetón – Tufted Tit-
Spinetail
Áreas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2

***Leptasthenura aegithaloides* (NA)**
Coludito Cola Negra – Plain-mantled
Tit-Spinetail
Área 4. Escasos registros en 1,
2 (Maugeri 2002a: Carhué; Di
Giácomo 2005: Sierras Australes de
Buenos Aires) y 3 (Di Giácomo 2005:
Sierras Australes de Buenos Aires)

***Phacellodomus sibilatrix* (NA)**
Espinero Chico – Little Thornbird
Área 1

***Phacellodomus striaticollis* (NA)**
Espinero Pecho Manchado – Freckle-
breasted Thornbird
Áreas 1 y 3. Escasos registros en el
norte de 4

***Phacellodomus ruber* (NA)**
Espinero Grande – Greater Thornbird
Escasos registros en área 1

***Anumbius annumbi* (NA)**
Leñatero – Firewood-gatherer
Toda la provincia

***Coryphistera alaudina* (NA)**
Crestudo – Lark-like Brushrunner
Norte de área 4. Escasos registros en 1

***Asthenes baeri* (NA)**
Canastero Chaqueño – Short-billed
Canastero
Áreas 1 y 4. Escasos registros en 2 y 3

***Asthenes hudsoni* (VU)**
Espartillero Pampeano – Hudson's
Canastero
Áreas 1, 2 y 3

***Asthenes modesta* (NA)**
Canastero Pálido – Cordilleran
Canastero
Escasos registros en áreas 4 y 3
(Di Giácomo 2005, Doiny Cabré y
Lejarraga 2007: Sierra de la Ventana)

***Asthenes pyrrholeuca* (NA)**
Canastero Coludo – Sharp-billed
Canastero
Áreas 1 y 4. Escasos registros en 3 y
2 (Maugeri 2002a: Carhué)

***Limnornis rectirostris* (AM)**
Pajonalera Pico Recto – Straight-
billed Reedhaunter
Escasos registros en área 1

***Cranioleuca sulphurifera* (NA)**
Curutié Ocráceo – Sulphur-throated
Spinetail
Áreas 1 y 3

***Cranioleuca pyrrhophia* (NA)**
Curutié Blanco – Stripe-crowned
Spinetail
Áreas 1 y 4. Escasos registros en 2
(Maugeri 2002a: Carhué)

***Pseudasthenes patagonica* (NA)**
Canastero Patagónico – Patagonian
Canastero
Escasos registros en área 4

***Spartonoica maluroides* (VU)**
Espartillero Enano – Bay-capped
Wren-Spinetail
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2
y 4

***Pseudoseisura lophotes* (NA)**
Cacholote Castaño – Brown
Cacholote
Áreas 1 y 4. Escasos registros en 2

***Pseudoseisura gutturalis* (VU)**
Cacholote Pardo – White-throated
Cacholote
Área 4. Escasos registros en 2 (Di



Familia TYRANNIDAE

***Elaenia spectabilis* (NA)**
Fiofio Grande – Large Elaenia
Área 1 – Residente estival

***Elaenia albiceps* (NA)**
Fiofio Silbón – White-crested Elaenia
Escasos registros en áreas 1, 3, 4 y 2
(Maugeri 2002b: Carhué)

Giácomo 2005: Sierras Australes de
Buenos Aires) y 3 (Di Giácomo 2005:
Sierras Australes de Buenos Aires)

***Schoeniophylax phryganophilus* (NA)**
Chotoy – Chotoy Spinetail
Área 1

***Certhiaxis cinnamomeus* (NA)**
Curutié Colorado – Yellow-chinned
Spinetail
Área 1

***Synallaxis frontalis* (NA)**
Pijuí Frente Gris – Sooty-fronted
Spinetail
Área 1

***Synallaxis albescens* (NA)**
Pijuí Cola Parda – Pale-breasted
Spinetail
Áreas 1, 2 y 4. Escasos registros en 3

***Synallaxis spixi* (NA)**
Pijuí Plomizo – Spix's Spinetail
Área 1

***Elaenia parvirostris* (NA)**
Fiofio Pico Corto – Small-billed
Elaenia
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 4
(Petracci 2004: Monte Hermoso) –
Residente estival

***Camptostoma obsoletum* (NA)**
Piojito Silbón – Southern Beardless-
Tyrannulet
Escasos registros en área 1 y 3
(Jaramillo 2000: San Clemente del
Tuyú)

***Suiriri suiriri* (NA)**
Suiriri Común – Suiriri Flycatcher
Área 1. Escasos registros en 3 y 4

***Anairetes parulus* (NA)**

Cachudito Pico Negro – Tufted Tit-Tyrant

Área 4. Escasos registros en 3

***Serpophaga nigricans* (NA)**

Piojito Gris – Sooty Tyrannulet

Áreas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2

***Serpophaga subcristata* (NA)**

Piojito Común – White-crested Tyrannulet

Toda la provincia

***Serpophaga griseicapilla* (NA)**

Piojito Trinador – Straneck's

Tyrannulet

Escasos registros en áreas 4 y 1 (Bodrati 2006: Vuelta de Obligado)

***Polystictus pectoralis* (VU)**

Tachurí Canela – Bearded Tachurí

Escasos registros en toda la provincia – Residente estival

***Pseudocolopteryx sclateri* (NA)**

Doradito Copetón – Crested Doradito

Área 1. Escasos registros en 2

(Roesler 2001a: Pdo. de General

Villegas; Di Giácomo 2005: Laguna

de Pradere) y 3 (Coconier 2005:

Cuenca del Río Salado; Lowen 2009:

Rincón de Cobo)

***Pseudocolopteryx flaviventris* (NA)**

Doradito Común – Warbling

Doradito

Áreas 1 y 3. Escasos registros en

2 y 4

***Euscarthmus meloryphus* (NA)**

Barullero – Tawny-crowned Pygmy-

Tyrant

Área 1 – Residente estival

***Stigmatura budytoides* (NA)**

Calandrita – Greater Wagtail-Tyrant

Área 4

***Phylloscartes ventralis* (NA)**

Mosqueta Común – Mottle-cheeked

Tyrannulet

Área 1

***Sublegatus modestus* (NA)**

Suirirí Pico Corto – Southern Scrub-Flycatcher

Escasos registros en áreas 1, 3 y 4 – Residente estival

***Tachuris rubrigastra* (NA)**

Tachurí Sietecolores – Many-colored

Rush Tyrant

Áreas 1 y 3. Escasos registros en

2 y 4

***Hemitriccus margaritaceiventer* (NA)**

Mosqueta Ojo Dorado – Pearly-

vented Tody-Tyrant

Escasos registros en área 1

***Myiophobus fasciatus* (NA)**

Mosqueta Estriada – Bran-colored Flycatcher

Área 1. Escasos registros en áreas

3 y 2 (Maugeri 2002b: Carhué) –

Residente estival

***Lathrotriccus euleri* (NA)**

Mosqueta Parda – Euler's Flycatcher

Área 1 – Residente estival

***Pyrocephalus rubinus* (NA)**

Churrinche – Vermilion Flycatcher

Toda la provincia – Residente estival

***Lessonia rufa* (NA)**

Sobrepuesto Común – Austral Negrito

Toda la provincia – Visitante invern

***Knipolegus hudsoni* (VU)**

Viudita Chica – Hudson's Black-Tyrant
Área 4 – Residente estival

***Knipolegus cyanirostris* (NA)**

Viudita Pico Celeste – Blue-billed Black-Tyrant
Área 1 – Residente estival

***Knipolegus aterrimus* (NA)**

Viudita Común – White-winged Black-Tyrant
Escasos registros en áreas 1, 2 y 4

***Hymenops perspicillatus* (NA)**

Pico de Plata – Spectacled Tyrant
Toda la provincia

***Satrapa icterophrys* (NA)**

Suirirí Amarillo – Yellow-browed Tyrant
Áreas 1 y 3. Escasos registros en norte de 4

***Muscisaxicola maclovianus* (NA)**

Dormilona Cara Negra – Dark-faced Ground-Tyrant
Áreas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2 – Visitante invernal

***Agriornis montanus* (NA)**

Gaucho Serrano – Black-billed Shrike-Tyrant
Escasos registros en áreas 4, 3 (Chebez 2005; Doiny Cabré y Lejarraga 2007: Parque Provincial Ernesto Tornquist; Di Giácomo 2005: Sierras Australes de Buenos Aires) y 2 (Di Giácomo 2005: Sierras Australes de Buenos Aires)

***Agriornis micropterus* (NA)**

Gaucho Gris – Gray-bellied Shrike-Tyrant
Escasos registros en toda la provincia

***Agriornis murinus* (NA)**

Gaucho Chico – Lesser Shrike-Tyrant
Escasos registros en toda la provincia

***Xolmis cinereus* (NA)**

Monjita Gris – Gray Monjita
Área 1

***Xolmis coronatus* (NA)**

Monjita Coronada – Black-crowned Monjita
Área 4. En invierno se desplaza a 1 y 3

***Xolmis irupero* (NA)**

Monjita Blanca – White Monjita
Áreas 1 y 4. Escasos registros en 2 y 3

***Xolmis rubetra* (VU)**

Monjita Castaña – Rusty-backed Monjita
Escasos registros en áreas 1, 3 y 4 – Visitante invernal

***Xolmis dominicanus* (EN)**

Monjita Dominicana – Black-and-white Monjita
Escasos registros en áreas 1 y 3

***Neoxolmis rufiventris* (NA)**

Monjita Chocolate – Chocolate-vented Tyrant
Toda la provincia – Visitante invernal

***Fluvicola albiventer* (NA)**

Viudita Blanca – Black-backed Water-Tyrant
Área 1 – Residente estival

***Machetornis rixosa* (NA)**

Picabuey – Cattle Tyrant
Toda la provincia

***Pitangus sulphuratus* (NA)**

Benteveo Común – Great Kiskadee
Toda la provincia

***Myiodynastes maculatus* (NA)**

Benteveo Rayado – Streaked Flycatcher

Área 1. Escasos registros en norte de 4 y 3 (Jaramillo 2000: Punta Rasa) – Residente estival

***Empidonomus aurantioatrocristatus* (NA)**

Tuquito Gris – Crowned Slaty Flycatcher

Escasos registros en áreas 1, 4 y 2 (Roesler 2003: General Villegas) – Residente estival

***Tyrannus melancholicus* (NA)**

Suiririí Real – Tropical Kingbird
Toda la provincia – Residente estival

***Tyrannus savana* (NA)**

Tijereta – Fork-tailed Flycatcher
Toda la provincia – Residente estival

***Myiarchus swainsoni* (NA)**

Burlisto Pico Canela – Swainson's Flycatcher

Área 1. Escasos registros en 2 (Morici 2009a: Paraje Monte Lauquén, Pdo. de Puán) – Residente estival

Familia COTINGIDAE

***Phytotoma rutila* (NA)**

Cortarramas – White-tipped Plant-cutter

Áreas 1 y 4. Escasos registros en 2 y 3



Familia TITYRIDAE



***Xenopsaris albinucha* (NA)**

Tijerilla – White-naped Xenopsaris
Área 1 – Residente estival

***Pachyramphus viridis* (NA)**

Anambé Verdoso – Green-backed Becard
Escasos registros en área 1

***Pachyramphus polychopterus* (NA)**

Anambé Común – White-winged Becard
Área 1. Escasos registros en 3 – Residente estival

Familia VIREONIDAE

Cyclarhis gujanensis (NA)

Juan Chiviro – Rufous-browed Peppershrike
Área 1. Escasos registros en 2
(Roesler 2001a: Pdo. de General Villegas)

Vireo olivaceus (NA)

Chiví Común – Red-eyed Vireo
Área 1. Escasos registros en 2



(Roesler 2001a: Pdo. de General Villegas) – Residente estival

Familia HIRUNDINIDAE



Pygochelidon cyanoleuca (NA)

Golondrina Barranquera – Blue-and-white Swallow
Áreas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2

Alopochelidon fucata (NA)

Golondrina Cabeza Rojiza - Tawny-headed Swallow
Área 1. Escasos registros en 4, 2
(Maugeri 2002b: Laguna Epecuén) y 3 (Savigny 2002: Mar Chiquita)

Progne tapera (NA)

Golondrina Parda – Brown-chested Martin
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4 – Residente estival

Progne chalybea (NA)

Golondrina Doméstica – Gray-breasted Martin
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4 – Residente estival

Progne elegans (NA)

Golondrina Negra – Southern Martin
Áreas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2 – Residente estival

Tachycineta leucorrhoa (NA)

Golondrina Ceja Blanca – White-rumped Swallow
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4 - Residente estival

Tachycineta meyeni (NA)

Golondrina Patagónica – Chilean Swallow
Área 1. Escasos registros en 2, 3 y 4 – Residente estival (sur), visitante invernal (resto)

Riparia riparia (NA)

Golondrina Zapadora – Sand Martin
Escasos registros en áreas 1, 3, 4 y 2
(Maugeri 2002b: Laguna Epecuén) – Visitante estival

***Hirundo rustica* (NA)**

Golondrina Tijerita – Barn Swallow
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 (Morici 2009b: Darreguiera, Pdo. de Puán) y 4 (Larracochea 2012: Punta Alta, Balneario Arroyo Pareja) – Visitante estival



Familia POLIOPTILIDAE

***Polioptila dumicola* (NA)**

Tacuarita Azul – Masked Gnatcatcher
Áreas 1 y 3



Familia TURDIDAE

***Turdus falcklandii* (NA)**

Zorzal Patagónico – Austral Thrush
Áreas 4 y 3 (Chebez 2005: Parque Provincial Ernesto Tornquist; Doiny Cabré 2006: Sierra de la Ventana; Doiny Cabré y Lejarraga 2007: Cerro Ventana)

***Petrochelidon pyrrhonota* (NA)**

Golondrina Rabadilla Canela – Cliff Swallow
Áreas 1 y 3. Escasos registros en norte de 4 (Petracci y Delhey 2004: Arroyo Sauce Grande) – Visitante estival

Familia

TROGLODYTIDAE

***Troglodytes aedon* (NA)**

Ratona Común – House Wren
Toda la provincia

***Cistothorus platensis* (NA)**

Ratona Aperdizada – Sedge Wren
Escasos registros en toda la provincia



***Turdus rufiventris* (NA)**

Zorzal Colorado – Rufous-bellied Thrush
Áreas 1 y 3

***Turdus amaurochalinus* (NA)**

Zorzal Chalchalero – Creamy-bellied Thrush
Área 1. Escasos registros en 3, 4 y 2 (Roesler 2001a: Pdo. de General Villegas; Maugeri 2002a: Carhué)



Familia MIMIDAE

Mimus patagonicus (NA)
 Calandria Mora – Patagonian
 Mockingbird
 Área 4. Escasos registros en 1, 2 y 3

Familia STURNIDAE

Acridotheres cristatellus
 Estornino Crestado – Crested Myna
 Áreas 1 y 3 – **Especie introducida**

Sturnus vulgaris
 Estornino Pinto – European Starling
 Áreas 1 y 3 (Navas 2002: litoral
 atlántico desde Tigre hasta Mar de
 Ajó; Isacch e Isacch 2004: Mar del
 Plata) – **Especie introducida**



Familia MOTACILLIDAE

Anthus lutescens (NA)
 Cachirla Chica – Yellowish Pipit
 Área 1. Escasos registros en 3 y 2
 (Roesler 2001a: Pdo. de General
 Villegas)

Mimus saturninus (NA)
 Calandria Grande – Chalk-browed
 Mockingbird
 Toda la provincia

Mimus triurus (NA)
 Calandria Real – White-banded
 Mockingbird
 Toda la provincia



Anthus furcatus (NA)
 Cachirla Uña Corta – Short-billed Pipit
 Toda la provincia

Anthus chacoensis (NA)
 Cachirla Trinadora – Pampas Pipit
 Escasos registros en áreas 3 y 2
 (Roesler 2001a: Pdo. de General
 Villegas; Di Giácomo 2005: Laguna
 de Pradere)

Anthus correndera (NA)
 Cachirla Común – Correndera Pipit
 Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4

Anthus hellmayri (NA)
 Cachirla Pálida – Hellmayr’s Pipit
 Escasos registros en áreas 1 y 4



Familia THRAUPIDAE

Paroaria coronata (NA)

Cardenal Común – Red-crested Cardinal
Áreas 1 y 3

Paroaria capitata (NA)

Cardenilla – Yellow-billed Cardinal
Área 1. Escasos registros en 3
(Chimento 2012: Necochea).

Thraupis sayaca (NA)

Celestino Común – Sayaca Tanager
Área 1. Escasos registros en 2
(Roesler 2001a: Pdo. de General Villegas)

Thraupis bonariensis (NA)

Naranjero – Blue-and-yellow Tanager
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4

Stephanophorus diadematus (NA)

Frutero Azul – Diademed Tanager
Área 1. Escasos registros en 3

Phrygilus fruticeti (NA)

Yal Negro – Mourning Sierra-Finch
Área 4. Escasos registros en 3 y 1
(Camperi y Darrieu 2001a: Punta Blanca, Pdo. de Magdalena)

Phrygilus carbonarius (NA)

Yal Carbonero – Carbonated Sierra-Finch
Área 4. Escasos registros en 1

Diuca diuca (NA)

Diuca Común – Common Diuca-Finch
Área 4

Donacospiza albifrons (NA)

Cachilo Canela – Long-tailed Reed Finch
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 4
(Petracci 2004: Monte Hermoso)

Poospiza ornata (VU)

Monterita Canela – Cinnamon Warbling-Finch
Escasos registros en áreas 1, 3 y 4

Poospiza nigrorufa (NA)

Sietevestidos – Black-and-rufous Warbling-Finch
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 4

Poospiza cabanisi (NA)

Monterita Litoral – Gray-throated Warbling-Finch
Área 1. Escasos registros en 3 (Josens 2011: Laguna de los Padres, Laguna Nahuel Rucá)

Poospiza torquata (NA)

Monterita de Collar – Ringed Warbling-Finch
Área 4. Escasos registros en 1
(Camperi y Darrieu 2001b: La Plata; Calí y Aguilar 2002: Reserva Costanera Sur) y 2 (Roesler 2003: General Villegas)

Poospiza melanoleuca (NA)

Monterita Cabeza Negra – Black-capped Warbling-Finch
Área 1. Escasos registros en 4

Sicalis lebruni (NA)

Jilguero Austral - Patagonian Yellow-Finch
Escasos registros en áreas 2 (Di Giácomo 2005: Sierras Australes de

Buenos Aires) y 3 (Chebez 2005: Parque Provincial Ernesto Tornquist; Di Giacomo 2005: Sierras Australes de Buenos Aires)

***Sicalis flaveola* (NA)**

Jilguero Dorado – Saffron Finch
Toda la provincia

***Sicalis luteola* (NA)**

Misto – Grassland Yellow-Finch
Toda la provincia

***Embernagra platensis* (NA)**

Verdón – Great Pampa-Finch
Toda la provincia

***Volatinia jacarina* (NA)**

Volatinero – Blue-black Grassquit
Área 1. Escasos registros en 3 (Jaramillo 2000: Punta Rasa; Savigny 2002: Mar del Plata) y 2 (Roesler 2003: General Villegas) – Residente estival

***Sporophila collaris* (NA)**

Corbatita Dominó – Rusty-collared Seedeater
Área 1

***Sporophila caerulescens* (NA)**

Corbatita Común – Double-collared Seedeater
Áreas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4 – Residente estival



***Sporophila hypoxantha* (VU)**

Capuchino Canela – Tawny-bellied Seedeater
Escasos registros en área 1 – Residente estival

***Sporophila ruficollis* (VU)**

Capuchino Garganta Café – Dark-throated Seedeater
Escasos registros en áreas 1 y 3 – Residente estival

***Sporophila hypochroma* (EN)**

Capuchino Castaño – Rufous-rumped Seedeater
Escasos registros en área 1 (Roda y López-Lanús 2008: Meridiano Quinto, Pdo. de Saladillo)

***Catamenia analis* (NA)**

Piquitodeoro Común – Band-tailed Seedeater
Escasos registros en áreas 1 (Dieguez Urrutia y Alvez 2003: Urubelarrea) y 3 (Savigny 2003: Mar del Plata) – Residente estival

***Coryphospingus cucullatus* (NA)**

Brasita de Fuego – Red-crested Finch
Área 1. Escasos registros en 3 y 2 (Maugeri 2002b: Carhué)

***Gubernatrix cristata* (EN)**

Cardenal Amarillo – Yellow Cardinal
Áreas 1 y 4. Escasos registros en 2 y 3

INCERTAE SEDIS

***Saltator coerulescens* (NA)**

Pepitero Gris – Grayish Saltator
Área 1

***Saltator aurantiirostris* (NA)**

Pepitero de Collar – Golden-billed Saltator
Áreas 1 y 4



Familia EMBERIZIDAE

Zonotrichia capensis (NA)
Chingolo – Rufous-collared Sparrow
Toda la provincia

Ammodramus humeralis (NA)
Cachilo Ceja Amarilla – Grassland Sparrow
Áreas 1, 2 y 4. Escasos registros en 3 (Savigny 2002: Mar Chiquita; Doiñy Cabré y Lejarraga 2007: Sierra de la Ventana)

Rhynchospiza strigiceps (NA)
Cachilo Corona Castaña – Stripe-capped Sparrow
Escasos registros en área 1

Familia CARDINALIDAE

Piranga flava (NA)
Fueguero Común – Hepatic Tanager
Área 1

Cyanoloxia glaucocaerulea (VU)
Reinamora Chica – Glaucous-blue Grosbeak
Área 1 – Residente estival



Cyanocompsa brissonii (NA)
Reinamora Grande – Ultramarine Grosbeak
Área 1. Escasos registros en 3 (Chimento: Pdo. de Dolores)



Familia PARULIDAE

Parula pitaiyumi (NA)
Pitaiyumi – Tropical Parula
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 4 y 2 (Maugeri 2002b: Carhué)

Geothlypis aequinoctialis (NA)
Arañero Cara Negra – Masked Yellowthroat
Área 1. Escasos registros en 3

Basileuterus culicivorus (NA)
Arañero Coronado Chico – Golden-crowned Warbler
Área 1

Basileuterus leucoblepharus (NA)
Arañero Silbón – White-browed Warbler
Escasos registros en área 1



Familia ICTERIDAE

Cacicus solitarius (NA)

Boyero Negro – Solitary Black
Cacique
Área 1

Cacicus chrysopterus (NA)

Boyero Ala Amarilla – Golden-
winged Cacique
Área 1

Icterus pyrrhopterus (NA)

Boyerito – Variable Oriole
Área 1. Escasos registros en 3
(Fiameni 2005: Necochea; Chimento
2012: Dolores)

Amblyramphus holosericeus (VU)

Federal – Scarlet-headed Blackbird
Áreas 1 y 3

Agelasticus cyanopus (NA)

Varillero Negro – Unicolored
Blackbird
Área 1

Agelasticus thilius (NA)

Varillero Ala Amarilla – Yellow-
winged Blackbird
Toda la provincia

Chrysomus ruficapillus (NA)

Varillero Congo – Chesnut-capped
Blackbird
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2

Pseudoleistes virescens (NA)

Pecho Amarillo Común – Brown-
and-yellow Marshbird
Áreas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4

Agelaioides badius (NA)

Tordo Músico – Bay-winged
Cowbird
Toda la provincia

Molothrus rufoaxillaris (NA)

Tordo Pico Corto – Screaming
Cowbird
Toda la provincia

Molothrus bonariensis (NA)

Tordo Renegrado – Shiny Cowbird
Toda la provincia

Sturnella superciliaris (NA)

Pecho Colorado – White-browed
Blackbird
Áreas 1, 2, 3 y norte de 4

Sturnella defilippi (EN)

Loica Pampeana – Pampas
Meadowlark
Áreas 2, 3 y norte de 4. Escasos
registros en 1 (Bodrati 2001a, 2006:
Vuelta de Obligado, Pdo. de San
Pedro)

Sturnella loyca (NA)

Loica Común – Long-tailed
Meadowlark
Áreas 3 y 4. Escasos registros en 1 y 2



Familia FRINGILLIDAE

Carduelis chloris

Verderón – European Greenfinch
Área 3. Escasos registros en 2 y 4 –
Especie introducida

Carduelis carduelis

Cardelino – European Goldfinch
Escasos registros en áreas 1 y 3 –
Especie introducida

***Sporagra magellanica* (NA)**

Cabecitanegra Común – Hooded
Siskin
Toda la provincia

***Sporagra barbata* (NA)**

Cabecita Negra Austral – Black-
chinned Siskin
Escasos registros en área 4



Familia PASSERIDAE

Passer domesticus

Gorrión – House Sparrow
Toda la provincia – **Especie
introducida**

**APENDICE - ESPECIES ACCIDENTALES, OCASIONALES O QUE
LLEGAN EN FORMA ESPORÁDICA EN LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES**

Basada en Narosky y Di Giácomo (1993) y en artículos publicados con posterioridad al mencionado trabajo.

Orden STRUTHIONIFORMES

Familia RHEIDAE

Rhea pennata

Choique – Lesser Rhea
Área 4

Orden ANSERIFORMES

Familia ANATIDAE

Dendrocygna autumnalis

Sirirí Vientre Negro – Black-bellied Whistling-Duck
Escasos registros en área 1

Tachyeres patachonicus

Quetro Volador – Flying Steamer-Duck
Escasos registros en áreas 3 y 4

Lophonetta specularioides

Pato Crestón – Crested Duck
Escasos registros en áreas 3 y 4

Anas discors

Pato Media Luna – Blue-winged Teal
Escasos registros en áreas 1 y 3
(Savigny 2002: Laguna de los Padres; registros de observación en Laguna La Brava, Laguna Nahuel Rucá)

Orden PODICIPEDIFORMES

Familia PODICIPEDIDAE

Tachybaptus dominicus

Macá Gris – Least Grebe
Escasos registros en área 1

Orden PHOENICOPTERIFORMES

Familia

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicoparrus andinus

Parina Grande – Andean Flamingo
Escasos registros en área 3 (Jaramillo 2000: Punta Rasa; Di Giácomo 2005: Bahía San Borombón, Punta Rasa)

Orden SPHENISCIFORMES

Familia SPHENISCIDAE

Aptenodytes patagonicus

Pingüino Rey - King Penguin
Escasos registros en costa atlántica de área 3

Pygoscelis antarcticus

Pingüino de Barbijo – Chinstrap Penguin
Escasos registros en costa atlántica de área 3 (Bachmann 1999: entre Miramar y Mar Azul)

Spheniscus magellanicus

Pingüino Patagónico - Magellanic Penguin
Costa atlántica de área 3

Eudyptes chrysolophus

Pingüino Frente Dorada – Macaroni Penguin
Escasos registros en costa atlántica de área 3

Eudyptes chrysocome
Pingüino Penacho Amarillo –
Rockhopper Penguin
Costa atlántica de área 3

Orden PROCELLARIIFORMES

Familia DIOMEDEIDAE

Thalassarche chlororhynchos
Albatros Pico Fino – Yellow-nosed
Albatross
Escasos registros en costa atlántica de
área 3

Thalassarche melanophris
Albatros Ceja Negra - Black-browed
Albatross
Costa atlántica de área 3

Familia PROCELLARIIDAE

Macronectes giganteus
Petrel Gigante Común – Southern
Giant-Petrel
Costa atlántica de área 3 y sur de 4

Fulmarus glacialis
Petrel Plateado – Southern Fulmar
Escasos registros en costa atlántica de
área 3

Daption capense
Petrel Damero – Cape Petrel
Escasos registros en costa atlántica de
área 3

Halobaena caerulea
Petrel Azulado – Blue Petrel
Escasos registros en costa atlántica de
área 3

Pachyptila desolata
Prión Pico Grande – Antarctic Prion
Escasos registros en costa atlántica
de área 3 (Isacch y Bachmann 1997:

Miramar; Petracci 2004: entre Reta y
Claromecó).

Pachyptila belcheri
Prión Pico Fino – Slender-billed Prion
Escasos registros en costa atlántica de
área 3

Procellaria aequinoctialis
Petrel Barba Blanca – White-chinned
Petrel
Costa atlántica de área 3

Calonectris diomedea
Pardela Grande – Cory's Shearwater
Costa atlántica de área 3

Puffinus griseus
Pardela Oscura – Sooty Shearwater
Escasos registros en costa atlántica de
área 3

Puffinus gravis
Pardela Cabeza Negra – Great
Shearwater
Escasos registros en costa atlántica de
área 3

Puffinus puffinus
Pardela Boreal – Manx Shearwater
Escasos registros en costa atlántica de
área 3 y norte de 4

Puffinus assimilis
Pardela Chica – Little Shearwater
Escasos registros en costa atlántica de
área 3 (Savigny 2001b: Mar Dorado)

Familia HYDROBATIDAE

Oceanites oceanicus
Paíño Común – Wilson's Storm-
Petrel
Escasos registros en costa atlántica de
área 3 y en 4

Familia PELECANOIDIDAE

Pelecanoides urinatrix

Yunco Común – Common Diving-Petrel
Escasos registros en costa atlántica de área 3

Orden CICONIIFORMES

Familia CICONIIDAE

Jabiru mycteria

Yabirú – Jabiru
Escasos registros en áreas 1 (Doiny Cabré 2009: Arroyo Saladillo, Pdo. de 25 de Mayo), 3 (Doiny Cabré 2009: Mar Chiquita) y 4 (Doiny Cabré 2009: Establecimiento “El Monte Santa Elena”, Pdo. de Puán)

Orden SULIFORMES

Familia FREGATIDAE

Fregata magnificens

Ave Fragata – Magnificent Frigatebird
Áreas 1 y 3 (Pagano 2009: Laguna San Luis)

Familia SULIDAE

Sula leucogaster

Piquero Pardo – Brown Booby
Escasos registros en área 1 y costa atlántica de 3

Familia PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax atriceps

Cormorán Imperial – Imperial Cormorant
Escasos registros en áreas 1, 4 y costa atlántica de 3

Orden PELECANIFORMES

Familia THRESKIORNITHIDAE

Theristicus caerulescens

Bandurria Mora – Plumbeus Ibis
Escasos registros en áreas 1 y 3

Orden CATHARTIFORMES

Familia CATHARTIDAE

Sarcoramphus papa

Jote Real – King Vulture
Escasos registros en área 1

Orden ACCIPITRIFORMES

Familia PANDIONIDAE

Pandion haliaetus

Aguila Pescadora – Osprey
Escasos registros en áreas 1 y 3

Familia ACCIPITRIDAE

Elanoides forficatus

Milano Tijereta – Swallow-tailed Kite
Escasos registros en áreas 1 (Grilli y Arellano 2008: La Plata) y 2 (Roesler 2001b: General Villegas)

Ictinia plumbea

Milano Plumizo – Plumbeous Kite
Escasos registros en área 2 (Roesler 2001b: General Villegas) y 3 (Jaramillo 2000: Punta Rasa)

Geranospiza caerulescens

Gavilán Patas Largas – Crane Hawk
Escasos registros en área 1

Buteogallus meridionalis

Aguilucho Colorado – Savanna Hawk
Escasos registros en área 1

Buteogallus urubitinga

Aguila Negra – Great Black Hawk
Escasos registros en área 1

Orden CHARADRIIFORMES

Familia

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ater

Ostrero Negro – Blackish Oystercatcher
Escasos registros en áreas 3 (Savigny 2002: Mar del Plata) y 4 (Delhey 2001: Monte Hermoso)

Haematopus leucopodus

Ostrero Austral – Magellanic Oystercatcher
Escasos registros en costa atlántica de área 3

Familia PLUVIANELLIDAE

Pluvianellus socialis

Chorlito Ceniciento – Magellanic Plover
Escasos registros en áreas 4 y 3 (Ferrero 2001; Savigny 2005, Di Giacomo 2005, Coconier 2005: Reserva de Biósfera Albufera de Mar Chiquita; Lowen. 2009: Rincón de Cobo)

Familia SCOLOPACIDAE

Limnodromus griseus

Becasa Gris – Short-billed Dowitcher
Escasos registros en costa atlántica de área 3 (Jaramillo 2000: Punta Rasa)

Limnodromus scolopaceus

Becasina Boreal – Long-billed Dowitcher
Escasos registros en área 3 y norte de 4

Xenus cinereus

Playerito Pico Curvo – Terek Sandpiper
Escasos registros en área 1 y costa atlántica de 3 (Jaramillo 2000: Punta Rasa)

Tringa semipalmata

Playero Ala Blanca - Willet
Escasos registros en área 3 (Roesler. 2004: Punta Rasa, Pdo. de General Lavalle)

Calidris pusilla

Playerito Enano – Semipalmated Sandpiper
Escasos registros en costa atlántica de área 3 (Jaramillo 2000: Punta Rasa)

Phalaropus lobatus

Falaropo Pico Fino – Red-necked Phalarope
Escasos registros en costa atlántica de área 3

Familia STERCORARIIDAE

Stercorarius longicaudus

Salteador Coludo – Long-tailed Jaeger
Escasos registros en costa atlántica de área 3 (Jaramillo 2000: Punta Rasa)

Familia LARIDAE

Sternula antillarum

Gaviotín Chico Boreal – Least Tern
Escasos registros en costa atlántica de área 3 (Jaramillo 2000: Punta Rasa)

Sternula superciliaris

Gaviotín Chico Común – Yellow-billed Tern
Área 3. Escasos registros en 1

Phaetusa simplex

Atí – Large-billed Tern
Escasos registros en área 1

Chlidonias niger

Gaviotín Negro – Black Tern
Escasos registros en áreas 3 y 1 (Ferrari y Henschke 2002: San Pedro)

y Reserva Costanera Sur; Bodrati
2006: Vuelta de Obligado)

Sterna paradisaea

Gaviotín Artico - Arctic Tern
Escasos registros en área 3 (Jaramillo
2000: Punta Rasa; Chebez 2005:
Reserva Municipal Puerto de Mar del
Plata)

Sterna vittata

Gaviotín Antártico – Antarctic Tern
Área 3 (Chebez 2005: Reserva
Municipal y Sitio Ramsar Punta
Rasa; Coconier 2005: Puerto de Mar
del Plata)

Orden CUCULIFORMES

Familia CUCULIDAE

Coccyzus americanus

Cuclillo Pico Amarillo – Yellow-
billed Cuckoo
Área 1

Crotophaga major

Anó Grande – Greater Ani
Escasos registros en área 1 (Argerich
2010: Parque Natural Municipal
Rivera Norte, Pdo. de San Isidro)

Crotophaga ani

Anó Chico – Smooth-billed Ani
Escasos registros en norte de área 1

Orden CAPRIMULGIFORMES

Familia CAPRIMULGIDAE

Lurocalis semitorquatus

Añapero Castaño – Short-tailed
Nighthawk
Escasos registros en área 3 (Jaramillo
2000: Punta Rasa; Di Giácomo 2005:
Bahía San Borombón, Punta Rasa)

Orden APODIFORMES

Familia APODIDAE

Chaetura meridionalis

Vencejo de Tormenta – Sick's Swift
Escasos registros en costa atlántica de
área 3 (Jaramillo 2000: Punta Rasa)

Familia TROCHILIDAE

Florisuga fusca

Picaflor Negro – Black Jacobin
Escasos registros en área 3 (Savigny
2001a: Mar del Plata, Pdo. de la Costa)

Sephanoides sephaniodes

Picaflor Rubí – Green-backed
Firecrown
Escasos registros en áreas 2 y 3

Sappho sparganura

Picaflor Cometa – Red-tailed Comet
Escasos registros en área 1

Patagona gigas

Picaflor Gigante – Giant
Hummingbird
Escasos registros en áreas 1 y 3

Heliomaster furcifer

Picaflor de Barbijo – Blue-tufted
Starthroat
Escasos registros en área 1

Orden PICIFORMES

Familia PICIDAE

Melanerpes candidus

Carpintero Blanco – White
Woodpecker
Escasos registros en área 1

Melanerpes cactorum

Carpintero del Cardón – White-fronted Woodpecker

Escasos registros en área 1 (Maugeri y Montenegro 2002: Pdo. de Ramallo; Chimento 2009: ciudad de La Plata)

Orden PSITTACIFORMES

Familia PSITTACIDAE

Aratinga mitrata

Calancate Cara Roja – Mitred Parakeet

Escasos registros en área 1 (Chebez 2005: Parque Provincial Pereyra Iraola)

Pyrrhura molinae

Chiripepé Cabeza Parda – Green-cheeked Parakeet

Escasos registros en área 1 (Chebez 2005: Parque Provincial Pereyra Iraola)

Brotogeris chiriri

Catita Chiriri – Yellow-chevroned Parakeet

Escasos registros en área 1 (registros de observación: San Martín, mayo 2011; Parque Centenario, agosto 2011; La Plata, noviembre 2011)

Pionus maximiliani

Loro Maitaca – Scaly-headed Parrot
Escasos registros en área 1 (Chebez 2005: Parque Provincial Pereyra Iraola; Agnolin 2009: Estancia Abril, entre Florencio Varela y La Plata)

Amazona tucumana

Loro Alisero – Tucuman Parrot
Escasos registros en área 1 (Chebez 2005: Parque Provincial Pereyra Iraola)

Amazona aestiva

Loro Hablador – Turquoise-fronted Parrot

Escasos registros en área 1 (Chebez 2005: Parque Provincial Pereyra Iraola)

Orden PASSERIFORMES

Familia FURNARIIDAE

Lochmias nematura

Macuquito – Sharp-tailed Streamcreeper

Escasos registros en área 1 (Di Giacomo 2005: Reserva Natural de Uso Múltiple Martín García)

Familia TYRANNIDAE

Anairetes flavirostris

Cachudito Pico Amarillo – Yellow-billed Tit-Tyrant

Escasos registros en toda la provincia

Pseudocolopteryx acutipennis

Doradito Oliváceo – Subtropical Doradito

Escasos registros en áreas 1 (Spinuzza 2009: Vedia, Pdo. de Leandro N. Alem) y 2 (Di Giacomo 2005: Laguna de Pradere; Roesler 2009: Pdo. de General Villegas)

Contopus cinereus

Burlisto Chico – Tropical Pewee
Escasos registros en área 1 (Maceda 2002: Zelaya)

Arundinicola leucocephala

Lavandera – White-headed Marsh-Tyrant

Escasos registros en área 1 (Maugeri y Montenegro 2002: Pdo. de Ramallo)

Pitangus lictor

Benteveo Pico Fino – Lesser Kiskadee
Escasos registros en área 1

Empidonomus varius

Tuquito Rayado – Variegated
Flycatcher
Escasos registros en área 1 (Reinaudo
2003: Reserva Costanera Sur)

Tyrannus tyrannus

Suirirí Boreal – Eastern Kingbird
Escasos registros en área 1 (Maugeri
y Montenegro 2002: Pdo. de
Ramallo) y 3 (Jaramillo 2000: Punta
Rasa)

Casiornis rufus

Burlisto Castaño – Rufous Casiornis
Escasos registros en área 1

Myiarchus ferox

Burlisto Pico Negro – Short-crested
Flycatcher
Escasos registros en área 1 (Bodrati
2001: Vuelta de Obligado, Pdo. de
San Pedro)

Myiarchus tyrannulus

Burlisto Cola Castaña – Brown-
crested Flycatcher
Escasos registros en área 1

Familia CORVIDAE

Cyanocorax chrysops

Urraca Común – Plush-crested Jay
Escasos registros en área 1

Familia HIRUNDINIDAE

Pygochelidon melanoleuca

Golondrina de Collar – Black-collared
Swallow
Escasos registros en área 1

Stelgidopteryx ruficollis

Golondrina Ribereña – Southern
Rough-winged Swallow
Escasos registros en áreas 1 (Bodrati
2006: Vuelta de Obligado) y 2
(Roesler 2001a: Pdo. de General
Villegas)

Familia TURDIDAE

Turdus chiguanco

Zorzal Chiguanco – Chiguanco
Thrush
Escasos registros en área 1 (Agnolin
2009: Partido de Esteban Echeverría;
registro de observación San Antonio
de Padua, Pdo. de Merlo: junio 2007)

Turdus albicollis

Zorzal Cuello Blanco – White-necked
Thrush
Escasos registros en área 3 (Jaramillo
2000: Punta Rasa)

Familia THRAUPIDAE

Thlypopsis sordida

Tangará Gris – Orange-headed
Tanager
Escasos registros en área 1

Pyrrhocomma ruficeps

Pioró – Chesnut-headed Tanager
Escasos registros en área 1 (Di
Giácomo 2005: Reserva Natural y de
Uso Múltiple Martín García)

Tachyphonus rufus

Frutero Negro – White-lined Tanager
Área 1

Pipraeidea melanonota

Saíra de Antifaz – Fawn-breasted
Tanager
Área 1. Escasos registros en 3

Tersina viridis

Tersina – Swallow Tanager
Escasos registros en áreas 1 y 3
(Jaramillo 2000: Punta Rasa)

Haplospiza unicolor

Afrechero Plomizo – Uniform Finch
Escasos registros en área 1

Sporophila palustris

Capuchino Pecho Blanco – Marsh
Seedeater
Escasos registros en área 1 –
Residente estival

Sporophila cinnamomea

Capuchino Corona Gris – Chestnut
Seedeater
Escasos registros en área 1

INCERTAE SEDIS

Saltator similis

Pepitero Verdoso – Green-winged
Saltator
Área 1 (Bodrati 2001b: Reserva
Municipal de Ramallo, Pdo. de
Ramallo; Chebez 2005: Reserva
Municipal Vuelta de Obligado;
Bodrati y Sierra 2008: Reserva
Municipal Vuelta de Obligado,
Ramallo, San Pedro, Campana)

Saltatricula multicolor

Pepitero Chico – Many-coloured
Chaco Finch
Escasos registros en áreas 4, 3 y 1
(Bodrati 2001: Figueroa Salas, Pdo.
de Baradero; Delhey y Scorolli 2002:
Pdo. de Leandro N. Alem)

Familia EMBERIZIDAE

Rhynchospiza strigiceps

Cachilo Corona Castaña – Stripe-
capped Sparrow
Escasos registros en áreas 1 y 3

Familia PARULIDAE

Dendroica striata

Arañero Estriado – Blackpoll Warbler
Escasos registros en costa atlantica de
área 3

Parkesia noveboracensis

Arañero de Agua – Northern Water-
thrush
Escasos registros en área 1

Familia ICTERIDAE

Gnorimopsar chopi

Chopí – Chopi Blackbird
Escasos registros en área 1 (Maugeri y
Liotta 2002: Ramallo)

Dolichonyx oryzivorus

Charlatán - Bobolink
Escasos registros en área 1 (Bodrati
2001: Arroyo Espinillo, Pdo. de San
Pedro; Carrizo y Pizá 2004: Reserva
Costanera Sur, Capital Federal;
Bodrati 2006: Vuelta de Obligado) y
3 (Jaramillo 2000: Punta Rasa)

Familia FRINGILLIDAE

Sporagra atrata

Negrillo – Black Siskin
Escasos registros en el norte de área 1
(Maugeri y Liotta 2002: San Nicolás)

***Euphonia chlorotica* (NA)**

Tangará Común – Purple-throated
Euphonia
Escasos registros en el norte de área 1

Áreas de interés para la protección de la avifauna en la provincia de Buenos Aires

Litoral atlántico: posee una gran variedad de ambientes acuáticos, entre los que se incluyen numerosas islas, islotes y bancos de baja altura, lagunas y bañados de aguas salobres, extensas zonas intermareales fangosas, playas de arena, de guijarros y de limo, y hacia el sur costas con barrancas. Las características ambientales de la zona la convierten en un área de relevancia para la nidificación de numerosas especies de aves acuáticas y en una importante área de descanso e invernada para aves limícolas migratorias del Hemisferio Norte y de la Patagonia. Entre las especies marinas que se reproducen en esta zona costera se encuentran la Gaviota Cocinera (*Larus dominicanus*), la Gaviota Cangrejera (*Larus belcheri*), el Gaviotín Sudamericano (*Sterna hirundinacea*), el Gaviotín Real (*Sterna maxima*) y el Gaviotín Pico Amarillo (*Sterna sandvicensis*). El conocimiento sobre la distribución y abundancia de estas aves en la costa sur de la provincia de Buenos Aires es aún escaso, debido principalmente a las características de los ambientes costeros que dificultan la logística necesaria para efectuar censos y relevamientos.

Albufera de Mar Chiquita: ubicada a 37° 38' S, 57° 24' O, representa la única albufera activa de la República Argentina. Es un gran espejo de agua salobre conectado con el mar, cuyo nivel está sujeto a pronunciadas variaciones. El fondo está constituido prin-

cipalmente por arena y fango-arena, con algo de vegetación sedentaria. Cuando el nivel del agua es muy bajo, quedan al descubierto playas limosas de hasta 500 metros de ancho. Otros sectores poseen sedimentos de diatomeas y conchillas. Su superficie abarca 5800 hectáreas, con una longitud de 25 kilómetros y una profundidad máxima de cuatro metros. Sus aguas son más dulces en invierno, por la intensidad de las lluvias y el aporte de los arroyos. Es un ambiente propicio para aves migratorias del Hemisferio Norte, sobre todo limícolas de la familia Scolopacidae: Playero Rojizo (*Calidris canutus*), Playerito Rabadilla Blanca (*C. fuscicollis*) y Becasa de Mar (*Limosa haemastica*). La zona forma parte de la Reserva Integral Dunas del Atlántico Sur (partido de Mar Chiquita).

Serranías de Ventania: revisten un interés ornitológico especial dado que algunas aves de abolengo andino-patagónico habitan casi exclusivamente en altura, donde incluso se reproducen, como es el caso del Canastero Pálido (*Asthenes modesta*), el Gaucho Serrano (*Agriornis montana*), el Jilguero Austral (*Sicalis lebruni*) y el Piquitodeoro Común (*Catamenia analis*).

Delta e islas del Paraná: caracterizados por una alta biodiversidad, debido a la presencia relictual de selvas marginales del Dominio Amazónico, que alcanzan su límite austral en Punta

Lara (Partido de Ensenada). Especies típicas como la Pava de Monte (*Penelope obscura*), el Ticotico Común (*Syndactyla rufosuperciliata*), la Choca Común (*Thamnophilus caerulescens*), la Mosqueta Común (*Phylloscartes ventralis*) y la Monterita Litoral (*Poospiza lateralis*) están sometidas a una fuerte presión antrópica, sobre todo por el crecimiento urbano e industrial. También las zonas de pajonales y juncales se encuentran muy degradadas, lo cual influye negativamente en las poblaciones de especies como el Burrito Colorado (*Laterallus leucopyrrhus*), la Pajonalera Pico Curvo (*Limnornis curvirostris*) y la Pajonalera Pico Recto (*Limnornis rectirostris*), entre otras.

Talares: estos bosques semixerófilos del nordeste de la provincia actúan como un corredor para la fauna, permitiendo la penetración de especies del bosque chaqueño en el nordeste bonaerense, como es el caso del Espinero Chico (*Phacellodomus sibilatrix*), el Pepitero de Collar (*Saltator aurantirostris*), etc. Esta avifauna está en serio riesgo teniendo en cuenta que de la distribución original de los talares, sólo quedan relictos que siguen siendo degradados.

Depresión del río Salado: caracterizan a esta área cuerpos de agua léniticos de distinto origen, tanto dulces como salobres, representados por lagunas, bañados, cañadas, etc. Como ejemplo podemos mencionar a las lagunas de Chascomús, Monte, Lobos, Salada Grande, etc. Estos ambientes

son de real importancia para la preservación tanto de aves acuáticas que allí se reproducen y como de aves migratorias que utilizan sus playas para descanso y abastecimiento durante sus largos viajes.

Pastizal: es un ecosistema relictual y un refugio para la fauna típica de la región. Entre las aves del pastizal que se ven afectadas por la modificación de este ambiente podemos mencionar al Ñandú (*Rhea americana*), la Colorada (*Rhynchotus rufescens*), el Cauquén Colorado (*Chloephaga rubidiceps*), el Chorlo Pampa (*Pluvialis dominica*) y la Loica Pampeana (*Sturnella defilippi*). Estas y otras aves nidifican entre matas de pasto, por lo que el reemplazo de la vegetación original ha disminuido la disponibilidad de espacio para la nidificación.

Caldenal: en el sudoeste bonaerense subsisten remanentes aislados de este Distrito, que constituyen el hábitat casi exclusivo, en la provincia, del Chinchero Grande (*Drymornis bridgesii*), la Bandurrita Chaqueña (*Upucerthia certhioides*), el Crestudo (*Coryphistera alaudina*) y la Monterita de Collar (*Poospiza torquata*), entre otras especies. Dado que este ambiente se halla muy restringido, la avifauna de la zona está en serio peligro, en especial algunas poblaciones no suficientemente conocidas.

Para más detalles sobre las áreas de importancia para la conservación en la provincia de Buenos Aires ver Chebez 2005 y Di Giácomo 2005.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- Agnolin, L.F., N.R. Chimento, C. Frank y R.F. Lucero 2009. Nuevos registros de aves argentinas. Nótulas Faunísticas 2da. Serie, 34: 1-4.
- Argerich, E.C. 2010. Primer registro de Anó Grande (*Crotophaga major*) en el Parque Natural Municipal Rivera Norte, San Isidro, provincia de Buenos Aires. Nótulas Fauísticas 2da. Serie, 47: 1-3.
- Bachmann, S. 1999. Pingüino de Barbijo (*Pygoscelis antarctica*) y Pingüino Rey (*Aptenodytes patagonicus*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 40: 8.
- Bodrati, A. 2001. Notas sobre aves infrecuentes o poco conocidas para la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 13-17.
- Bodrati, A. y E. Sierra 2008. Nuevos aportes sobre la colonización austral del Pepitero Verdoso (*Saltator similis*) en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 53: 29-30.
- Bodrati, A., G. Bodrati y H. Fernández. 2001a. Notas sobre la avifauna del norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 17-21.
- Bodrati, A., E. Mérida, G. Bodrati y E. Sierra. 2006. Avifauna del talar de Vuelta de Obligado y de sus ambientes contiguos. San Pedro, provincia de Buenos Aires. En Mérida, E. y J. Athor (editores). Talaes bonaerenses y su conservación. Fundación de Historia Natural "Félix de Azara". Buenos Aires.
- Bodrati, A., C. Ferrari, E. Bordón, D. Novoa y R. Romero Huergo. 2001b. El Pepitero Verdoso (*Saltator similis*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 29.
- Bruno, F. y A. Morici 2009. Torcacita Colorada (*Columbina talpacoti*) en las provincias de La Pampa y Buenos Aires, Argentina. Xolmis 4: 17-18.
- Calí, R.D. y F. Aguilar. 2002. Monterita de collar (*Poospiza torquata*) en la Reserva Costanera Sur, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 44: 20.
- Camperi, A.R. y C.A. Darrieu. 2001a. Primera cita basada en material de colección del Yal Negro (*Phrygilus fruticeti* Kittlitz 1833) en la provincia de Buenos Aires, Argentina (Aves: Emberizidae: Emberizinae). Nuestras Aves 41: 11.
- Camperi, A.R. y C.A. Darrieu. 2001b. Ampliación de la distribución de *Poospiza torquata* (monterita de collar) en la provincia de Buenos Aires. Neotrópica 47: 90.
- Carrizo, M.A. y J. Pizá. 2004. Registro de Charlatán (*Dolichonyx oryzivorus*) en la Reserva Costanera Sur, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 48: 19.
- Carrizo, M.A., P.A. Seewald y F.R. Tizón. 2001. Notas sobre la avifauna del Partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 42: 31.
- Chebez, J.C. 2005. Guía de las reservas naturales de la Argentina: Zona centro. Editorial Albatros, Buenos Aires, 288 pp.
- Chebez, J.C., J.J. Maceda y R. Pereira Lobos. 2008. "Águila Coronada" en Chebez, J.C. Los que se van. Fauna argentina amenazada. Tomo 2: 177-186, Albatros, Buenos Aires.
- Chimento, N.R., F.L. Agnolin, R.F. Lucero y R. Obredor 2009. Nidificación del Carpintero del Cardón (*Melanerpes cactorum*) en la provincia de Buenos

- Aires. Nótulas Faunísticas 2da. Serie, 37: 1-3.
- Chimento, N.R., F.L. Agnolin, E.L. Guerrero, A.M. López y R.F. Lucero. 2012. Nuevos registros de aves y consideraciones sobre la extensión geográfica de los talaras al sur de la provincia de Buenos Aires. Nótulas Faunísticas 2da. Serie, 89: 1-12.
- Coconier, E. 2005. Reporte Final Aves Acuáticas en la Argentina. Aves Argentinas / Wetland International, 137 pp.
- Darrieu, C.A. y A.R. Camperi. 2001. Nueva lista de las aves de la provincia de Buenos Aires. COBIOBO (Comisión de Biodiversidad Bonaerense) N° 3 – PROBIOTA (Programa para el Estudio y Uso Sustentable de la Biota Austral) N° 2, 56 pp.
- De Lucca, E.R. y A. Morici. 2012. Nuevos registros del Águila Coronada (*Harpophalietus coronatus*) para la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 93: 1-5.
- Delhey, K.J.V. y A.L. Scorolli. 2002. Abundancia relativa y estatus de residencia del Pepitero Chico (*Saltatricula multicolor*) en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 17 (1): 41-44.
- Delhey, K.J.V., P.F. Petracci y C.H.F. Pérez. 2001. Observaciones de Charadriiformes en el sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 42: 14-16.
- Dieguez Urrutia, A.J. y G.J. Alvez 2003. Las aves de Uribelarrea y escuela agrotécnica Salesiana “Don Bosco”, Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Biología Neotropical 6 (9): 1-19.
- Di Giacomo, A.S., V. De Francesco y E.G. Coconier. 2005. Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Aves Argentinas. CD-Rom.
- Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Doiny Cabré, P.C. 2006. Aves nuevas o poco registradas para Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 52: 21-23.
- Doiny Cabré, C. y R. Lejarraga 2007. Aves de Sierra de la Ventana. Edición del autor, Bahía Blanca.
- Doiny Cabré, P.C., R. Lejarraga y R. Güller 2009. Registro de Yabirú (*Jabiru mycteria*) en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 54: 27-28.
- Ferrari, C. y C. Henschke 2002. Registros del Gaviotín negro (*Chlidonias niger*) en la Reserva Costanera Sur y en San Pedro, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 44: 19-20.
- Ferrero, L. 2001. Avifauna de Mar Chiquita. Pp. 227-250 en: Iribarne, O. (Ed.) Reserva de Biósfera Mar Chiquita: Características físicas, biológicas y ecológicas. Editorial Martín, Mar del Plata, 318 pp.
- Fiameni, M.A. 2005. El Boyerito (*Icterus cayanensis*) y Cardelino (*Carduelis carduelis*) en Necochea, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 50: 36.
- Grilli, P.G. y M.L. Arellano 2008. Primer registro del Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*) en la provincia de Entre Ríos y nueva observación para el nordeste de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 53: 20.
- Isacch, J. P. y S. Bachmann. 1997. Hallazgo del Prión Pico Ancho (*Pachyptila desolata*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 37: 1.
- Isacch, J.P. y J. Isacch 2004. Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en la ciudad de Mar del Plata (provincia de Buenos Aires, Argentina). Nuestras Aves 47: 33.

- Jaramillo, A.P. 2000. Punta Rasa, South America's first vagrant trap? *Cotinga* 14: 33-38.
- Larracochea, G., H. Durán y C. D'Acunto. 2012. Nidificación de la Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica*) en el Balneario Arroyo Pareja, Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 57: 18-19.
- Leveau, C. y L. Leveau. 2001. Nuevos registros de aves para Benito Juárez, Provincia de Buenos Aires (Argentina). *Nuestras Aves* 41: 30-31
- Leveau, L. y C. Leveau 2003. Registro del Halconcito Gris (*Spizapteryx circumcinctus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 45: 36.
- López-Lanús, B., P. Grilli, A.S. Di Giacomo, E.E. Coconier y R. Banchs (eds.) 2008. Categorización de las aves de la Argentina según su estado de conservación. Informe de Aves Argentinas / AOP y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 64 pp.
- Lowen, J.C., J. Mazar Barnett y M. Pearman 2009. Nueva información sobre la distribución del Chorlito Ceniciento (*Pluvianellus socialis*) y del Doradito Copetón (*Pseudocolopteryx sclateri*) en la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 54: 69-71.
- Maceda, J.J., P.Tejerina, A.R. Camperi y C.A. Darrieu. 2002 (2004). Primera cita del Burlisto Chico (*Contopus cinereus cinereus* Spix) para las provincias de La Pampa y Buenos Aires, Argentina (Aves, Tyrannidae). *Physis*, Secc. C, 60: 41-42.
- Maugeri, F.G. 2002a. Presencia invernal de Passeriformes en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Neotrópica* 48: 80-82.
- Maugeri, F.G. 2002b. Aves nuevas o poco conocidas para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 44: 16-19.
- Maugeri, F.G. y J. Liotta. 2002. Primer registro de *Carduelis atrata* (Aves: Fringillidae) y nueva cita de *Gnorimopsar chopi chopi* para la provincia de Buenos Aires (Aves: Icteridae). *Neotrópica* 48: 83-84.
- Maugeri, F.G. y M.J. Montenegro. 2002. Tres nuevas citas de aves para la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 43: 21.
- Morici, A. 2009a. Primer registro de Burlisto Pico Canela (*Myiarchus swainsoni*) en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 7-8.
- Morici, A. 2009b. Nidificación de la Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica*) en el partido de Puán, Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 35-36.
- Narosky, T. y A. G. Di Giacomo. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata – Vázquez Mazzini Editores – L.O.L.A. (Literature of Latin America).
- Navas, J.R. 2002. Las aves exóticas introducidas y naturalizadas en la Argentina. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, n.s., 4 (2): 191-202.
- Navas, J.R., T. Narosky, N.A. Bó y J.C. Chebez. 1995. Lista patrón de los nombres comunes de las aves argentinas. Asociación Ornitológica del Plata, 32 pp.
- Olveira, L. 2001. Esparvero común (*Accipiter erythronemius*) en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 41: 34.
- Pagano, L. G. 2009. Ave Fragata (*Fregata magnificens*) en el interior de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 6-7.

- Peris S., G. Soave., A. Camperi, C. Darrieu & R. Aramburu. 2006. Range expansion of the European Starling *Sturnus vulgaris* in Argentina. *Ardeola* 52 (2): 359-364.
- Petracci, P.F. y K. Delhey 2004. Nesting attempts of the Cliff Swallow *Petrochelidon pyrrhonota* in Buenos Aires Province, Argentina. *Ibis* 146: 522-525.
- Petracci, P.F. y K. Delhey 2005. Guía de las aves marinas y costeras de la ría de Bahía Blanca. Edición del autor, Bahía Blanca, 96 pp.
- Petracci, P.F., K.J.V. Delhey, C.H.F. Pérez, D. Basanta, M.V. Massola, M. Zamorano y M. Fosatti 2004. Nuevos aportes al conocimiento de la distribución y anidación de algunas especies de aves en la Argentina. *Nuestras Aves* 48: 25-31.
- Reinaudo, H. 2003. Aves nuevas o raras para la Reserva Costanera Sur, ciudad de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 45: 30.
- Remsen, J. V., Jr., C. D. Cadena, A. Jaramillo, M. Nores, J. F. Pacheco, J. Pérez-Emán, M. B. Robbins, F. G. Stiles, D. F. Stotz, and K. J. Zimmer. Version [2012]. A classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html>
- Ringuelet, R. y R. Aramburu. 1957. Enumeración sistemática de los vertebrados de la provincia de Buenos Aires. Ministerio de Asuntos Agrarios N° 119. La Plata.
- Roda, M. A. y B. López-Lanús. 2008. The range of Rufous-rumped Seedeater *Sporophila hypochroma* extends to the Pampas region of Argentina, with the first nests of the species. *Cotinga* 30: 61-62.
- Roesler, I. 2001a. Nuevas citas de aves para el partido de General Villegas, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 41: 32-33.
- Roesler, I. 2001b. Tres especies poco comunes en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 42: 30.
- Roesler, I. 2003. Observaciones de aves poco comunes en el noroeste de Buenos Aires y nordeste de La Pampa, Argentina. *Nuestras Aves* 45: 22-24.
- Roesler, I. 2009. El Doradito Oliváceo *Pseudocolopteryx acutipennis* en las pampas Argentinas: nuevos registros y comentarios sobre su historia natural. *Cotinga* 31: 1-4.
- Roesler, I., G.D. Pugnali y M. della Seta 2004. Observación del Playero Ala Blanca (*Catoptrophorus semipalmatus*) en Punta Rasa, Partido de General Lavalle, Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 48: 24-25.
- Sánchez, K.B. y C. Savigny 2005. Nuevos registros del Halconcito Gris (*Spiziateryx circumcinctus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 49: 35-36.
- Savigny, C. 2001a. Segundo registro del Picaflor Negro (*Melanotrochilus fuscus*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 41: 13.
- Savigny, C. 2001b. Pardela Chica (*Puffinus assimilis*) y Petrel Gigante Oscuro (*Macronectes halli*) en las costas continentales argentinas. *Nuestras Aves* 42: 21-22.
- Savigny, C. 2002. Registros de aves nuevas o poco comunes para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 43: 24.
- Savigny, C. 2003. Registros de Passeriformes nuevos o poco comunes para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 45: 31.

- Savigny, C., J.P. Isacch y M. Favero 2005. Reserva de Biósfera Albúfera de Mar Chiquita pp. 49-50 en: Di Giácomo, A. (Ed.) Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Spinuzza, J.M. 2009. Presencia de Doradito Oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis*) en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Nótulas Faunísticas 2da. Serie, 29: 1-3.

