





Comportamiento epidemiológico de los pacientes de PPS - SEPOI Hospital Odontológico Universitario de la Facultad de Odontología de la UNLP, período 2021.

Introducción

El estado de salud bucal de una determinada población es reflejo de la eficiencia y eficacia del sistema de salud. Los condicionantes de salud y enfermedad en una comunidad dependen de la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema de asistencia sanitaria. Los estudios epidemiológicos funcionan como una importante herramienta para definir prioridades, aportar recursos y guiar la planificación de las acciones y servicios de salud oral direccionados a una población. La caries dental y el dolor pulpar forman parte de las consultas más frecuentes en la práctica odontológica. Estas patologías tienen un gran impacto en la vida cotidiana del paciente, ya sea por su sintomatología dolorosa o por situaciones que afectan la estética y a su vez repercuten en la vida cotidiana, social o laboral de los pacientes .



Objetivos

Evaluar el comportamiento epidemiológico de los tratamientos endodónticos, quirúrgicos y restauraciones plásticas realizados en PPS – SEPOI, Hospital Odontológico Universitario de la Facultad de Odontología de la UNLP.


Metodología

- › Se realizó un estudio epidemiológico de tipo descriptivo, retrospectivo, longitudinal en la población atendida en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata Servicio de Prácticas Odontológicas Integradas PPS – SEPOI durante el ciclo comprendido febrero 2021 – diciembre 2021. El universo fue constituido por los pacientes que ingresaron al servicio con necesidad de realizar tratamientos endodóntico, quirúrgicos o restauraciones plásticas. Se observaron variables categorizadas por maxilar, sector y pieza dentaria. Como instrumento de recolección de datos se utilizó el registro único de prestaciones, historia clínica, realizado por los estudiantes del servicio validado por los docentes. De la población estudiada se obtuvo una muestra significativa de $n= 1196$ tratamientos distribuidas en 569 restauraciones 114 tratamientos endodónticos y 513 exodoncias. Criterios de inclusión: tratamientos terminados con el protocolo radiográfico debidamente documentado. Criterios de exclusión: Tratamientos en terceros molares, piezas temporarias, tratamientos iniciados sin terminar, falta de radiografías de protocolo o tratamientos deficientes. Los datos se volcaron en una planilla de cálculos, analizados mediante estadística descriptiva. Cabe destacar que el presente estudio se realizó con participación anónima y voluntaria, sin realizar registro de datos personales, para salvaguardar la estricta confidencialidad de la muestra, por lo que no existió ninguna vulneración ética al respecto.


Resultados

El porcentaje de tratamientos de restauraciones plásticas fue mayor en el maxilar superior en un 53% predominando levemente el sector anterior siendo la más frecuente la pieza N° 11 en un 7%. Los tratamientos endodónticos prevaleció el maxilar superior 68%, sector anterior 68%, siendo la pieza más frecuente la N° 12 en un 13%. En cambio, por lo evaluado en los tratamientos exodónticos si bien el mayor porcentaje se vio reflejado en el maxilar superior 56%, fue mayor en los sectores posteriores 39%, siendo la pieza más afectada la N° 36 en un 6%.


Distribución y frecuencia de Restauraciones Plásticas por maxilar PPS 2021




Distribución y frecuencia de tratamientos endodónticos por maxilar PPS 2021




Distribución y frecuencia de exodoncias por maxilar PPS 2021




Distribución y frecuencia de Restauraciones Plásticas por sector PPS 2021



Distribución y frecuencia de Tratamientos endodónticos por sector PPS 2021



Distribución y frecuencia de exodoncias por sector PPS 2021



Conclusiones

En base a los resultados podemos inferir que el maxilar superior se ve más afectado que el inferior en las tres variables medidas, el sector anterior es el más demandado por los pacientes en relación a restauraciones plásticas y tratamientos endodónticos; esa importancia en los tratamientos de las piezas dentarias del sector anterosuperior, demandada por los pacientes, se encuentra relacionada por prioridades estéticas ya que repercute en la vida cotidiana, social o laboral de los individuos. No obstante y sin dejar de atender las prioridades del paciente, se trabaja constantemente brindando Educación para la Salud y realizando los tratamientos correspondientes tanto al sector anterior como el posterior, para concientizar al paciente sobre el cuidado y tratamiento de todas las piezas dentarias.

¡Muchas gracias!

