

garrón. La pierna vacila llevándola hacia adelante y el tendón de Aquiles se encuentra entumecido y se pliega cuando el miembro toma apoyo. Dos veces, este accidente sobrevino durante el salto, agarrándose el miembro en la barrera. La curación se obtuvo en cinco casos entre las 3 y 4 semanas de tratamiento.

(Zeitschrift für Veterinarunde).

### MOVIMIENTO MENSUAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

Director: Dr. H. RIVAS

Ayudante: JUAN C. SAMPIETRO

Mes de Julio de 1906.

ANIMALES	PRESENTADOS AL CONSULTORIO	INGRESADOS AL HOSPITAL	EXISTENCIA ANTERIOR	DADOS DE ALTA POR				EXISTENCIA ACTUAL	OBSERVACIONES
				SANOS	MEJORA- DON	MUER- TOS			
Equinos	105	42	46	31	—	5	52		
Bovinos	4	2	4	1	—	—	5		
Caprinos	—	—	—	—	—	—	—		
Caninos	32	14	10	16	—	1	7		
Suinos	—	—	—	—	—	—	—		
Felinos	2	1	4	3	—	1	1		
Aves	9	7	1	—	—	3	5		

La Plata, Agosto 2 de 1906.

Al Señor Director de la REVISTA Dr. D. Lan.

Cúpleme comunicar á Vd. para que se sirva hacerlo presente, en la REVISTA del mes de Julio, que de los 5 equinos muertos, 2 han fallecido de cólicos, sobre los que el tan preconizado cloruro de bario á parte de otros medicamentos no tuvieron acción ninguna; otro de carbunco bacteridiano. De los dos restantes uno de anasarca y otro de anemia perniciosa.

Saluda á Vd. atte.

JUAN C. SAMPIETRO.