

NOTAS BREVES

DETERMINACION DE LA EDAD DEL CABALLO POR LOS DIENTES

PERIODOS	PINZAS	MEDIOS	EXTREMOS
Erupción de inc. de leche . . .	6 á 8 días	30 á 40 días	6 á 10 meses
Razamiento » » . . .	6 á 10 meses	10 á 12 meses	15 á 20 meses
Caida » » . . .	2 á 2 1/2 años	3 á 3 1/2 años	4 á 4 1/2 años
Erupción » persistentes .	3 años	4 años	5 años
Razamiento » » . . .	6 años	7 años	8 años
Forma redonda	9 á 10 años	10 á 11 años	11 á 12 años
» triangular	14 á 15 años	15 á 16 años	16 á 17 años
» biangular	17 á 18 años	18 á 19 años	20 á 21 años

UN BUEN MASH

Poner por la mañana en un balde, 3 litros de avena, medio litro de granos de lino; echar arriba 3 litros de agua hirviendo, luego recubrirlo con 3 litros de afrecho seco, que se comprime con la mano; tapar bien el balde; dejar macerar el contenido y darlo en la comida de la noche. Pueden agregarse, 10 á 15 gramos de cloruro de sodio.

G. BUTEL.

CONTRA LOS COLICOS Y CONTRA LA INFOSURA DEL CABALLO

Bromhidrato de arecolina 0 gr. 08
 Agua des. 5 gr.
 Inyección sub-cutánea.

S. SCHNEIDEMUEHL.

CONTRA EL ECZEMA CRONICO DEL PERRO

Creolina (a a 100 partes
Jabon verde (
Alcohol 50 “
uso externo.

S. SCHNEIDEMUEHL.

CONTRA LA ANASARCA DEL CABALLO

Yodo 2 gramos
Yoduro de potasio 10 gramos
Agua destilada 200 gramos
Dos veces por día, una inyección traqueal de 20 á 30 gra-
mos.

S. SCHNEIDEMUEHL.

BREBAJE DE ALFORT CONTRA LOS COLICOS DEL CABALLO

Alcanfor 15 gramos
Asa-fétida 15 “
Agua destilada. 500 “
Yema de huevo N. 1

APERITIVO PARA EL CABALLO

Quina pulv 10 gramos
Genciana pulv 10 gramos
Nuez vómica pulv 3 gramos
para I paq. VI; dos por día en el afrecho.

MEDIDAS DE UN BUEN CERDO YORKSHIRE

Talla media 0.75 m.
Longitud del cuerpo 1.10 m.
Perímetro del pecho 1.25 m.
Distancia del suelo al esternón 0.33 m.

MEDIDAS DE UN BUEN PERRO FOX-TERRIER

Talla en la cruz	0.37 m.
Longitud desde punta de la nariz al origen de la cola.	0.65 m.
Longitud desde la punta de espalda á id del isquién.	0.42 m.
Circunferencia de pecho	0.47 m.
Distancia del occipital al extremo de la nariz.	0.16 m.
Distancia del esternón al suelo.	0.21 m.
Perímetro del antebrazo	0.16 m.

CORSEVIN.