

Dr. HUGO L. LOPEZ



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS

ENUMERACION SISTEMATICA
DE LOS VERTEBRADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por

RAUL A. RINGUELET Y RAUL H. ARAMBURU



ENUMERACION SISTEMATICA DE LOS VERTEBRADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por

RAUL A. RINGUELET - RAUL H. ARAMBURU

Más de 30 años han pasado desde que el doctor Carlos A. Marelli publicó, en 1924, el «Elenco sistemático de la Fauna de la provincia de Buenos Aires (Procordados y Vertebrados)».


El adelanto de los conocimientos zoológicos, durante el lapso transcurrido, es más que suficiente como para envejecer un catálogo faunístico. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la necesidad de editar una lista al día se hace cada vez más urgente. Recientemente se han aprobado nuevas leyes de caza y de pesca, y el interés del pueblo por las actividades deportivas en esos ámbitos, ha tomado nuevos impulsos. A tono con esa nueva manera de enfocar los problemas de la Naturaleza, el Gobierno de la Provincia ha creado una Dirección de Conservación de la Fauna. Por todo ello, es menester tener a mano los nombres, si se quiere «oficiales», de las especies consideradas plaga, de las especies dañinas o perjudiciales según el criterio humano, y de las de importancia económica. Por otra parte, los censos de la fauna de un país o región cualquiera, constituyen una suerte de codificación de la Naturaleza, como paso previo e indispensable para un ensayo racional de aprovechamiento de las riquezas naturales y de su adecuada conservación. Desde fines del siglo XVIII se ha dicho, y lo han repetido en nuestro medio, Cosme Argerich, Alberto Palcos y otros estudiosos y científicos, que un Código de la Naturaleza es indispensable para la libertad de una nación.

La enumeración presente considera todas las especies de Vertebrados halladas o citadas dentro de los límites de la Provincia, salvo los peces marinos. Comprende los nombres científicos válidos y los nombres vernáculos o librescos más adecuados, ordenados de acuerdo con las clasificaciones que los autores conceptúan más serias.

Indícase sucintamente la distribución geográfica, prefiriéndose aludir a los dominios zoogeográficos, según las conclusiones recientes de Ringuelet (1955), modificando el esquema clásico de los territorios zoogeográficos argentinos, aceptados hasta ahora como resultado de la obra de Holmberg, Lahille y Cabrera.

Las especies censadas son 158 peces en sentido amplio, 24 batracios, 48 reptiles, 393 aves y 105 mamíferos, lo que hace un total de 728 especies de Vertebrados.


Al final de la lista sistemática se agrega un índice de nombres vulgares, cada uno de los cuales lleva uno o más números que permiten encontrar la especie correspondiente dentro de cada grupo.



REFERENCIAS

MAPA GENERAL PARA LA UBICACION DE LOS DOMINIOS ZOOGEOGRAFICOS QUE CORRESPONDEN A LA PROVINCIA.

- I DOMINIO SUBTROPICAL
- II DOMINIO PAMPASICO
- III DOMINIO CENTRAL
- IV DOMINIO PATAGONICO



ENTRE RÍOS

Gran BUENOS AIRES

CORDOBA

SANTA FE

RIO DE LA PLATA

AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 4

OCEANO ATLANTICO

REFERENCIAS

MAPA DE REFERENCIA PARA LA DISTRIBUCION DE LAS AVES

LA PAMPA

RIO NEGRO

Cañal de Samborombón



OBSERVACIONES SOBRE DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Con el objeto de sintetizar en lo posible la zoogeografía de cada especie, son oportunas unas breves nociones generales de referencia.

La presencia y ausencia de grupos animales, su fidelidad respecto de ambientes definibles (fauna de altura, fauna de selva, etc.), ha permitido dividir el mundo en REGIONES ZOOGEOGRAFICAS. Refiriéndonos exclusivamente a las regiones terrestres, la REGION NEOTROPICAL o NEOTROPICA cubre toda la América Central y la América del Sur. Esa región se divide, a su vez, en dos subregiones: GUAYANO - BRASILEÑA (con típica fauna hílea o selvática) y la subregión AUSTRAL o PATAGONICA o CHILENO - PATAGONICA (con fauna típica erémica, de llanura y de montaña). La primera de las dos cubre todo el norte y nordeste de la República Argentina y baja en una lengua comprendiendo la margen santafesina del río Paraná, y una franja de la provincia de Buenos Aires, aledaña al Río de la Plata, hasta aproximadamente el partido de La Plata. La segunda cubre todo el resto de la República y, por ende, la mayor parte de la provincia de Buenos Aires.

Cada subregión divídese, a su vez, en DOMINIOS, como se ve en el mapa número 1, y ellos son:

DOMINIO SUBTROPICAL. Unico de la subregión guayano-brasileña que corresponde a la Argentina y a nuestra provincia.

DOMINIO AUSTRAL - CORDILLERANO.

DOMINIO CENTRAL.

DOMINIO PAMPASICO.

DOMINIO PATAGONICO.

A la provincia de Buenos Aires le corresponden cuatro dominios, que son:

1. El SUBTROPICAL ya mencionado, con vegetación arbórea y elevado promedio de lluvias.
2. El PAMPASICO, correspondiente a la estepa herbácea o pampa bonaerense.
3. El PATAGONICO, que va del río Colorado al Negro, o Patagonia bonaerense.
4. El dominio CENTRAL, comprendiendo el territorio bonaerense desde el río Colorado a Bahía Blanca con el sistema serrano meridional o Ventania, y la parte interpuesta entre él y Bahía Blanca. Incluye también las áreas adyacentes a la provincia de La Pampa. Este dominio tuvo vegetación de monte, que en la actualidad ha desaparecido en su mayor parte.

Como es de suponer, la distribución de los animales no puede coincidir con exactitud con las líneas que sobre el mapa establece el hombre, pero la realidad de esos territorios es perfectamente válida. Existen «engranajes» entre territorio

y territorio, y los animales con capacidad de traslación activa, como las aves, se ubican más difícilmente en cualquier tipo de esquema zoogeográfico.

Para todos los grupos catalogados («peces» de agua dulce, batracios, reptiles y mamíferos), menos las aves, señalamos sintéticamente su distribución aludiendo a los dominios antes nombrados. En cambio, para las aves, dadas sus particularidades corológicas, hacemos referencia a cuatro zonas o áreas: 1, 2, 3 y 4, que se indican en el mapa número 2. La primera posee ornitofauna de tipo subtropical, la segunda tiene aves predominantemente «centrales», la cuarta, fauna de aves especialmente patagónica, y el área tercera, es intermedia o de transición, con desborde de la fauna de las demás zonas circundantes.

En cualquier caso se omiten las indicaciones sobre distribución general de cada especie en el resto del país, aludiendo siempre, y exclusivamente, a su presencia en la provincia de Buenos Aires.

Subphylum VERTEBRADOS o CRANEADOS

(*Vertebrata* o *Craniata*)

Hoy día los Vertebrados o Craneados se clasifican en 10 (ó 9) clases con representantes vivientes, de las cuales las 5 (ó 4) primeras se denominan colectivamente Vertebrados Pisciformes, y las 4 últimas (batracios, reptiles, aves y mamíferos) Vertebrados Tetrápodos. Mientras que la taxinomía general de estos últimos es aceptada universalmente, hay divergencias importantes respecto del número y ámbito de las superclases, clases y órdenes de Vertebrados Pisciformes.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LOS VERTEBRADOS PISCIFORMES

Como es sabido, con la palabra «peces» se designan, en sentido amplio, todos los vertebrados pisciformes. En las clasificaciones modernas los Vertebrados agnatos, o sin mandíbula, se colocan aparte, con una o dos clases con formas vivientes; son las babosas y lampreas, distinguibles por la falta de mandíbula, la boca circular y la ausencia de aletas pares entre otros caracteres. Peces o *Pisces*, según los diferentes ictiólogos, son: una serie comprendiendo todos los Vertebrados pisciformes con mandíbula (Elasmobranquios, Dipnoos y Teleóstomos), o bien una clase única caracterizada principalmente por su esqueleto óseo, la monorrinia y otros detalles anatómicos, equivaliendo a Teleóstomos. Adóptase aquí la taxinomía general de Leo S. Berg (1940), con respecto a los órdenes, y en grupos de menor jerarquía la ordenación de familias y subfamilias utilizada por los ictiólogos que se ocupan de la fauna neotrópica, como Schultz, Fowler y otros.

Según se ha analizado recientemente (Ringuélet, 1955), en el territorio de la provincia de Buenos Aires, la distribución de los peces en las aguas interiores sigue, en general, el mismo esquema que toda la limnofauna. La ictiofauna bonaerense, de acuerdo a los estudios de MacDonagh (1934), es paladinamente subtropical hasta Bahía Blanca, siendo una extensión de la fauna parano-platense, pero enormemente empobrecida. De este modo, los peces dulciacuícolas se ubican en dos grandes conjuntos faunísticos:

- a) Ictiofauna parano-platense, subtropical, en toda la Provincia hasta Ventanía y cercanías de Bahía Blanca;
- b) Ictiofauna patagónica, desde el río Colorado al extremo sur.

Sobre esta distribución global, hay fundadas razones para diferenciar el Río de la Plata, el Paraná y el Delta, junto con la franja rioplatense de la Provincia con ambientes acuáticos en la inmediata vecindad de aquéllos, extensión

en donde la ictiofauna mantiene la misma riqueza de familias, géneros y especies que en la gran vía faunística Paraná - Plata, mientras que fuera de esta extensión, la plana bonaerense hasta Ventania tiene un número restringido de grupos. Algunos grupos más se extienden hasta la cuenca del río Salado.

Cuando la distribución geográfica comprende el río Paraná, el estuario del río de la Plata, se indica simplemente Paraná - Plata; para distribuciones más amplias se aclara con mayor precisión.

Las abreviaturas Ie, Rc, Rh, Ric, Ril y Ro significan, respectivamente: Importancia económica, Régimen carnívoro, Régimen herbívoro, Régimen ictiófago, Régimen iliófago y Régimen omnívoro.

Superclase AGNATOS (*Agnatha*)

Clase PETROMIZONES o MARSIPOBRANQUIOS (*Petromyzones* o *Marsipobranchii*).

Orden PETROMIZONIFORMES (*Petromyzoniformes*).

Familia PETROMIZONIDOS (*Petromyzonidae*).

Subfamilia GEOTRININOS (*Geotriininae*).

1. *Geotria australis* Gray, 1851.

Lamprea de bolsa. Bandera argentina.

Distr.: Río de la Plata, río Negro. Anadroma.

Superclase GNATOSTOMADOS (*Gnathostomata*).

Serie PECES (*Pisces*).

Clase ELASMOBRANQUIOS (*Elasmobranchii*).

Subclase SELACIOS o EUSELACIOS (*Selachii* o *Euselachii*).

Superorden BATOIDEOS o HIPOTREMADOS (*Batoidei* o *Hypotremata*).

Orden RAIIFORMES (*Rajiformes*).

Familia PARATRIGONIDOS (*Paratrygonidae* = *Potamotrygonidae*).

2. *Paratrygon hystrix* (Müller y Henle, 1841).

Raya de río. Chucho de río, Ie. Rc.

Distr.: Paraná - Plata.

3. *Paratrygon motoro* (Müller y Henle, 1841).

Raya de río. Chucho de río. Ie. Rc.

Distr.: Paraná - Plata.

Clase DIPNOOS o DIPNEUSTAS (*Dipnoi* o *Dipneusta*).

Superorden CERATODOS (*Ceratodi*).

Orden LEPIDOSIRENIFORMES (*Lepidosireniformes*).

Familia LEPIDOSIRENIDOS (*Lepidosirenidae*).

4. *Lepidosiren paradoxa* (Fitzinger, 1837).

Lepidosirena. Lolocho.

Distr.: Ocasional en el Paraná inferior (San Pedro).

Clase TELEOSTOMOS (*Teleostomi*).

Subclase ACTINOPTERIGIOS (*Actinopterygii*).

Orden CLUPEIFORMES o ISOSPONDILOS (*Clupeiformes* o *Isospondyli*).

Suborden CLUPEOIDEOS (*Clupeoidei*).

Familia CLUPEIDOS (*Clupeidae*).

5. *Clupea melanostoma* (Eigenmann, 1907).

Sardina. Mandufia. Ie.

Distr.: Paraná - Plata y nordeste de la Pcia. hasta la cuenca del Salado.

6. *Ilisha flavipinnis* (Valenciennes, 1839).

Lacha. Ie. Ric.

Distr.: Paraná - Plata.

~~Sardina de río. Ie.~~

Distr.: Río de la Plata.

Familia ENGRAULÍDOS (*Engraulidae*).

8. *Lycengraulis olidus* (Günther, 1874).

Anchoíta de río. «Sardina». Ie. Ric.

Dist.: Paraná - Plata.

Orden CARACIFORMES o HETEROGNATOS. (*Characiformes* o *Heterognathi*).

Suborden CARACOIDEOS (*Characoidei*).

Familia TETRAGONOPTERIDOS (*Tetragonopteridae*).

Subfamilia TETRAGONOPTERINOS (*Tetragonopterinae*).

9. *Astyanax abramis* (Jenyns, 1842).

Mojarra. Mojarra pacusa. Rc.

Distr.: Paraná - Plata.

10. *Astyanax bimaculatus bimaculatus* (L., 1758).

Mojarra. Rc.

Distr.: Paraná - Plata.

11. *Astyanax erythropterus* (Holmberg, 1887).
Mojarra. Rc.
Distr.: Río Paraná.
12. *Astyanax fasciatus fasciatus* (Cuvier, 1819).
Mojarra. Rc.
Distr.: Toda la provincia hasta Ventania.
13. *Astyanax lineatus* (Perugia, 1891).
Mojarra. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
14. *Bryconamericanus iheringi* (Boulenger, 1887).
Mojarra. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
15. *Hemigramus caudovittatus* Ahl., 1924.
Mojarra. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
16. *Hemigramus matei*. Eigenmann, 1907.
Mojarra. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
17. *Markiana nigripinnis* (Perugia, 1891).
Mojarra. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
18. *Tetragonopterus argenteus*. Cuvier, 1817.
Mojarra. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia QUEIRODONTINOS (*Cheirodontinae*).

19. *Aphyocharax alburnus* (Günther, 1869).
Mojarra. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia ANOSTOMATINOS (*Anostomatinae*).

- ~~20. *Selizodon platensis* (Garman, 1890).~~
21. *Selizodon vittatus* (Valenciennes, 1849).
Distr.: Río de la Plata.

Subfamilia PROQUILODONTINOS (*Prochilodontinae*).

22. *Prochilodus lineatus* (Valenciennes, 1847).
Sábalo. «Pescado». Ie. Ril.
Distr.: Paraná - Plata y aguas hasta la cuenca del Salado.

Subfamilia LEPORININOS (*Leporininae*).

23. *Leporinus obtusidens* (Valenciennes, 1847).
Boga. Ie. Rh.
Distr.: Paraná - Plata y aguas hasta la cuenca del Salado.

Subfamilia NANNOSTOMATINOS (*Nannostomatinae*).

24. *Characidium fasciatum fasciatum*. Reinhardt, 1866.
Tritolo.
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia PARODONTINOS (*Parodontinae*).

25. *Apareiodon affinis* (Steindachner, 1879).
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia CURIMATINOS (*Curimatinae*).

26. *Curimata gilberti gilberti* (Quoy y Gaimard, 1824).
Sabalito. Ril.
Distr.: Paraná - Plata y aguas del nordeste hasta la cuenca del Salado.
27. *Curimata platana*. Günther, 1880.
Sabalito plateado. Ril.
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia SALMININOS (*Salmininae*).

28. *Salminus maxillosus*. Cuvier y Valenciennes, 1840.
Dorado. Ie. Rc. Ric.
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia CARACINOS (*Characinae*).

29. *Charax gibbosus*. (L., 1758).
Dientudo. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.

30. *Cynopotamus argenteus*. (Valenciennes, 1847).
Dientudo. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
31. *Cynopotamus humeralis*. (Valenciennes, 1847).
Dientudo. Dientudito. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
32. *Cyrtocharax squamosus*. (Eigenmann y Kennedy, 1908).
Dientudo. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
33. *Roeboides bonariensis*. (Steindachner, 1879).
Dientudo. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
34. *Roeboides prognathus*. (Boulenger, 1895).
Dientudo. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
35. *Asiphonichthys stenopterus*. Cope, 1894.
Dientudo.
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia ACESTRORRINQUINOS. (*Acestrorhynchinae*).

36. *Acestrorhynchus hepsetus*. (Cuvier, 1829).
Dientudo. Dentudo. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
37. *Acestrorhynchus jenynsi*. (Günther, 1864).
Dientudo. Dentudo. Rc.
Distr.: Toda la provincia hasta Ventania.
38. *Acestrorhynchus falcatus*. (Bloch, 1794).
Dientudo. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia RAFIODONTINOS. (*Rhaphiodontinae*).

39. *Rhaphiodon vulpinus*. Agassiz, 1829.
Chafalote. Machete. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia BRICONINOS. (*Bryconinae*).

40. *Brycon orbis. nyannus*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).
Pirapitá. Salmón del Paraná. Ie., Rc.
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia PIRRULININOS. (*Pyrhulinae*).

41. *Pyrhulina australis*. (Eigenmann y Kennedy, 1903).
Mojarra.
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia GASTEROPELECINOS. (*Gasteropelecinae*).

42. *Thoracocharax stellatus*. (Kner, 1859).
Pechito.
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia TRIPORTEINOS. (*Triportheinae*).

43. *Triportheus paranensis*. (Günther, 1874)
Pirá-guirá. Golondrina. Machete.
Distr.: Paraná - Plata.
44. *Pseudocorynopoma doriai*. Perugia, 1891.
Buchona. Mojarra de velo.
Distr.: Paraná - Plata y nordeste rioplatense.

Familia ERITRINIDOS. (*Erithrinidae*).

Subfamilia ERITRININOS. (*Erithrininae*).

45. *Hoplerythrimus unitaeniatus*. (Spix, 1829).
Distr.: Paraná - Plata.
46. *Hoplias malabaricus malabaricus*. (Bloch, 1795).
Tararira. Taralila. Tarucha. Ie., Rc., Ric.
Distr.: Paraná - Plata y el nordeste hasta la cuenca del Salado.

Familia SERRASALMIDOS. (*Serrasalmidae*).

Subfamilia SERRASALMINOS. (*Serrasalminae*).

47. *Serrasalmus marginatus*. Valenciennes, 1847.
Palometa. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.

48. *Serrasalmus nattereri*. (Kner., 1860).
Palometa. Piraña. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
49. *Serrasalmus piraya*. Cuvier, 1820.
Piraña. Palometa. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
50. *Serrasalmus spiropleura*. Kner., 1860.
Palometa. Palometa negra. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
51. *Serrasalmus ternetzi*. Steindachner, 1908.
Palometa. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia MILEINOS. (*Myleinae*).

52. *Colossoma mitrei*. (Berg., 1895).
Pacú. Ie., Rh.
Distr.: Paraná - Plata.
53. *Mylossoma duriventre*. (Cuvier, 1818).
Pacucito. Palometa. Rh.
Distr.: Paraná - Plata.
54. *Mylossoma orbignyanus*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).
Pacucito. Palometa. Rh.
Distr.: Paraná - Plata.
55. *Mylossoma paraguayense*. Norman, 1929.
Pacucito. Palometa. Rh.
Distr.: Paraná - Plata.

Suborden GIMNOTOIDEOS. (*Gymnotoidei* o *Gymnonoti*).
Familia RANFICTIDOS (*Rhamphichthyidae*).

56. *Rhamphichthys rostratus*. (L., 1758).
Señorita. Bombilla. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.

Familia APTERONOTIDOS. (*Apteronotidae*).

57. *Sternarchus albifrons*. (L., 1758).
Morena negra. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.

Familia GIMNOTIDOS. (*Gymnotidae*).

58. *Eigenmannia virescens*. (Valenciennes, 1847).
Señorita. Bandera, Ratona. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
59. *Gymnotus carapo*. L., 1758.
Morena pintada. Carapo. Rc.
Distr.: Paraná - Plata

Orden SILURIFORMES o NEMATOGNATOS.

Familia DIPLOMISTIDOS. (*Diplomystidae*).

60. *Diplomyste viedmensis*. (Mac Donagh, 1931).
Otuno. Bagre aterciopelado. ✓
Distr.: Río Negro.

Familia TAQUISURIDOS. (*Tachysuridae*).

61. *Genidens genidens*. (Valenciennes, 1839).
Bagre.
Distr.: Río de la Plata.
62. *Netuma barba*. (Lacepede, 1803).
Bagre.
Distr.: Río de la Plata.

Familia AGENEIOSIDOS. (*Ageneiosidae*).

63. *Ageneiosus brevifilis*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).
Manduvá. Ie., Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
64. *Ageneiosus valenciennesi*. Bleeker, 1864.
Manduví. Ie., Rc.
Distr.: Paraná - Plata.

Familia AUQUENIPTERIDOS. (*Auchenipteridae*).

65. *Auchenipterus nuchalis*. (Spix, 1829).
Hocicón. Ie.
Distr.: Paraná - Plata.

66. *Trachycorystes albicruz*. Berg., 1901.
Bagre rojo. Apretador. Bagre colorado. Bagre cruz blanca.
Distr.: Paraná - Plata.

Familia DORADIDOS. (*Doradidae*).

67. *Doras laevigatulus*. (Berg., 1895).
Armado.
Distr.: Paraná - Plata.
68. *Oxydoras kneri*. Bleeker, 1863.
Armado chancho. Ie., Ro.
Distr.: Paraná - Plata.
69. *Rhinodoras d'orbigny*. (Kröyer, 1855).
Armado amarillo. Ie., Ro.
Distr.: Paraná - Plata.
70. *Pterodoras granulosus*. (Valenciennes, 1839).
Armado chancho. Armado común. Ie., Ro.
Distr.: Paraná - Plata.

Familia PIMELODIDOS. (*Pimelodidae*).

Subfamilia PIMELODINOS. (*Pimelodinae*).

71. *Bergiaria platana*. (Steindachner, 1908).
Bagre.
Distr.: Paraná - Plata.
72. *Bergiaria westermanni*. (Reinhardt, 1874).
Bagre chancho. Bagre trompudo. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
73. *Heptapterus mustelinus*. (Valenciennes, 1840).
Bagre anguila.
Distr.: Paraná - Plata.
74. *Iheringichthys labrosus*. (Lütken, 1874).
Bagre trompudo.
Distr.: Paraná - Plata.
75. *Myoglanis colletti*. (Steindachner, 1882).
Bagre.
Distr.: Río de la Plata.

76. *Parapimelodus valenciennesi*. (Kröyer, 1874).
Bagarito. Bagre porteño. Portenito. Ro., y planctófono.
Distr.: Paraná - Plata y nordeste hasta la cuenca del Salado.
77. *Pimelodella gracilis*. (Valenciennes, 1840).
Bagre gris. Bagre cantor. Ro.
Distr.: Paraná - Plata y el nordeste hasta la cuenca del Salado.
78. *Pimelodella laticeps australis*. Eigenmann, 1917.
Bagrecito.
Distr.: Río de la Plata.
79. *Pimelodus albicans*. (Valenciennes, 1840).
Bagre blanco. Moncholo. Ie., Ro
Distr.: Paraná - Plata y el nordeste hasta el Salado.
80. *Pimelodus argenteus*. Perugia, 1891.
Bagre.
Distr.: Río de la Plata.
81. *Pimelodus brevis*. Marini, Nichols y La Monte, 1933.
Bagrecito.
Distr.: Paraná - Plata.
82. *Pimelodus clarias maculatus*. (Lacepede, 1803).
Bagre amarillo. Bagre manchado. Bagre overo. Ie., Ro.
Distr.: Paraná - Plata y nordeste hasta la cuenca del Salado.
83. *Rhamdia quelen*. (Quoy y Gaimard, 1824).
Bagre sapo.
Distr.: Sierra de la Ventana.
84. *Rhamdia sapo*. (Valenciennes, 1840).
Bagre sapo. Ie., Ro.
Distr.: Toda la provincia hasta la laguna Salada Grande y proximidades de Bahía Blanca.
85. *Zungaro zungaro*. (Humboldt, 1833).
Manguruyú. Bagre tosquero. Apretador. Ie., Ro.
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia LUCIOPIMELODINOS. (*Luciopimelodinae*).

86. *Luciopimelodus pati*. (Valenciennes, 1840).
Patí. Ie., Ro.
Distr.: Paraná - Plata.

87. *Megalonema platanum*. (Günther, 1880).
Bagre plateado. Patí bastardo. Mal anuncio. Ie., Ro.
Distr.: Paraná - Plata.
88. *Perugia argentina*. Mac Donagh, 1938.
Patí de aletas negras.
Distr.: Paraná - Plata.



Subfamilia SORUBIMINOS. (*Sorubiminae*).

89. *Hemisorubim platyrhynchos*. (Valenciennes, 1840).
Distr.: Río Paraná.
90. *Paulicea luetkeni*. (Steindachner, 1875).
Manguruyú pará. Manguruyú. Jahú. Ie., Ro.
Distr.: Paraná - Plata.
91. *Pseudoplatystoma coruscans*. (Agassiz, 1829).
Surubí. Ie., Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
92. *Pseudoplatystoma fasciatum fasciatum*. (L., 1766).
Surubí atigrado. Surubí rayado. Ie., Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
93. *Sorubim lima*. (Schneider, 1801).
Cucharón. Cucharita. Pico de pato. Ie.
Distr.: Paraná - Plata.

Familia HIPOFTALMIDOS. (*Hypophthalmidae*).

94. *Hypophthalmus oremaculatus*. Nani y Fuster, 1947.
Distr.: Paraná - Plata.

Familia PIGIDIDOS. (*Pygidiidae*).

-  95. *Hatcheria pique*. Mac Donagh, 1938.
Pique.
Distr.: Río Colorado.
-  96. *Homodiaetus maculatus*. (Steindachner, 1879).
«Camarón». Chupa chupa. Régimen hematófago.

Familia ASPREDINIDOS. (*Aspredinidae*).

97. *Bunocephalus coracoideus*. (Cope, 1874).
Guitarrita.
Distr.: Paraná - Plata.
98. *Bunocephalus doriai*. Boulenger, 1910.
Guitarrita.
Distr.: Río Paraná.
99. *Bunocephalus iheringi*. Boulenger, 1910.
Guitarrita. Pez guitarra.
Distr.: Paraná - Plata y franja nordeste de la provincia.

Familia CALICTIDOS. (*Callichthyidae*).

100. *Callichthys callichthys*. (L., 1758).
Cascarudo.
Distr.: Paraná - Plata.
101. *Hoplosternum littorale*. (Hancock, 1828).
Distr.: Paraná - Plata.
102. *Corydoras aeneus*. (Gill., 1858).
Tachuela.
Distr.: Río de la Plata.
103. *Corydoras microcephalus*. Regan, 1912.
Tachuela.
Distr.: Río de la Plata.
104. *Corydoras microps*. Eigenmann y Kennedy, 1904.
Tachuela.
Distr.: Río de la Plata.
105. *Corydoras paleatus*. (Jenyns, 1842).
Tachuela. Amarillito. Basurero. Barriga de fuego.
Distr.: Paraná-Plata y el nordeste hasta la cuenca del Salado y Mar del Plata.

Familia LORICARIDOS. (*Loricariidae*).

Subfamilia NEOPLESCOSTOMINOS. (*Neoplecostominae*).

106. *Rhinelepis aspera*. Spix, 1829.
Vieja. Ril.
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia PLECOSTOMINOS. (*Plecostominae*).

107. *Plecostomus commersoni*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).
Vieja. Vieja de agua. Ril.
Distr.: Paraná - Plata y el nordeste hasta la cuenca del Salado.
108. *Plecostomus laplatae*. Eigenmann, 1907.
Vieja. Vieja de agua. Ril.
Distr.: Paraná - Plata.
109. *Plecostomus punctatus*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).
Vieja. Vieja de agua. Ril.
Distr.: Paraná - Plata.
110. *Plecostomus robini*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).
Vieja. Vieja de agua. Ril.
Distr.: Paraná - Plata.
111. *Plecostomus taeniatus*. Regan, 1908.
Vieja. Vieja de agua. Ril.
Distr.: Río de la Plata.
112. *Ancistrus cirrhosus*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).
Vieja. Ril.
Distr.: Paraná - Plata.
113. *Ancistrus stigmaticus*. Eigenmann y Eigenmann, 1889.
Vieja de manitos.
Distr.: Río de la Plata.

Subfamilia HIPOPTOPOMATINOS. (*Hypoptopomatinae*).

114. *Otocinclus arnoldi*. Regan, 1910.
Limpia vidrios (entre los acuaristas).
Distr.: Paraná - Plata y franja nordeste de la provincia.
115. *Otocinclus flexilis*. Cope, 1872.
Distr.: Paraná - Plata.
116. *Microlepidogaster maculipinnis*. (Regan, 1912).
Distr.: Paraná - Plata.
117. *Microlepidogaster perforatus*. Eigenmann y Eigenmann, 1889.
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia LORICARINOS. (*Loricariinae*).

118. *Loricaria (Loricariichthys) anus*. (Cuv. y Val., 1840).
Vieja. Vieja de agua. Ro.
Distr.: Paraná - Plata y el nordeste de la provincia hasta la cuenca del Salado.
119. *Loricaria (Loricariichthys) labialis*. Boulenger, 1895.
Vieja. Vieja de agua. Ro.
Distr.: Paraná - Plata.
120. *Loricaria (Loricariichthys) typus*. (Bleeker, 1864).
Vieja. Vieja de agua.
Distr.: Paraná - Plata.
121. *Loricaria (Loricaria) laticeps*. Regan, 1904.
Vieja. Vieja de agua.
Distr.: Río Paraná.
122. *Loricaria (Loricaria) macrops*. Regan, 1904.
Vieja de cola. Vieja.
Distr.: Paraná - Plata.
123. *Loricaria (Loricaria) vetula*. Cuvier y Valenciennes, 1840.
Vieja de cola. Vieja de látigo. Ro.
Distr.: Paraná - Plata y el nordeste hasta la cuenca del Salado.

Orden CIPRINODONTIFORMES o CIPRINODONTES o MICROCI-
PRINOS (*Cyprinodontiformes* = *Cyprinodontes* = *Microcyprini*).

Suborden CIPRINODONTOIDES o PECILIOIDES. (*Cyprinodontoi-
dei* = *Poecilioidei*).

Superfamilia CIPRINODONTOIDEOS (*Cyprinodontoideae*).

Familia CIPRINODONTIDOS (*Cyprinodontidae*).

124. *Cynolebias bellotti*. Steindachner, 1881.
«Pavito»! (acuaristas).
Distr.: Paraná - Plata, el nordeste, cuenca del Salado, Azul y San An-
tonio (Juárez).
125. *Cynolebias elongatus*. Steindachner, 1881.
Distr.: Río de la Plata.
126. *Cynolebias gibberosus*. Berg., 1897.
Distr.: Azul.
127. *Cynolebias holmbergi*. Berg, 1897.
Distr.: Río de la Plata y arroyo Vivoratá.

Superfamilia PECILIOIDEOS. (*Poecilioidae*).
Familia JENYNSIDOS (*Jenynsiidae*).

128. *Jenynsia lineata*. (Jenyns, 1842).

Madre del agua. Overito.

Distr.: Toda la provincia.

Familia PECILIDOS (*Poeciliidae*).

 129. *Cnesterodon decenmaculatus*. (Jenyns, 1842).

Pechito. Madrecita del agua.

Distr.: Norte y nordeste de la provincia hasta la zona interserrana.

130. *Phalloceros caudimaculatus*. (Hensel, 1868).

Distr.: Paraná - Plata.

 131. *Phalloptychus januarius*. (Hensel, 1868).

Distr.: ?

Orden MUGILIFORMES o PERCESOCES (*Mugiliformes*).

Suborden MUGILOIDEOS (*Mugiloidei*).


Familia MUGILIDOS (*Mugilidae*).

132. *Mugil platanus*. Günther, 1880.

Lisa. Ie., Ril.

Distr.: Paraná - Plata, aguas del nordeste hasta la cuenca del Salado, y tramo inferior de ríos de pendiente atlántica hasta Bahía Blanca (?).

Familia ATERINIDOS (*Atherinidae*).

 133. *Basilichthys bonariensis*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).

Pejerrey. Ie., Ro. especialmente planctófago.

Distr.: Toda la provincia.

134. *Basilichthys perugiai*. (Evermann y Kendall, 1907).

Juncalero. Ie.

Distr.: Paraná - Plata.

Orden SYMBRANQUIFORMES (*Symbranchiformes* = *Symbranchii*).

Suborden SIMBRANCOIDEOS (*Symbranchoidei*).

Familia SIMBRANQUIDOS (*Symbranchidae*).

135. *Symbranchus marmoratus*. B'och, 1795.

«Anguila». Anguila criolla. Ie.

Distr.: Paraná - Plata y el nordeste hasta la cuenca del Salado.

Orden PERCIFORMES o ACANTOPTERIGIOS o PERCOMORFOS
(*Perciformes* = *Acanthopterygii* = *Percomorphi*).
Suborden PERCOIDEOS (*Percoidei*).
Superfamilia PERCOIDES (*Percoidae*).
Familia PERCICTIDOS (*Percichthyidae*).

136. *Percichthys altispinnis*. Regan, 1905.
Perca espinuda.
Distr.: Río Colorado.
137. *Percichthys trucha*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).
Perca o trucha criolla. Ie., Rc.
Distr.: Ríos Colorado y Negro.

Familia ESQUIENIDOS (*Sciaenidae*).

138. *Pachyurus bonariensis*. Steindachner, 1879.
Corvina de río. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
139. *Plagioscion macdonaghi*. Daneri, 1955.
Corvina de río. Rc.
Distr.: Paraná - Plata.
140. *Plagioscion auratus*. (Castelnau, 1855).
Corvina de río.
Distr.: Paraná - Plata.

Familia CICLIDOS (*Cichlidae*).

141. *Aequidens vittatus*. (Heckel, 1840).
Distr.: Paraná - Plata y franja rioplatense.
142. *Cichlasoma autochthon*. (Günther, 1862).
Chanchita.
Distr.: Paraná - Plata.
143. *Cichlasoma facetum*. (Jenyns, 1842).
Chanchita. «Palometa». Castañeta. Peine.
Distr.: Paraná - Plata, norte y nordeste, cuenca del Salado, hasta la zona de Tandilia.
144. *Cichlasoma festivum*. (Heckel, 1840).
Chanchita
Distr.: Río de la Plata.

145. *Apistogramma pleurotaenia*. Regan, 1909.
Distr.: Río de la Plata.
146. *Geophagus australis*. Eigenmann, 1907.
Chanchita.
Distr.: Río de la Plata.
147. *Geophagus brachyurus*. Cope, 1894.
San Pedro.
Distr.: Río de la Plata.
148. *Geophagus brasiliensis*. (Quoy y Gaimard, 1824).
San Pedro.
Distr.: Paraná - Plata y franja ríoplatense.
149. *Crenicichla lacustris*. (Castelnau, 1855).
Cabeza amarga.
Distr.: Paraná - Plata y el nordeste hasta la cuenca del Salado.
150. *Crenicichla lepidota*. (Heckel, 1840).
Distr.: Paraná - Plata.
151. *Crenicichla saxatilis*. (L., 1758).
Cabeza amarga. Juanita.
Distr.: Paraná - Plata y franja ríoplatense.
152. *Crenicichla semifasciata*. (Heckel, 1840).
Distr.: Paraná - Plata.

Orden PLEURONECTIFORMES o HETEROSOMADOS (*Pleuro-*
nectiformes = *Heterosomata*).

Suborden PLEURONECTOIDEOS (*Pleuronectoidei*).

Familia AQUIRIDOS (*Achiridae*).

153. *Achirus jenynsi*. (Günther, 1862).
Lenguado de río.
Distr.: Río de la Plata.
154. *Achirus lineatus*. (L., 1758).
Lenguado de río.
Distr.: Paraná - Plata.
155. *Achirus trichospilus*. Berg., 1895.
Lenguado de río.
Distr.: Río de la Plata.

ESPECIES EXOTICAS NATURALIZADAS.

Familia CIPRINIDOS (*Cyprinidae*).

156. *Cyprinus carpio*. (L., 1758).
Carpa. Ro. Considerada plaga.

Familia SALMONIDOS (*Salmonidae*).

157. *Salmo irideus*. Gibbons, 1855.
Trucha arco iris.
Distr.: Arroyos de la Sierra de la Ventana.

Clase BATRACIOS o ANFIBIOS (*Batrachia*).

Orden APODOS o GIMNOFIONES (*Apoda* o *Gymnophiona*).

Familia CECILIDOS (*Caeciliidae*).

1. *Chthonerpeton indistinctum*. (Reinhardt y Lütken, 1862).
Tapalcuá.
Distr.: Dominio subtropical. Costa rioplatense: Tigre, Núñez, Río Santiago, Palo Blanco.

Orden ANUROS o SALIENCIA (*Anura* o *Salientia*).

Familia BUFONIDOS (*Bufo*idae).

2. *Bufo arenarum*. Hensel, 1867.
Sapo. Sapo común.
Distr.: Dominios subtropical y pampásico, hasta aproximadamente el Río Colorado.
3. *Bufo granulosus d'orbignyi*. Duméril y Bibron, 1841.
Sapito panza amarilla.
Distr.: Dominio subtropical y pampásico hasta General Lavalle.

Familia HILIDOS (*Hylidae*).

4. *Hyla catharinae*. Boulenger, 1888.
Ranita de zarzal.
Distr.: Dominio subtropical (San Martín).

5. *Hyla guentheri*. Boulenger, 1886.
Ranita de zarzal.
Distr.: Dominio subtropical.
6. *Hyla raddiana raddiana*. Fitzinger, 1826.
Ranita de zarzal.
Distr.: Toda la provincia.
7. *Hyla siemersi*. Mertens, 1937.
Ranita de zarzal.
Distr.: Dominio subtropical (Delta).
8. *Hyla evelinae*. Schmidt, 1914.
Ranita de zarzal.
Distr.: Delta.

Familia LEPTODACTILIDOS (*Leptodactylidae*).

9. *Pseudis paradoxus*. (L., 1754).
Distr.: Dominio subtropical y nordeste del pampásico.
10. *Leptodactylus podicipinus*. (Cope, 1862).
Rana.
Distr.: Dominio subtropical.
11. *Leptodactylus ocellatus ocellatus*. (L., 1758).
Rana. Rana común. Rana criolla.
Distr.: Dominios subtropical y nordeste del pampásico.
12. *Leptodactylus ocellatus bonariensis*. Cei., 1949.
Rana. Rana criolla. Rana común.
Distr.: Centro y sur del dominio pampásico, dominio central hasta el Río Colorado.
13. *Leptodactylus prognathus*. Boulenger, 1888.
Rana.
Distr.: Dominio subtropical.
14. *Leptodactylus mystacinus*. (Burmeister, 1861).
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.
15. *Pseudopaludicola falcipes*. (Hensel, 1867).
Distr.: Dominio subtropical.
16. *Physalaemus barbouri*. Parker, 1927.
Distr.: Dominio subtropical y pampásico.
17. *Physalaemus biligonigerus*. (Cope, 1860).
Distr.: Dominio subtropical (Buenos Aires).

18. *Physalaemus fernandezae*. (Müller, 1926).
Distr.: Dominio pampásico. (Cristiano Muerto entre partidos de Necochea y Tres Arroyos). Probablemente igual a *Pseudopaludicola falcipes*.
19. *Physalaemus fuscomaculatus*. (Steindachner, 1864).
Distr.: Dominio subtropical.
20. *Physalaemus gracilis*. (Boulenger, 1863).
Distr.: ?

Familia CERATOPFRIDOS (*Ceratophryidae*).

21. *Ceratophrys ornata*. (Bell, 1843).
Escuerzo.
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.
22. *Odontophrynus americanus*. (Duméril y Bibron, 1841).
Escuerzo chico.
Distr.: Toda la provincia.

Familia BRAQUICEFALIDOS (*Brachicephalidae*).

23. *Dendrophryniscus stelzneri*. (Weyenbergh, 1876).
Sapito enano.
Distr.: Dominio subtropical; sierras del dominio pampásico hasta Ventania.

Familia MICROHILIDOS (*Microhylidae*).

24. *Elachistocleis ovalis bicolor*. (Guérin, 1838).
Distr.: Dominio subtropical.



Clase REPTILES (*Reptilia*).

Orden TESTUDINADOS o QUELONIOS (*Testudinata* o *Chelonia*).

Familia DERMOQUELIDIDOS (*Dermochelydidae*).

1. *Dermochelys coriacea*. (L., 1766).
Laúd. Tortuga laúd.
Distr.: Costa atlántica (hallazgos en Mar del Plata, Punta Médanos, entre Médanos y San Antonio).

Familia TESTUDINIDOS (*Testudinidae*).

2. *Chrysemys d'orbigny*. (Duméril y Bibron, 1835).
Tortuga de río.
Distr.: Dominio subtropical.
3. *Testudo chilensis*. Gray, 1870.
Tortuga de tierra.
Distr.: Toda la provincia.

Familia QUELONIDOS (*Chelonidae*).

4. *Chelonia mydas*. (L., 1766).
Tortuga de mar. Tortuga franca.
Distr.: Costa atlántica (hallazgos en Mar del Plata y Necochea).
5. *Caretta caretta*. (L., 1766).
Tortuga de mar. Tortuga comestible.
Distr.: Costa atlántica, penetrando ocasionalmente en el estuario del Plata.

Familia QUELIDOS (*Chaelidae*).

6. *Hydromedusa tectifera*. (Cope, 1869).
Tortuga de río.
Distr.: Dominio subtropical.
7. *Phrynops hilari*. Duméril y Bibron, 1835.
Tortuga de arroyo.
Distr.: Dominio subtropical.

Orden ESCAMADÓS (*Squamata*).

Suborden SAURIOS (*Sauria*).

Familia GECONIDOS (*Geckonidae*).

8. *Homonota darwini*. Boulenger, 1885.
Lagartija.
Distr.: Dominios central y pampásico, mayormente en las áreas serranas, (Sierra de la Ventana, Tandil, Balcarce).

Familia IGUANIDOS (*Iguanidae*).

9. *Aptycholaemus longicauda*. Boulenger, 1891.
Distr.: ?
10. *Anisolepis undulatus*. (Wiegmann, 1834).
Distr.: Dominio subtropical (Punta Lara, La Plata).

11. *Urostrophus scapulatus*. (Burmeister, 1861).
Distr.: Dominio central (Sierra de la Ventana).
12. *Liolaemus darwini*. (Bell, 1843).
Lagartija.
Distr.: Dominios central y patagónico (Bahía Blanca).
13. *Liolaemus multimaculatus*. (Duméril y Bibron, 1837).
Lagartija.
Distr.: Dominio pampásico, en el cordón de médanos litorales de Bahía Blanca a Mar Chiquita.
14. *Liolaemus wiegmanni*. (Duméril y Bibron, 1837).
Lagartija.
Distr.: Dominios pampásico y central (Bahía Blanca).
15. *Proctotretus pectinatus*. Duméril y Bibron, 1837.
Lagartija.
Distr.: Dominio pampásico (Sierras Bayas, Mar del Plata, Necochea).

Familia ESCINDIDOS (*Scindidae*).

16. *Mayuba dorsivittata*. (Cope, 1862).
Anberé. Tedyú-chi.
Distr.: Dominio pampásico (Mar del Plata).

Familia TEIIDOS (*Teiidae*).

17. *Tupinambis rufescens*. (Günther, 1871).
Lagarto colorado. «Iguana» colorada.
Distr.: Probablemente dominio central.
18. *Tupinambis teguixin*. (L., 1758).
«Iguana». «Iguana overa». Lagarto overo. Teyú-guazú.
Distr.: Toda la provincia (Los Talas, Sierras Bayas, Sierra de la Ventana, etcétera).
19. *Pantodactylus schreibersi schreibersi*. (Wiegmann, 1834).
Lagartija negra.
Distr.: Dominio subtropical (alrededores de Buenos Aires).
20. *Ameiva longicauda*. (Bell, 1857).
Lagartija.
Distr.: Dominio central (Sierras de la Ventana, Pillahuincó, B. Blanca).

21. *Tetis teyou teyou*. (Daudin, 1803).
Lagarto verde. Teyú-f. Teyú-hoby.
Distr.: Toda la provincia.

Familia ANFISBENIDOS (*Amphisbaenidae*).

22. *Amphisbaena angustifrons*. Cope, 1861.
Víbora de dos cabezas.
Distr.: Buenos Aires.
23. *Amphisbaena vermicularis darwini*. (Duméril y Bibron, 1839).
Víbora de dos cabezas. Madre de las hormigas.
Distr.: Dominio subtropical y pampásico hasta Sierra de la Ventana.
24. *Anopsibaena kingi*. (Bell, 1833).
Distr.: Dominio pampásico.

Familia ANGUIDOS (*Anguidae*).

25. *Ophiodes striatus*. (Spix, 1825).
Víbora de cristal. Mboi-pepé.
Distr.: Dominios subtropical y pampásico (Sierras Bayas).

Suborden OFIDIOS (*Ophidia*).

Familia LEPTOTIFLOPIDOS (*Leptotyphlopidae*).

26. *Leptotyphlops albifrons*. (Wagler, 1824).
Distr.: Dominio pampásico hasta Tandilia.

Familia COLUBRIDOS (*Colubridae*).

Subfamilia COLUBRINOS (*Colubrinae*).

27. *Helicops carinicauda*. (Wied., 1825).
Culebra acuática.
Distr.: Dominio subtropical.
28. *Helicops leopardina*. (Schlegel, 1837).
Culebra acuática.
Distr.: Dominio subtropical.
29. *Chironius carinatus*. (L., 1758).
Parapintos.
Distr.: Dominio subtropical hasta Los Talas.

30. *Leimadophis almada*. (Wagler, 1824).
Nandurié.
Distr.: Dominio subtropical.
31. *Leimadophis poecilogyrus platensis*. Amaral, 1946.
Nandurié.
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.
32. *Liophis anomalus*. (Günther, 1858).
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.
33. *Liophis miliaris semiaureus*. (Cope, 1862).
Distr.: Dominio subtropical.
34. *Lystrophis d'orbigny*. (Duméril y Bibron, 1854).
Culebra fiata. Falsa yarará. Víbora fiata.
Distr.: Dominio subtropical y pampásico, hasta Bahía Blanca.
35. *Lystrophis semicinctus*. (Duméril y Bibron, 1854).
Falsa coral.
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia DISPSADOMORFINOS (*Dispsadomorphinae*).

36. *Pseudoboa rhombifera*. (Duméril y Bibron, 1854).
Culebra. Falsa coral.
Distr. Toda la provincia.
37. *Pseudoboa rustica*. (Cope, 1877).
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.
38. *Tomodon ocellatus ocellatus*. (Duméril y Bibron, 1854).
Falsa yarará. Mboi-pé-mi.
Distr.: Dominio pampásico.
39. *Chlorosoma aestivum*. (Duméril y Bibron, 1854).
Mboi-hovih.
Distr.: Dominio subtropical.
40. *Chlorosoma psammophideum*. (Günther, 1872).
Distr.: Dominios pampásico y central.
41. *Chlorosoma schotti*. (Schlegel, 1837).
Mbói-hovih.
Distr.: Dominios subtropical, pampásico y central.

42. *Elapomorphus biliniatus*. Duméril y Bibron, 1854.
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.

Familia ELAPIDOS (*Elapidae*).

43. *Micrurus lemniscatus frontalis*. (Duméril y Bibron, 1854).
Víbora de coral. Mbói-chumbé-guazú. Considerada dañina.
Distr.: Dominios subtropical, noroeste del pampásico y central.

Familia CROTALIDOS (*Crotalidae*).

Subfamilia LAQUESINOS (*Lachesinae*).

44. *Bothrops alternata*. Duméril y Bibron, 1854.
Yarará. Víbora de la cruz. Considerada dañina.
Distr.: Parte noroeste del dominio pampásico.
45. *Bothrops amodytoides*. Leybold, 1873.
Yarará ñata.
Distr.: Dominios central y patagónico.
46. *Bothrops newwiedi meridionalis*. Amaral, 1930.
Yarará chica.
Distr.: Dominio central.

Subfamilia CROTALINOS (*Crotalinae*).

47. *Crotalus terrificus terrificus*. (Laurentius, 1768).
Víbora de cascabel. Crótalo.
Distr.: Parte norte y noroeste del dominio pampásico.

Orden LORICADOS (*Loricata*).

Familia CROCODILIDOS (*Crocodylidae*).

48. *Caiman latirostris*. (Daudin, 1802).
Yacaré. Caimán.
Distr.: Dominio subtropical. Llega ocasionalmente al Delta del Paraná,
y hasta la costa rioplatense en ocasión de crecientes. Hallóse un ejemplar
joven en Río Santiago.

Clase AVES

Dadas las particularidades corológicas de esta clase, para indicar la distribución geográfica de las especies bonaerenses, hacemos referencia a 4 zonas o áreas: 1, 2, 3 y 4, que figuran en el mapa Nº 2. La zona 1 posee una ornitofauna predominantemente de tipo subtropical, la 2 tiene aves de distribución «central», la 4, aves patagónicas en su mayor parte, y el área 3 es una intermedia o de transición con desborde de las faunas de las demás zonas circundantes.

Orden RHEIFORMES (*Rheiformes*).

Familia RHEIDOS (*Rheidae*).

1. *Rhea americana albescens*. L. Arribáizaga y Holmberg, 1878.
Ñandú. Impropiamente avestruz.
Distr.: Areas 2, 3, 4.

Orden TINAMIFORMES (*Tinamiformes*).

Familia TINAMIDOS (*Tinamidae*).

2. *Nothura darwini darwini*. Gray, 1867.
Perdiz chica de Patagonia.
Distr.: Area 4 (Bahía Blanca).
3. *Nothura maculosa nigroguttata*. Salvadori, 1895.
Perdiz. Perdiz chica.
Distr.: Toda la Provincia.
4. *Rhynchotus rufescens pallescens*. Kothe, 1907.
Perdiz colorada, «Martineta» colorada.
Distr.: Toda la provincia.
5. *Eudromia elegans elegans*. d'Orbigny y Geoffroy, 1832.
Copetona. Martineta. Martineta copetona.
Distr.: Areas 2, 3, 4.

Orden ESFENICIFORMES (*Spheniciformes*).

Familia ESPENISCIDOS (*Spheniscidae*).

6. *Eudyptes crestatus crestatus*. (J. F. Miller, 1784).
Pinguín de penacho amarillo.
Distr.: Ocasional en toda la costa atlántica y Río de la Plata.

7. *Spheniscus magellanicus*. (J. R. Forster, 1781).
Pingüín. Pingüino. Pájaro niño, Pájaro bobo.
Distr.: Costa atlántica y Río de la Plata.

Orden PODICIPEDIFORMES (*Podicipediformes*).

Familia PODICIPEDIDOS (*Podicipedidae*).

8. *Podiceps rolland chilensis*. (Lesson, 1828).
Macacito.
Distr.: Toda la provincia.
9. *Podiceps occipitalis occipitalis*. (Garnot, 1826).
Macá plateado. Macá blanco.
Distr.: Posiblemente toda la provincia.
10. *Podiceps dominicus speciosus*. (Lynch Arribálzaga, 1877).
Macá. Macá mediano.
Distr.: Area 1.
11. *Aechmophorus major*. (Boddaert, 1783).
Macá grande. Zambullidor.
Distr.: Toda la provincia.

Orden PROCELARIFORMES (*Procellariiformes*).

Familia DIOMEDEIDOS (*Diomedeidae*).

12. *Diomedea cauta salvini*. (Rotschild, 1893).
Albatros.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
13. *Diomedea chlororhynchos*. Gmelin, 1789.
Albatros de pico amarillo y negro.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
14. *Diomedea epomophora longirostris*. Mathews, 1934.
Albatros real.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
15. *Diomedea exulans exulans*. L., 1758.
Albatros.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
16. *Diomedea melanophris melanophris*. (Temminck, 1828).
Albatros de cejas negras.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.

Familia PROCELARIDOS (*Procellariidae*).

Subfamilia FULMARINOS (*Fulmarinae*).

17. *Macronectes giganteus*. (Gmelin, 1789).
Quebrantahuesos. Petrel gigante.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
18. *Daption capensis*. (L., 1758).
Petrel común. Damero del Cabo. Carnero del Cabo.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
19. *Priocella antarctica*. (Stephens, 1826).
Petrel gris plateado.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.

Subfamilia BULWERINOS (*Bulweriinae*).

20. *Pterodroma incerta*. (Schlegel, 1863).
Petrel grande.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.

Subfamilia PAQUIPTILINOS (*Pachyptilinae*).

21. *Halobaena caerulea*. (Gmelin, 1789).
Petrel azulado.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
22. *Pachyptila belcheri solanderi*. (Mathews, 1912).
Petrel
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.

Subfamilia PROCELARINOS (*Procellariinae*).

23. *Procellaria aequinoctialis aequinoctialis*. L., 1758.
Petrel negro de barba blanca.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
24. *Adamastor cinerea*. (Gmelin, 1789).
Petrel gris.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
25. *Puffinus gravis*. (O'Reilly, 1818).
Petrel pardo y blanco.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.

26. *Puffinus griseus*. (Gmelin, 1789).
Petrel oscuro de pico largo.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
27. *Puffinus puffinus puffinus*. (Brünnich, 1764).
Petrel del Atlántico Norte.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.

Familia TALASIDROMIDOS (*Thalassidromidae*).
Subfamilia OCEANITINOS (*Oceanitinae*).

28. *Oceanites oceanicus oceanicus*. (Kuhl, 1820).
Petrel de las tormentas. Petrel de Wilson.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica y Río de la Plata.
29. *Pelagodroma marina marina*. (Latham, 1790).
Petrel de las tormentas de cara blanca.
Distr.: Accidental en la costa atlántica.

Familia PELECANOIDEIDOS (*Pelecanoideidae*).

30. *Pelecanoides urinatrix berardi*. (Gaimard, 1823).
Petrel zambullidor de Las Malvinas.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.

Orden PELECANIFORMES (*Pelecaniformes*).
Familia PELECANIDOS (*Pelecanidae*).

31. *Phalacrocorax brasilianus brasilianus*. (Gmelin, 1789).
Mbiguá. Biguá. Viguá. Considerada dañina.
Distr.: Toda la provincia.
32. *Phalacrocorax albiventer*. (Lesson, 1831).
Biguá de vientre blanco. Biguá blanco.
Distr.: Ocasional en la vecindad del Río de la Plata.

Orden CICONIFORMES (*Ciconiiformes*).
Familia ARDEIDOS (*Ardeidae*).
Subfamilia ARDEINOS (*Ardeinae*).

33. *Ardea cocoi*. L., 1766.
Garza mora.
Distr.: Toda la provincia.

34. *Butorides striatus striatus*. (L., 1758).
Garcita azulada. Garcita.
Distr.: Area 1.
35. *Casmerodius albus egretta*. (Gmelin, 1789).
Garza blanca. Garza blanca grande.
Distr.: Areas 1, 3, 4.
36. *Leucophox thula thula*. (Molina, 1782).
Mirasol.
Distr.: Areas 1, 3.
37. *Syrigma sibilatrix*. (Temminck, 1824).
Chiflón.
Distr.: Area 1.
38. *Nycticorax nycticorax tayazu-guira*. (Vieillot, 1817).
Zorro de agua. Bruja. Cuaco. Dormilón.
Distr.: Toda la provincia.
39. *Tigrisoma lineatum marmoratum*. (Vieillot, 1817).
Garza colorada. Hocó.
Distr.: Area 1.

Subfamilia BOTAURINOS (*Botaurinae*).

40. *Ixobrychus involucris*. (Vieillot, 1823).
Mirasol. Garcita mirasol.
Distr.: Areas 1, 2, 3.
41. *Botaurus pinnatus*. (Wagler, 1829).
Hocó. Bramador.
Distr.: Area 1.

Familia CICONIDOS (*Ciconiidae*).

Subfamilia MICTERINOS (*Mycterinae*).

42. *Mycteria americana*. L., 1758.
Tuyuyú. Cigüeña de cabeza pelada.
Distr.: Area 1.

Subfamilia CICONINOS (*Ciconiinae*).

43. *Euxenura maguari*. (Gmelin, 1789).
Cigüeña. Tuyango.
Distr.: Toda la provincia.

44. *Jabiru mycteria*. (Lichtenstein, 1819).
Jabirú. Tuyuyú coral.
Distr.: Areas 1' y 3.

Familia TRESQUIORNITIDOS (*Threskiornithidae*).
Subfamilia TRESQUIORNITINOS (*Threskiornithinae*).

45. *Harpiprion caerulescens*. (Vieillot, 1817).
Bandurria mora.
Distr.: Ocasional en área 1. Migratoria.
46. *Theristicus caudatus caudatus*. (Boddaert, 1783).
Bandurria de verano. Bandurria.
Distr.: Area 1. Migratoria.
47. *Theristicus caudatus melanopis*. (Gmelin, 1789).
Bandurria de invierno. Bandurria.
Distr.: Toda la provincia. Migratoria.
48. *Phimosus infuscatus infuscatus*. (Lichtenstein, 1823).
Cuervillo de cara pelada.
Distr.: Area 1.
49. *Plegadis falcinellus guarauna*. (L., 1766).
Cuervillo de cañada. Cuervo de cañada. Bandurria.
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia PLATALEINOS (*Plataleinae*).

50. *Ajaia ajaja*. (L., 1758).
Espátula rosada. Espátula.
Distr.: Toda la provincia.

Orden FENICOPTERIFORMES (*Phoenicopteriformes*).
Familia FENICOPTERIDOS (*Phoenicopteridae*).

51. *Phoenicopus ruber chilensis*. Molina, 1782.
Flamenco.
Distr.: Toda la provincia.

Orden ANIMIFORMES (*Anhimiformes* = *Palamedeiformes*).
Familia ANIMIDOS (*Anhimidae*).

52. *Chauna torquata*. (Oken, 1816).
Chajá.
Distr.: Areas 1, 2, 3.

Orden ANSERIFORMES (*Anseriformes*).

Familia ANATIDOS (*Anatidae*).

Subfamilia CIGNINOS (*Cygninae*).

53. *Cygnus melancoriphus*. (Molina, 1782).

Cisne de cuello negro.

Distr.: Toda la provincia.

54. *Coscoroba coscoroba*. (Molina, 1782).

Ganso blanco. Cisne. Cisne blanco.

Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia ANSERINOS (*Anserinae*).

55. *Chloëphaga picta picta*. (Gmelin, 1789).

Cauquén. Caikén. Avutarda. Considerada plaga.

Distr.: Areas 2, 3, 4. Migratoria.

56. *Chloëphaga picta dispar*. (Philippi y Landbeck, 1862).

Cauquén. Caikén. Avutarda. Considerada plaga.

Distr.: Areas 2, 3, 4. Migratoria.

57. *Chloëphaga poliocephala*. Scater, 1857.

Avutarda de cabeza gris. Considerada dañina.

Distr.: Areas 2, 3, 4. Migratoria.

58. *Chloëphaga rubidiceps*. Scater, 1860.

Avutarda colorada. Considerada dañina.

Distr.: Areas 3, 4. Migratoria.

Subfamilia DENDROCIGNINOS (*Dendrocygninae*).

59. *Dendrocygna viduata*. (L., 1766).

Pato viuda. Sirirí pampa.

Distr.: Areas 1, 2.

60. *Dendrocygna bicolor bicolor*. (Vieillot, 1816).

Pato silbón común. Sirirí.

Distr.: Areas 1, 2, 3.

Subfamilia ANATINOS (*Anatinae*).

61. *Cairina moschata*. (L., 1758).

Pata criollo.

Distr.: Area 1.

62. *Sarkidiornis sylvicola*. H. y R. Ihering, 1907.
Pato crestudo.
Distr.: Ocasional en área 1.
63. *Nettion brasiliense*. (Gmelin, 1789).
Pato portugués.
Distr.: Area 1.
64. *Nettion flavirostre flavirostre*. (Vieillot, 1816).
Pato barcino chico. Pato franciscano.
Distr.: Toda la provincia.
65. *Nettion leucophrys*. (Vieillot, 1816).
Pato de collar. Patito de ceja blanca.
Distr.: Areas 1, 2, 3.
66. *Querquedula cyanoptera cyanoptera*. (Vieillot, 1816).
Pato colorado.
Distr.: Toda la provincia.
67. *Querquedula versicolor versicolor*. Vieillot, 1816.
Pato argentino.
Distr.: Toda la provincia.
68. *Dafila bahamensis rubrirostris*. (Vieillot, 1816).
Pato gargantilla. Pato de cara blanca.
Distr.: Toda la provincia.
69. *Dafila spinicauda*. (Vieillot, 1816).
Pato maicero. Pato barcino grande.
Distr.: Toda la provincia.
70. *Mareca sibilatrix*. (Poepfig, 1829).
Pato overo. Pato picazo.
Distr.: Toda la provincia.
71. *Spatula platalea*. (Vieillot, 1816).
Pato cuchara. Pato pico cuchara.
Distr.: Toda la provincia.
72. *Heteronetta atricapilla*. (Merrem, 1841).
Pato cabeza negra. Pato negro.
Distr.: Areas 1, 2, 3.

Subfamilia NIROCINOS (*Nyrocininae*).

73. *Metopiana peposaca*. (Vieillot, 1816).
Pato picazo. Pato crestón.
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia ERISMATURINOS (*Erismaturinae*).

74. *Nomonyx dominicus*. (L., 1766).

Pato fierro. Pato dominico.

Distr.: Area 1.

75. *Oxyura vittata*. (Philippi, 1860).

Pato zambullidor común.

Distr.: Toda la provincia.

Orden FALCONIFORMES (*Falconiformes*).

Familia CATARTIDOS (*Cathartidae*).

76. *Coragyps atratus*. (Bechstein, 1793).

Jote. Cuervo negro.

Distr.: Areas 2, 4, ocasional en 1.

77. *Cathartes aura jota*. (Molina, 1782).

Jote.

Distr.: Area 1 (Monte Veloz), 4 (Bahía Blanca).

Familia ACCIPITRIDOS (*Accipitridae*).

Subfamilia ELANINOS (*Elaninae*).

78. *Elanus leucurus leucurus*. (Vieillot, 1818).

Halcón blanco.

Distr.: Areas 1, 3.

Subfamilia PERNINOS (*Perninae*).

79. *Elanoides forficatus yetapa*. (Vieillot, 1818).

Halcón cola tijera. Halcón tijereta.

Distr.: Ocasional área 1.

Subfamilia MILVINOS (*Milvinae*).

80. *Ictinia plumbea*. (Gmelin, 1788).

Halcón azulado.

Distr.: Accidental (General Lavalle).

81. *Rosthramus sociabilis sociabilis*. (Vieillot, 1817).

Halcón caracolero. Caracolero.

Distr.: Areas 1 y 3.

Subfamilia ACCIPITRINOS (*Accipitrinae*).

82. *Heterospizias meridionalis*. (Latham, 1790).
Aguila colorada.
Distr.: Area 1 (Hudson).

Subfamilia BUTEONINOS (*Buteoninae*).

83. *Buteo albicaudatus albicaudatus*. Vieillot, 1816.
Aguila de cola blanca.
Distr.: Areas 1, 3.
84. *Buteo fuscescens fuscescens*. (Vieillot, 1819).
Aguila blanca. Aguila cabeza blanca.
Distr.: Area 1 y 3.
85. *Buteo fuscescens australis*. (Swann, 1922).
Aguila blanca.
Distr.: Areas 2 y 4 (Guaminí, Bahía Blanca).
86. *Buteo magnirostris pucherani*. (J. y E. Verreaux, 1855).
Gavilán de garganta negra.
Distr.: Areas 1 y 3.
87. *Buteo polyosoma polyosoma*. (Quoy y Gaimard, 1824).
Aguila gris.
Distr.: Toda la provincia.
88. *Buteo swainsoni*. Bonaparte, 1838.
Aguila langostera.
Distr.: Area 1.
89. *Parabuteo unicinctus unicinctus*. (Temminck, 1824).
Gavilán mixto común. Gavilán oscuro y canela.
Distr.: Area 1 y 3.
90. *Urubitinga urubitinga urubitinga*. (Gmelin, 1788).
Aguila negra. Aguila pescadora.
Distr.: Accidental en área 1 (Plátanos).
91. *Harpyhaliaetus coronatus coronatus*. (Vieillot, 1817).
Aguila coronada. Aguila de la flecha.
Distr.: Area 4 (Carmen de Patagones).

Subfamilia CIRCINOS (*Circinae*).

92. *Circus cyaneus cinereus*. Vieillot, 1816.
Gavilán ceniciento. Ladrón de pollos.
Distr.: Toda la provincia.

93. *Circus brasiliensis*. (Gmelin, 1788).
Gavilán de alas largas.
Distr.: Area 1 y 3.
94. *Geranospiza caerulescens flexipes*. Peters, 1935.
Gavilán aplomado. Gavilán plumizo.
Distri.: Posiblemente área 1 (sin localidad especificada).

Familia FALCONIDOS (*Falconidae*).

Subfamilia HERPETOTERINOS (*Herpetotherinae*).

95. *Micrastur semitorquatus semitorquatus*. (Vieillot, 1817).
Gavilán semiacollarado.
Distr.: Area 1 (San Fernando, Capital Federal).

Subfamilia CARACARINOS (*Caracarinae* = *Polyborinae*).

96. *Milvago chimango chimango*. (Vieillot, 1816).
Chimango.
Distr.: Toda la provincia.
97. *Milvago chimachima chimachina*. (Vieillot, 1816).
Chimachima.
Distr.: Area 1.
98. *Caracara plancus plancus*. (J. F. Miller, 1777).
Carancho. Caracara.
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia POLIHIERACINOS (*Polihieracinae*).

99. *Spizapteryx circumcinctus*. (Kaup, 1851).
Halconcito. Halconcito gris.
Distr.: Area 2 posiblemente (sin localidad especificada).

Subfamilia FALCONINOS (*Falconinae*).

100. *Falco fuscoerulescens fuscoerulescens*. Vieillot, 1817.
Halcón azulado.
Distr.: Areas 1, 3, 4.
101. *Falco peregrinus anatum*. Bonaparte, 1838.
Halcón peregrino. Halcón peregrino del norte. Halcón viajero.
Distr.: Areas 1 y 3.

102. *Falco peregrinus cassini*. Sharpe, 1873.
Halcón viajero del sur.
Distr.: Areas 1 (La Plata) y 3 (Tandil).
103. *Falco sparverius cinnamominus*. Swainson, 1837.
Halconcito colorado. Halconcito. Halcón canela.
Distr.: Toda la provincia.

Orden GRUIFORMES (*Gruiformes*).

Familia ARAMIDOS (*Aramidae*).

104. *Aramus scolopaceus carau*. Vieillot, 1817.
Carau. Viuda loca.
Distr.: Areas 1 y 3.

Familia RALLIDOS (*Rallidae*).

Subfamilia RALLINOS (*Rallinae*).

105. *Rallus limicola antarcticus*. King, 1828.
Gallineta de pico rojo. Gallineta antártica.
Distr.: Toda la provincia.
106. *Rallus nigricans nigricans*. (Vieillot, 1819).
Cochapolla. Polla de agua.
Distr.: Accidental área 1 (Baradero).
107. *Rallus rytirhynchus rytirhynchus*. (Vieillot, 1819).
Gallineta. Gallineta de pico largo.
Distr.: Areas 1, 2, 3.
108. *Pardirallus maculatus maculatus*. (Boddaert, 1783).
Gallineta overa. Polla de agua.
Distr.: Area 1.
109. *Aramides cajanea cajanea*. (P. L. S. Müller, 1776).
Chiricote. Gallineta rojiza.
Distr.: Area 1 (Isla Martín García, Punta Lara).
110. *Aramides ypecaha*. (Vieillot, 1819).
Ypecahá. Gallineta de agua.
Distr.: Area 1, 3.
111. *Porzana spiloptera*. Durnford, 1877.
Gallineta de los alfalfares. Gallineta enana.
Distr.: Areas 1 y 3 (Zelaya, Avellaneda, Pradere, Cabo San Antonio).
112. *Porzana flaviventer flaviventer*. (Boddaert, 1783).
Gallineta enana de vientre amarillo.
Distr.: Areas 1 y 3 (Tigre y Mar del Plata).

113. *Laterallus leucopyrrhus*. (Vieillot, 1819).
Gallinetita. Burrito. Burrito de patas rojas.
Distr.: Area 1.
114. *Laterallus melanophaius melanophaius*. (Vieillot, 1819).
Gallinetita. Burrito. Burrito silbón.
Distr.: Area 1 (San Isidro, Avellaneda, La Plata).
115. *Coturnicops notata notata*. (Gould, 1841).
Gallinetita de pintas blancas. Gallinetita enana.
Distr.: Area 1 (Río de la Plata, La Plata).
116. *Neocrex erythrops erythrops*. (Sclater, 1867).
Gallineta pico rojo. Cocha polla.
Distr.: Buenos Aires sin más especificación.
117. *Porphyriceps melanops melanops*. (Vieillot, 1819).
Gallineta de cara negra.
Distr.: Areas 1 y 3.
118. *Gallinula chloropus galeata*. (Lichtenstein, 1818).
Gallineta con casco. Pollona. Polla de agua común.
Distr.: Areas 1 y 3.
119. *Ionornis martinica*. (L., 1766).
Gallineta azul. Pollona azul.
Distr.: Area 1 (Zelaya, Avellaneda).

Subfamilia FULICINOS (*Fulicinae*).

120. *Fulica armillata*. Vieillot, 1817.
Gallareta. Gallareta de ligas rojas.
Distr.: Toda la provincia.
121. *Fulica leucoptera*. Vieillot, 1817.
Gallareta. Gallareta de alas blancas.
Distr.: Toda la provincia.
122. *Fulica rufifrons*. Philippi y Landbeck, 1861.
Gallareta. Gallareta de pico rojo.
Distr.: Areas 1 y 3.

Orden CARADRIFORMES (*Charadriiformes*).

Suborden CARADRIOS (*Charadrii*).

Superfamilia JACANOIDEOS (*Jacanoidea*).

Familia JACANIDOS (*Jacaniidae*).

123. *Jacana spinosa jacana*. (L., 1766).
Jacana. Gallito de agua. Aguapeazó.
Distr.: Areas 1 y 3.

Familia ROSTRATULIDOS (*Rostratulidae*).

124. *Nycticryphes semicollaris*. (Vieillot, 1816).
Agachona. Aguatero.
Distr.: Areas 1 y 3.

Familia HEMATOPODIDOS (*Haematopodidae*).

125. *Haematopus ostralegus durnfordi*. Sharpe, 1896.
Ostrero.
Distr.: Costa atlántica (Cabo San Antonio. Ajó, General Lavalle, Mar Chiquita).

Familia CARADRIDOS (*Charadriidae*).
Subfamilia VANELLINOS (*Vanellinae*).

126. *Belonopterus cayennensis lampronotus*. (Wagler, 1827).
Tero. Teru-teru.
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia CARADRINOS (*Charadriinae*).

127. *Squatarola squatarola*. (L., 1758).
Chorlo gris.
Distr.: Cita aislada en General Lavalle.
128. *Pluvialis dominica dominica*. (P. L. S. Müller, 1776).
Chorlo pampa. Chorlo dorado.
Distr.: Toda la provincia.
129. *Charadrius collaris*. Vieillot, 1818.
Chorlito de collar. Arenero.
Distr.: Areas 1 y 3 (Zelaya, Cap. Federal, Punta Lara, Gral. Lavalle).
130. *Charadrius falklandicus*. Latham, 1790.
Chorlo playero de la Patagonia. Angelito.
Distr.: Toda la provincia.
131. *Charadrius hiaticula semipalmatus*. Bonaparte, 1825.
Batuirá. Chorlo semipalmado.
Distr.: Cita aislada en playas de Quequén.
132. *Oreopholus ruficollis*. (Wagler, 1829).
Chorlo cabezón.
Distr.: Areas 1 y 3.

133. *Zonibyx modestus*. (Lichtenstein, 1823).
Chorlo capela. Chorlo de invierno.
Distr.: Areas 1, 2, 3.

Familia ESCOLOPACIDOS (*Scolopacidae*).
Subfamilia TRINGINOS (*Tringinae*).

134. *Bartramia longicauda*. (Bechstein, 1802).
Batitú.
Distr.: Areas 1 y 3.
135. *Numenius borealis*. (J. R. Forster, 1772).
Chorlo de pico corvo.
Distr.: Areas 1 y 3 (prácticamente extinguido).
136. *Numenius phaeopus hudsonicus*. Latham, 1790.
Chorlo grande de pico corvo. Chorlo de Hudson.
Distr.: Area 1 (Zelaya).
137. *Limosa haemastica*. (L., 1758).
Becasina de mar. Becasa.
Distr.: Areas 1, 2, 3.
138. *Tringa flavipes*. (Gmelin, 1789).
Chorlo menor de patas amarillas.
Distr.: Areas 1 y 3.
139. *Tringa melanoleuca*. (Gmelin, 1789).
Chorlo grande patas amarillas.
Distr.: Toda la provincia.
140. *Tringa nebularia*. (Gunnerus, 1767).
Chorlo boreal.
Distr.: Presencia dudosa.
141. *Tringa solitaria cinnamomea*. (Brewster, 1890).
Chorlito de manchas acanaladas.
Distr.: Areas 1 y 3.
142. *Tringa solitaria solitaria*. Wilson, 1813.
Chorlito solitario.
Distr.: Areas 1 y 3. (Avellaneda, Ranchos, Azul).
143. *Actitis macularia*. (L., 1766).
Chorlo manchado.
Distr.: Areas 1 y 3 (Zelaya, Río Ajó).

Subfamilia ESCOLOPACINOS (*Scolopacinae*).

144. *Limnodromus scolopaceus*. (Say, 1823).
Becasina migratoria.
Distr.: Area 3 (Santo Domingo).
145. *Capella paraguayiae magellanica*. (King, 1828).
Becasina del sur.
Distr.: Areas 1, 3 y norte de la 4.
146. *Capella paraguayiae paraguayiae*. (Vieillot, 1816).
Becasina. Agachona.
Distr.: Areas 1, 2, 3.
147. *Capella undulata gigantea*. (Temminck, 1826).
Becasa grande.
Distr.: Sin especificación de localidad.

Subfamilia EROLINOS (*Erolinae*).

148. *Calidris canutus rufus*. (Wilson, 1813).
Chorlo rojizo.
Distr.: Areas 1 y 3 (Avellaneda, Cabo San Antonio, San Clemente, Ajó).
149. *Crocethia alba*. (Pallas, 1764).
Chorlito blanco.
Distr.: Areas 1 y 3.
150. *Erolia bairdi*. (Coues, 1861).
Pollito de mar. Sacha pollito.
Distr.: Areas 1, 2, 3.
151. *Erolia fuscicollis*. (Vieillot, 1819).
Carachilla. Chorlito rabadilla blanca.
Distr.: Toda la provincia.
152. *Erolia melanota*. (Vieillot, 1819).
Chorlito de lomo negro.
Distr. Areas 1, 2, 3.
153. *Micropalama himantopus*. (Bonaparte, 1826).
Chorlito palmeado.
Distr.: Areas 1 y 3.
154. *Tryngites subruficollis*. (Vieillot, 1819).
Chorlo garganta blanca acanelada.
Distr.: Areas 1, 2, 3.

Familia RECURVIROSTRIDOS (*Recurvirostridae*).

Subfamilia RECURVIROSTINOS (*Recurvirostrinae*).

155. *Himantopus himantopus melanurus*. Vieillot, 1817.

Tero real.

Distr.: Toda la provincia.

Familia FALAROPODIDOS (*Phalaropodidae*).

156. *Phalaropus fulicarius*. (L., 1758).

Chorlito de mar.

Distr.: Mención sin localidad especificada.

157. *Steganopus tricolor*. Vieillot, 1819.

Chorlito de tres colores.

Distr.: Areas 1, 2, 3.

Superfamilia TINOCOROIDEOS (*Thinocoroidea*).

Familia TINOCORIDOS (*Thinocoridae*).

158. *Thinocorus rumicivorus rumicivorus*. Eschscholtz, 1829.

Chorlo agachón. Agachona. Dormilona.

Distr.: Toda la provincia.

Superfamilia QUIONIDOIDEOS (*Chionidoidea*).

Familia QUIONIDIDOS (*Chionididae*).

159. *Chionis alba*. (Gmelin, 1879).

«Paloma» antártica. Pico de estuche.

Distr.: Accidental en la costa atlántica.

Suborden LARIOS (*Lari*).

Familia ESTERCORARIDOS (*Stercorariidae*).

160. *Catharacta skua antarctica*. (Lessón, 1831).

Skua.

Distr.: Ocasional en área 1 (Rosas).

161. *Catharacta skua chilensis*. (Bonaparte, 1857).

Skua.

Distr.: Ocasional en área 1 (Avellaneda).

162. *Stercorarius longicaudus*. Vieillot, 1819.
Gaviota de cola larga.
Distr.: Ocasional en área 3 (25 km. al sur de Cabo San Antonio).
163. *Stercorarius parasiticus*. (L., 1758).
Gaviota de rapiña.
Distr.: Costa atlántica.

Familia LARIDOS (*Laridae*).
Subfamilia LARINOS (*Larinae*).

164. *Larus belcheri*. Vigors, 1829.
Gaviota cocinera de cola blanca y negra.
Distr.: Costa atlántica.
165. *Larus cirrocephalus cirrocephalus*. Vieillot, 1818.
Gaviota de cabeza gris. Gaviota de capucho gris.
Distr.: Toda la provincia.
166. *Larus marinus dominicanus*. Lichtenstein, 1823.
Gaviota cocinera. Gaviotón.
Distr.: Toda la provincia.
167. *Larus ridibundus maculipennis*. Lichtenstein, 1823.
Gaviota capucho café. Gaviota cabeza parda.
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia ESTERNINOS (*Sterninae*).

168. *Phaetusa simplex*. Gmelin, 1789.
Gaviotín. Atí.
Distr.: Area 1 (Baradero, Avellaneda, Belgrano).
169. *Gelochelidon anglica grönvoldi*. Mathews, 1912.
Gaviotín de patas y pico negros.
Distr.: Areas 1, 2, 3 y norte de 4.
170. *Sterna hirundinacea*. Lesson, 1831.
Golondrina de mar.
Distr.: Costa atlántica (Río de la Plata, Quilmes, Cabo San Antonio).
171. *Sterna hirundo hirundo*. L., 1758.
Golondrina de mar de pico y dedos bermejos.
Distr.: Ocasional en la costa atlántica (Mar del Plata).

172. *Sterna paradisea*. Pontoppidan, 1763.
Gaviota ártica. Golondrina ártica.
Distr.: Citas aisladas para la costa del Río de la Plata y «frente a Mar del Plata».
173. *Sterna superciliaris*. Vieillot, 1819.
Gaviotín de ceja blanca. Gaviotín chico.
Distr.: Area 1 (Baradero, Avellaneda).
174. *Sterna trudeaui*. Audubon, 1838.
Gaviotín de caperuza y nuca blancas.
Distr.: Areas 1 y 3.
175. *Thalasseus maximus maximus*. (Boddaert, 1783).
Gaviotín real. Gaviotín mayor de pico anaranjado.
Distr.: Costa atlántica (estuario del Río de la Plata, Tuyú, Cabo San Antonio).

Familia RINCOPIDOS (*Rynchopidae*).

176. *Rynchops nigra intercedens*. Saunders, 1895.
Rayador. Pico tijera.
Distr.: Areas 1 y 3, y norte de la 4.

Orden COLUMBIFORMES (*Columbiformes*).

Familia COLUMBIDOS (*Columbidae*).

177. *Columba maculosa maculosa*. Temminck, 1813.
Paloma de monte de alas manchadas. Paloma grande de alas manchadas.
Considerada dañina.
Distr.: Toda la provincia.
178. *Columba picazuro picazuro*. Temminck, 1813.
Paloma turca. Picazuro.
Distr.: Toda la provincia.
179. *Zenaidura auriculata chrysauchenia*. (Reichenbach, 1847).
Paloma torcaz. Torcaza. Tórtola. Paloma torcaz común. Considerada dañina.
Distr.: Areas 1, 2, 3.
180. *Columbina picui picui*. (Temminck, 1813).
Torcacita. Palomita. Picu-í.
Distr.: Toda la provincia.
181. *Leptotila verreauxi chlorauchenia*. (Giglioli y Salvadori, 1870).
Paloma de monte. Paloma montaraz. Paloma ala colorada común.
Distr.: Areas 1 y 3.

Orden PSITACIFORMES (*Psittaciformes*).

Familia PSITACIDOS (*Psittacidae*).

Subfamilia PSITACINOS (*Psittacinae*).

182. *Thectocercus acuticaudatus acuticaudatus*. (Vieillot, 1817).
Loro de los palos. Calancate.
Distr.: Ocasional en área 2.
183. *Cyanoliseus patagonus patagonus*. (Vieillot, 1817).
Loro barranquero. Considerada plaga.
Distr.: Toda la provincia.
184. *Myopsitta monacha monacha*. (Boddaert, 1783).
Cotorrita de Buenos Aires. Cata común. Monjita. Considerada plaga.
Distr.: Areas 1 y 3.
185. *Amazona aestiva xanthopteryx*. (Berlepsch, 1896).
Loro hablador. Loro de Castilla. Loro real.
Distr.: Cita dudosa para el área 2.
186. *Amazona pretrei*. (Temminck, 1830).
Loro de cabeza roja.
Distr.: Citado para «Río de la Plata», aunque quizás sea para el Uruguay.

Orden CUCULIFORMES (*Cuculiformes*).

Familia CUCULIDOS (*Cuculidae*).

Subfamilia FENICOFEINOS (*Phaenicophaeinae*).

187. *Coccyzus americanus americanus*. L., 1758.
Cuclillo de pico amarillo.
Distr.: Area 1.
188. *Coccyzus melacoryphus*. Vieillot, 1817.
Cuclillo de pico negro. Col-col.
Distr.: Area 1.
189. *Micrococcyx cinereus*. (Vieillot, 1817).
Ceniciento. Cuclillo de ojo colorado.
Distr.: Area 1.
190. *Piaya cayana macroura*. Gambel, 1849.
Alma de gato.
Distr.: Accidental en áreas 1 y 3 (Villa Elisa, Liguencia, Ptdo. Lavalle).

Subfamilia CROTOFAGINOS (*Crotophaginae*).

191. *Crotophaga major*. Gmelin, 1788.
Pirincho negro grande.
Distr.: Ocasional en área 1 (Avellaneda. Alrededores Cap. Federal).
192. *Guira guira*. (Gmelin, 1788).
Pirincho. «Urraca». Pinchirracá.
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia NEOMORFINOS. (*Neomorphae*).

193. *Tapera naevia chochi*. (Vieillot, 1817).
Crispín. Crespín. Chochí.
Distr.: Ocasional en área 1 (Hudson).

Orden ESTRIGIFORMES (*Strigiformes*).

Familia TITONIDOS (*Tytonidae*).

Subfamilia TITONINOS (*Tytoninae*).

194. *Tyto alba tudara*. (J. E. Gray, 1829).
Lechuzón de los campanarios. Lechuzón de iglesia.
Distr.: Toda la provincia.

Familia ESTRIGIDOS (*Strigidae*).

Subfamilia BUBONINOS (*Buboninae*).

195. *Otus choliba choliba*. (Vieillot, 1817).
Búho chico. Ñacurutucito. Choliba.
Distr.: Área 1.
196. *Bubo virginianus nacurutu*. (Vieillot, 1817).
Ñacurutú. Búho.
Distr.: Toda la provincia.
197. *Glaucidium namum*. (King, 1827).
Caburé. Rey de los pajaritos.
Distr.: Toda la provincia.
198. *Speotyto cunicularia cunicularia*. (Molina, 1782).
Lechuza de las vizcacheras. Lechucita de las cuevas.
Lechuza de campo.
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia ESTRIGINOS (*Striginae*).

199. *Rhinoptynx clamator midas*. (Schlegel, 1862).
Buho orejudo. Buho chuchumeco.
Distr.: Area 1.
200. *Asio flammeus suinda*. (Vieillot, 1817).
Lechuzón. Lechuzón de campo. Lechuzón de los pajonales.
Suindá.
Distr.: Toda la provincia.

Orden CAPRIMULGIFORMES (*Caprimulgiformes*).

Suborden CAPRIMULGIOS (*Caprimulgi*).

Familia NICTIBIDOS (*Nyctibiidae*).

201. *Nyctibius griseus griseus*. (Gmelin, 1789).
Urutaú. Cacuí.
Distr.: Ocasional en área 1 (Zelaya).

Familia CAPRIMULGIDOS (*Caprimulgidae*).

Subfamilia CORDEILINOS (*Chordeilinae*).

202. *Chordeiles minor minor*. (J. R. Forster, 1771).
Añapero.
Distr.: Ocasional en área 1 (Avellaneda. Alrededores La Plata).
203. *Podager nacunda nacunda*. (Vieillot, 1817).
Dormilón. Nacundá.
Distr.: Areas 1, 3 y norte de la 4.

Subfamilia CAPRIMULGINOS (*Caprimulginae*).

204. *Setopagis parvula parvula*. (Gould, 1837).
Dormilón.
Distr.: Area 1.
205. *Systellura longirostris longirostris*. (Bonaparte, 1825).
Tarpuí.
Distr.: Areas 1 y 3.
206. *Hydropsalis brasiliana furcifera*. (Vieillot, 1817).
Ataja camino. Chumulucuco. Dormilón de cola larga.
Distr.: Area 1 (Isla Martín García, Punta Lara).

207. *Eleothreptus anomalus*. (Gould, 1837).
Dormilón.
Distr.: Area 1 (Quilmes).

Orden APODIFORMES (*Apodiformes*).
Suborden TROQUILIOS (*Trochili*).
Familia TROQUILIDOS (*Trochilidae*).
Subfamilia TROQUILINOS (*Trochilinae*).

208. *Hylocharis chrysurus*. (Shaw, 1812).
Picaflor bronceado.
Distr.: Area 1 y 3.
209. *Hylocharis cyanus cyanus*. (Vieillot, 1818).
Picaflor azul de garganta blanca.
Distr.: Accidental área 3 (Necochea).
210. *Hylocharis sapphirina latirostris*. (Wied., 1832).
Picaflor azul de garganta roja.
Distr.: Area 1 (sin localidad especificada).
211. *Chlorostilbon ? lucidus lucidus*. Shaw, 1811.
Picaflor verde común. Tente en el aire.
Distr.: Areas 1 y 3.
212. *Sephanoides galeritus*. (Molina, 1782).
Picaflor de corona rojo anaranjada.
Distr.: Ocasional en área 1 (9 de Julio).
213. *Heliomaster furcifer*. (Shaw, 1811).
Picaflor de garganta rojiza.
Distr.: Area 1 (Baradero, Escobar, La Plata).

Orden CORACIFORMES (*Coraciiformes*).
Suborden ALCEDINOS (*Alcedines*).
Familia ALCEDINIDOS (*Alcedinidae*).

214. *Megaceryle torquata stellata*. (Meyen, 1834).
Martín pescador grande del sur.
Distr.: Area 4 (sin localidad especificada).
215. *Megaceryle torquata torquata*. (L., 1766).
Martín pescador grande. Matraca.
Distr.: Area 1.

216. *Chloroceryle amazona*. (Latham, 1790).
Martín pescador mediano.
Distr.: Areas 1 y 3.
217. *Chloroceryle americana mathewsi*. Laubmann, 1927.
Martín pescador chico. Martín chico.
Distr.: Areas 1 y 3.

Orden PICIFORMES (*Piciformes*).

Suborden PICOS (*Pici*).

Familia PICIDOS (*Picidae*).

Subfamilia PICINOS (*Picinae*).

218. *Colaptes campestroides*. (Malherbe, 1849).
Carpintero campestre.
Distr.: Toda la provincia.
219. *Leuconerpes candidus*. (Otto, 1796).
Carpintero blanco. Tura.
Distr.: Ocasional en área 1 (Baradero).
220. *Chrysoptilus melanolaimus perplexus*. Cory, 1919.
Carpintero de gorro rojo.
Distr.: Areas 1 y 3.
221. *Scapanus leucopogon*. (Valenciennes, 1826).
Carpintero negro de lomo blanco.
Distr.: Ocasional en área 1 (Baradero).
222. *Dyctiopicus mixtus mixtus*. (Boddaert, 1783).
Carpintero chorreado.
Distr.: Area 1.

Orden PASERIFORMES (*Passeriformes*).

Familia DENDROCOLAPTIDOS (*Dendrocolaptidae*).

223. *Lepidocolaptes angustirostris praedatus*. (Cherrie, 1916).
Trepador del litoral.
Distr.: Area 1 (Capital Federal y alrededores).
224. *Drymornis bridgesi*. (Eyton, 1849).
Chinchero grande.
Distr.: Area 1 (Monte Grande).

Familia FURNARIDOS (*Furnariidae*).
Subfamilia FURNARINOS (*Furnariinae*).

225. *Geositta cunicularia cunicularia*. (Vieillot, 1816).
Camenera. Corre caminos.
Distr.: Toda la provincia.
226. *Furnarius rufus rufus*. (Gmelin, 1788).
Hornero. Casero. Caserito.
Distr.: Toda la provincia.
227. *Cinclodes fuscus fuscus*. (Vieillot, 1818).
Meneacola.
Distr.: Toda la provincia.
228. *Upucerthia dumetaria dumetaria*. Geoffroy, 1832.
Bandurrita común.
Distr.: Toda la provincia.
229. *Limnornis curvirostris*. Gould, 1839.
Pajera pico curvo.
Distr.: Area 1.

Subfamilia SINALAXINOS (*Synallaxinae*).

230. *Phleocryptes melanops melanops*. (Vieillot, 1817).
Junquero. Siete cuchillas común.
Distr.: Toda la provincia.
231. *Leptasthenura aegitaloides vallida*. Dabbene, 1920.
Arañero. Siete colas.
Distr.: Area 4 (Río Negro).
232. *Leptasthenura platensis*. Reichenbach, 1853.
Coludito copetón. Siete colas.
Distr.: Areas 1 y 3.
233. *Schoeniophylax phryganophila*. (Vieillot, 1817).
Chotoy.
Distr.: Area 1 (Avellaneda, Punta Lara).
234. *Synallaxis albescens australis*. Zimmer, 1935.
Pijuí. Todavoz.
Distr.: Area 1.

235. *Synallaxis frontalis frontalis*. Pelzeln, 1859.
Pijuí común; Roraima.
Distr.: Area 1 (San Isidro, Avellaneda).
236. *Synallaxis spixi spixi*. Sclater, 1856.
Pijuí. Chicli.
Distr.: Area 1.
237. *Certhiaxis cinnamomea russeola*. (Vieillot, 1817).
Curutié.
Distr.: Area 1.
239. *Cranioleuca sulphurifera*. (Burmeister, 1868).
Garganta amarilla.
Distr.: Areas 1, 3 y 4.
240. *Asthenes baeri*. (Berlepsch, 1906).
Coludo. Canastero argentino.
Distr.: Area 1 (Río Santiago).
241. *Asthenes hudsoni*. (Sclater, 1874).
Canastero. Cola aguda. Punera.
Distr.: Areas 1, 2, 3.
242. *Asthenes maluroides*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).
Canasterito. Coludo enano.
Distr.: Areas 1, 3, 4.
243. *Asthenes modesta australis*. Hellmayr, 1925.
Canastero. Coludo.
Distr.: Area 4 (Río Negro, Sierra de la Ventana).
244. *Asthenes patagónica*. (d'Orbigny, 1839).
Canastero patagónico.
Distr.: Area 4 (Río Negro).
245. *Asthenes pyrrholeuca flavogularis*. (Gould, 1839).
Coludo. Canastero coludo.
Distr.: Toda la provincia.
246. *Phacellodomus ruber*. (Vieillot, 1817).
Espinero grande. Anumbí rojo de Azara.
Distr.: Area 1.
247. *Phacellodomus rufifrons sincipitalis*. Cabanis, 1883.
Espinero de frente roja.
Distr.: Area 1.

248. *Phacellodomus sibilatrix*. Scater, 1879.
Espinero.
Distr.: Area 1 (Pacheco, Monte Grande).
249. *Phacellodomus striaticollis striaticollis*. (Laffr. y d'Orb., 1838).
Leñatero. Espinero.
Distr.: Areas 1 y 3.
250. *Anumbius arumbi*. (Vieillot, 1817).
Añumbí. Leñatero. Espinero.
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia FILIDORINOS (*Phylidorinae*).

251. *Pseudoseisura lophotes*. (Reichenbach, 1853).
Caserote.
Distr.: Area 1 (orillas del Río de la Plata).
252. *Pseudoseisura gutturalis*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1838).
Caserote. Chuchumenta. Chorlote.
Distr.: Area 4 (Río Negro).
253. *Xenotistes rufosuperciliatus acritus*. (Oberholser, 1901).
Titirí.
Distr.: Area 1 (Capital Federal, La Plata).
254. *Xenotistes rufosuperciliatus oleagineus*. (Scater, 1884).
Titirí.
Distr.: Area 2.

Familia FORMICARIDOS (*Formicariidae*).

Subfamilia FORMICARINOS (*Formicariinae*).

255. *Thamnophilus ruficapillus ruficapillus*. Vieillot, 1816.
Choca menor. Batara.
Diestr.: Area 1.

Familia RINOCRIPTIDOS (*Rhinocryptidae*).

256. *Rhinocrypta lanceolata*. (Geoffroy, 1832).
Gallito de las rocas. Gallito de agua.
Distr.: Area 4 (orillas del Río Negro).

Familia COTINGIDOS (*Cotingidae*).

257. *Pachyramphus polychropterus spixi*. (Swainson, 1837).
Anambé común.
Distr.: Area 1.

Familia TIRANIDOS (*Tyrannidae*).

Subfamilia FLUVICOLINOS (*Fluvicolinae*).

258. *Agriornis microptera microptera*. Gould, 1839.
Zorzal de campo. Mero común.
Distr.: Toda la provincia.
259. *Agriornis montana leucura*. Gould, 1839.
Mero cordillerano del sur. Gaucho.
Distr.: Area 4 (Sierra de la Ventana).
260. *Xolmis cinerea*. (Vieillot, 1816).
Escarchero. Monjita escarchera.
Distr.: Areas 1 y 3.
261. *Xolmis coronata*. (Vieillot, 1823).
Animita. Monjita coronada. Aurora.
Distr.: Toda la provincia.
262. *Xolmis dominicana*. (Vieillot, 1823).
Monjita dominica. Monjita negra.
Distr.: Toda la provincia.
263. *Xolmis irupero*. (Vieillot, 1823).
Monjita blanca. Monjita. Irupero.
Distr.: Area 1.
264. *Xolmis murina*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).
Monjita. Tile.
Distr.: Areas 1, 2, 4.
265. *Xolmis rubetra*. (Burmeister, 1860).
Monjita rojiza. Diucón rojizo.
Distr.: Areas 1 y 4.
266. *Muscisaxicola macloviana mentalis*. Laffresnaye y d'Orbigny, 1837.
Tontito.
Distr.: Areas 1 y 4 (Lomas de Zamora, Rosas, Patagones, Bahía Blanca).
267. *Lessonia rufa rufa*. (Gmelin, 1789).
Soprepuesto común.
Distr.: Areas 1, 3, 4.

268. *Neoxolmis rufiventris*. (Vieillot, 1823).
Pájaro bobo. Cazamoscas. Pepoazá.
Distr.: Areas 1, 3, 4.
269. *Yetapa risora*. (Vieillot, 1824).
Yetapá chica. Tijereta de las pajas.
Distr.: Area 1 (Río Luján, Lomas de Zamora).
270. *Knipolegus aterrimus aterrimus*. Kaup, 1853).
Viudita de la sierra.
Distr.: Dudoso en el área 4.
271. *Phaeotriccus hudsoni*. (Sclater, 1872).
Remoloncito.
Distr.: Areas 1 y 4 (San Isidro, Río Negro, Río Colorado).
272. *Hymenops perspicillata perspicillata*. (Gmelin, 1789).
Pico de plata. Viudita.
Distr.: Areas 1, 2, 3 y marginal de la 4.
273. *Fluvicola pica albiventer*. (Spix, 1825).
Viudita. Viudita del agua. Pampita.
Distr.: Area 1.
274. *Pyrocephalus rubinus rubinus*. (Boddaert, 1783).
Churrinche.
Distr.: Areas 1 y 3.
275. *Satrapa icterophrys icterophrys*. (Vieillot, 1818).
Amarillo.
Distr.: Areas 1 y 3.
276. *Machetornis rixosa rixosa*. (Vieillot, 1819).
Pica buey. Ovejero. Margarita. Matadura. Domador.
Distr.: Areas 1 y 3.

Subfamilia TIRANINOS (*Tyranninae*).

277. *Muscivora tyrannus tyrannus*. (L., 1766).
Tijereta.
Distr.: Toda la provincia.
278. *Tyrannus melancholicus melancholicus*. Vieillot, 1819.
Benteveo real. Huequero.
Distr.: Presencia probable en el área 4 sin localidad especificada.

279. *Empidonomus aurantio-atrocristatus aurantio-atrocristatus*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).
Churí. Tuc.
Distr.: «Buenos Aires».
280. *Myiodynastes solitarius*. (Vieillot, 1819).
Benteveo chico. Solitario. Bicho overo. Huequero.
Distr.: Area 1.
281. *Pitangus sulphuratus bolivianus*. (Laffresnaye, 1852).
Benteveo. Bichofoe, Bienteveo. Pito Juan.
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia MIARQUINOS (*Myiarchinae*).

282. *Myiarchus swainsoni ferocior*. Cabanis, 1883.
Burlisto de pico crema. Burlisto ceniciento.
Distr.: Area 1 (Avellaneda).
283. *Myiarchus ferox australis*. Hellmayr, 1927.
Burlisto irré. Irré.
Distr.: Area 1 (sin localidad especificada).
284. *Empidonax euleri argentinus*. (Cabanis, 1868).
Guacará. Papa hormigas.
Distr.: Area 1 (Pachéco).
285. *Myiophobus fasciatus flammiceps*. (Temminck, 1822).
Mosqueta.
Distr.: Area 1.

Subfamilia EUSCARTMINOS (*Euscarthminae*).

286. *Pseudocolopteryx flaviventris*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).
Piojito amarillo.
Distr.: Areas 1 y 3.
287. *Pseudocolopteryx sclateri*. (Oustalet, 1892).
Doradito copetón.
Distr.: Area 1 (Las Rosas).
288. *Habrura pectoralis pectoralis*. (Vieillot, 1817).
Habrura. Tachurí.
Distr.: Areas 1 y 4 (Zelaya, Las Rosas, Bahía Blanca).

Subfamilia SERPOFAGINOS (*Serpophaginae*).

289. *Tachuris rubrigastra rubrigastra*. (Vieillot, 1817).
Siete colores de laguna. Papa-pirí.
Distr.: Toda la provincia.
290. *Spizitornis flavirostris flavirostris*. (Sclater y Salvin, 1876).
Cachurita pico amarillo.
Distr.: Dudosa en la provincia, sin cita documentada.
291. *Spizitornis parulus patagonicus*. Hellmayr, 1920.
Cachudita.
Distr. Area 4 (cercañas del Río Negro).
292. *Stigmatura budytoides flavocinerea*. (Burmeister, 1861).
Rabicano. Rabicano del sur.
Distr.: Area 4 (cercañas del Río Negro).
293. *Serpophaga nigricans*. (Vieillot, 1817).
Piojito gris. Oscurito. Piojito de las riberas.
Distr.: Areas 1 y 3.
294. *Serpophaga subcristata*. (Vieillot, 1817).
Piojito. Turí-turí. Tuí-tuí.
Distr.: Areas 1 y 3.
295. *Xenopsaris albinucha albinucha*. (Burmeister, 1868).
Tijerilla.
Distr.: Area 1 (orillas Río de la Plata, Tigre).

Subfamilia ELENINOS (*Elaeniinae*).

296. *Elaenia albiceps chilensis*. Hellmayr, 1927.
Fío fío. Silbador.
Distr.: Area 1.
297. *Elaenia parvirostris*. (Pelzeln, 1868).
Afrechero. Fío fío afrechero. Silbador.
Distr.: Areas 1 y 3.
298. *Elaenia strepera*. Cabanis, 1883.
Fío fío mediano. Ceniciento. Fío fío vocinglero.
Distr.: Accidental.
299. *Sublegatus modestus modestus*. (Wied, 1831).
Copetón.
Distr.: Area 1 (Isla Martín García).

Familia FITOTOMIDOS (*Phytotomidae*).

300. *Phytotoma rutila rutila*. Vieillot, 1818.
Quejón. Cortarramas. Queo. Carnerito.
Distr.: Areas 1 y 4.

Familia HIRUNDINIDOS (*Hirundinidae*).

301. *Progne chalybea domestica*. (Vieillot, 1817).
Golondrina doméstica. Golondrina azul doméstica.
Distr.: Areas 1 y 3.
302. *Progne modesta elegans*. Baird, 1865.
Golondrina negra doméstica.
Distr.: Areas 2, 3, 4.
303. *Phaeoprogne tapera fusca*. (Vieillot, 1817).
Golondrina de los hornos.
Distr.: Areas 1 y 3.
304. *Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota*. (Vieillot, 1817).
Golondrina de rabadilla parda.
Distr.: Areas 1 y 3.
305. *Stelgidopteryx ruficollis ruficollis*. (Vieillot, 1817).
Golondrina de los campos. Golondrina de garganta leonada.
Distr.: Area 1.
306. *Alopochelidon fucata*. (Temminck, 1822).
Golondrina chica. Golondrina de cara castaña.
Distr.: Area 1.
307. *Pygochelidon cyanoleuca patagonica*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).
Golondrina azul.
Distr.: Areas 1, 3, 4.
308. *Hirundo rustica erythrogaster*. Boddaert, 1783.
Golondrina tijereta.
Distr.: Toda la provincia.
309. *Iripodrocne albiventer*. (Boddaert, 1783).
Golondrina blanca.
Distr.: Dudosa para Capital Federal.
310. *Iripodrocne leucopyga*. (Meyen, 1834).
Golondrina rabadilla blanca.
Distr.: Areas 2, 3, 4.

311. *Iridoprocne leucorrhoea*. (Vieillot, 1817).
Golondrina de los campos.
Distr.: Areas 1 y 3.

Familia CORVIDOS (*Corvidae*).
Subfamilia GARRULINOS (*Garrulinae*).

312. *Cyanocorax chrysops chrysops*. (Vieillot, 1818).
Acahé. Urraca azul y blanca.
Distr.: Ocasional área 1.

Familia TROGLODITIDOS (*Troglodytidae*).

313. *Cistothorus platensis platensis*. (Latham, 1790).
Ratona de campo.
Distr.: Areas 1, 2, 3.
314. *Troglodytes musculus bonariae*. Hellmayr, 1919.
Tacuarita. Ratona. Ratona casera.
Distr.: Areas 1, 2, 3 y norte de la 4.
315. *Troglodytes musculus chilensis*. Lesson, 1830.
Ratona común. Tacuarita. Cucurucha. Ratona casera.
Distr.: Toda la provincia.

Familia MIMIDOS (*Mimidae*).

316. *Mimus patagonicus*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).
Calandria chica. Calandria de la sierra. Calandria de la Patagonia.
Distr.: Area 4 (Papín).
317. *Mimus saturninus modulator*. (Gould, 1836).
Calandria. Calandria común.
Distr.: Toda la provincia menos el sur de área 4.
318. *Mimus triurus* (Vieillot, 1818).
Calandria de tres colas. Calandria real.
Distr.: Areas 1, 2, 3.

Familia TURDIDOS (*Turdidae*).

319. *Turdus amaurochalinus*. Cabanis, 1851.
Zorzal blanco. Chalchalero. Mandioca. Saviá.
Distr.: Area 1.

320. *Turdus rufiventris rufiventris*. Vieillot, 1818.
Zorzal colorado.
Distr.: Area 1 (Baradero, Hudson).

Familia SILVIDOS (*Sylviidae*).

Subfamilia POLIOPTILINOS (*Poliophtilinae*).

321. *Poliophtila dumicola dumicola*. (Vieillot, 1817).
Piojito azulado.
Distr.: Areas 1 y 3.

Familia MOTACILIDOS (*Motacillidae*).

322. *Anthus correndera correndera*. Vieillot, 1818.
Cachirla. Cachila.
Distr.: Toda la provincia.
323. *Anthus furcatus furcatus*. Laffresnaye y d'Orbigny, 1837.
Cachirla de uña corta.
Distr.: Toda la provincia.
324. *Anthus hellmayri brasilianus*. Hellmayr, 1921.
Cachirla cimarrona.
Distr.: Area 1.
325. *Anthus lutescens lutescens*. Pucheran, 1855.
Cachirla chica. Cachirla enana.
Distr.: Areas 1, 2, 3.

Familia CICLARIDOS (*Cyclarhidae*).

326. *Cyclarhis gujanensis ochrocephala*. Tschudi, 1845.
Buen cantor. Juan chiviro.
Distr.: Area 1.

Familia VIREONIDOS (*Vireonidae*).

327. *Vireo virescens chivi*. (Vieillot, 1817).
Chivi chivi. Gaviero. Contra maestre.
Distr.: Area 1.

Familia COMPSOTLIPIDOS (*Compsothlypidae*).

328. *Compsothlypis pitayumi pitayumi*. (Vieillot, 1817).
Pitayumi.
Distr.: Areas 1 y 3.

329. *Geothlypis aequinoctialis velata*. (Vieillot, 1807).
Amarillito.
Distr.: Area 1.
330. *Basileuterus culicivorus auricapillus*. (Swainson, 1837).
Pola pula. Coronada.
Distr.: Area 1 (San Isidro).

Familia PLOCEIDOS (*Ploceidae*).

331. *Passer domesticus domesticus*. (L., 1758).
Gorrión. Considerada dañina.
Distr.: Toda la provincia. Introducido y naturalizado.

Familia ICTERIDOS (*Icteridae*).

332. *Archiplanus albirostris*. (Vieillot, 1816).
Boyero de alas amarillas.
Distr.: Area 1 (Delta).
333. *Archiplanus solitarius*. (Vieillot, 1816).
Boyero.
Distr.: Area 1.
334. *Molothrus badius badius*. (Vieillot, 1819).
Tordo bayo. Músico. Mulata. Tordo zaino.
Distr.: Areas 1, 2, 3 y norte de la 4.
335. *Molothrus bonariensis bonariensis*. (Gmelin, 1789).
Renegrado. Tordo.
Distr. Toda la provincia.
336. *Molothrus rufo-axillaris*. Cassin, 1866.
Tordo de pico corto. Violinista.
Distr.: Areas 1 y 3.
337. *Icterus cayenensis pyrrhopterus*. (Vieillot, 1819).
Boyerito. Tordo de cobijas canelas.
Distr.: Area 1.
338. *Agelaius ruficapillus ruficapillus*. Vieillot, 1819.
Varillero. Tordo de laguna cabeza canela.
Distr.: Areas 1 y 3.

339. *Agelaius thilius petersi*. Laubmann, 1934.
Alferez. Paleta.
Distr.: Areas 1 y 3.
340. *Xanthopsar flavus*. (Gmelin, 1788).
Tordo de cabeza amarilla.
Distr.: Areas 1, 2, 3.
341. *Amblyramphus holosericeus*. (Scopoli, 1786).
Federal. Juan soldado. Blandengue.
Distr.: Areas 1 y 3.
342. *Gnorimopsar chopi chopi*. (Vieillot, 1819).
Chopi. Charrúa. Tordo chaqueño. Guirá-hú.
Distr.: Area 1.
343. *Pseudoleistes guirahuro*. (Vieillot, 1819).
Guirahuro. Pecho amarillo guirahuro.
Distr.: Area 1 (Río de la Plata, Avellaneda).
344. *Pseudoleistes virescens*. (Vieillot, 1819).
Pecho amarillo. Dragón.
Distr. Toda la provincia.
345. *Leistes militaris superciliaris*. (Bonaparte, 1850).
Pecho colorado chico. Loica argentina. Tordo militar.
Distr.: Areas 1, 3 y norte de la 4.
346. *Pezites defilippii*. (Bonaparte, 1850).
Pecho colorado mediano.
Distr.: Areas 1 y 3.
347. *Pezites militaris militaris*. (L., 1771).
Pecho colorado grande. Loica. Loyca.
Distr. Toda la provincia.
348. *Dolichonyx oryzivorus*. (L., 1758).
Charlatán. Tordo charlatán.
Distr.: Area 1.

Familia TRAUPIDOS (*Thraupidae*).

349. *Tanagra chlorotica serrirostris*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).
Fruterito de la liga. Naranjerito de la liga.
Distr.: Area 1.

350. *Pipraeidea melanonota melanonota*. (Vieillot, 1819).
Pico punzón azul y canela.
Distr.: Area 1 (Moreno, Avellaneda).
351. *Calospiza castanonota*. (Sclater, 1910).
Tanagra espalda castaña.
Distr.: Area 1.
352. *Calospiza peruviana*. (Desmarest, 1806).
Tangara.
Distr.: Accidental en área 1 («Buenos Aires»).
353. *Stephanophorus diadematus*. (Temminck, 1823).
Cardenal azul. Lindo azul cabeza blanca.
Distr.: Area 1.
354. *Thraupis bonariensis bonariensis*. (Gmelin, 1789).
Naranjero. Siete colores. Frutero. San Lucía.
Distr.: Areas 1 y 3.
355. *Thraupis cyanoptera*. (Vieillot, 1817).
Sanasú.
Distr.: Accidental en área 1 (vecindad de Capital Federal).
356. *Thraupis sayaca sayaca*. (L., 1766).
Azulejo. Frutero azulejo del Litoral. Sahiobí.
Distr.: Area 1.
357. *Piranga flava flava*. (Vieillot, 1822).
Fueguero.
Distr.: Area 1.
358. *Tachypomus rufus*. (Boddaert, 1783).
Frutero.
Distr.: Area 1.

Familia FRINGILIDOS (*Fringillidae*).

Subfamilia RICHMONDENINOS (*Richmondininae*).

359. *Saltator aurantiirostris aurantiirostris*. Vieillot, 1817.
Pepitero. Pepitero común. Juan Chiviro común.
Distr.: Area 1.
360. *Saltator coerulescens coerulescens*. Vieillot, 1817.
Pico grueso. Juan chiviro pico grueso. Habiero. Habá ceniciento.
Distr.: Area 1 (Baradero).

361. *Gubernatrix cristata*. (Vieillot, 1817).
Cardenal amarillo.
Distr. Toda la provincia.
362. *Paroaria coronata*. (Miller, 1766).
Cardenal.
Distr.: Areas 1 y 3.
363. *Paroaria capitata*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).
Cardenal sin copete. Capitá.
Distr.: Area 1.
364. *Cyanoloxia glauco-caerulea*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).
Azulejo. Azulejo chico.
Distr.: Area 1.

Subfamilia CARDUELINOS (*Carduelinae*).

365. *Sporophila caerulescens caerulescens*. (Vieillot, 1817).
Corbatita común. Gargantilla.
Distr.: Areas 1, 3 y norte de la 4.
366. *Sporophila collaris melanocephala*. (Vieillot, 1817).
Corbatita dominó. Dominó. Corbatita del Paraguay.
Distr.: Area 1.
367. *Sporophila minuta hypoxantha*. Cabanis, 1851.
Paraguayito. Corbatita paraguayito.
Distr.: Area 1 (Zelaya).
368. *Sporophila obscura obscura*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).
Corbatita semillera. Semillero.
Distr.: Area 1.
369. *Sporophila plumbea plumbea*. (Wied, 1830).
Patativa. Corbatita patativa.
Distr.: Area 1 (Zelaya).
370. *Sporophila ruficollis*. Cabanis, 1851.
Corbatita rojiza.
Distr.: Area 1 (Zelaya).
371. *Catamania analis analis*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).
Semillero común. Corbatita gris.
Distr.: Area 2 (Santa Elena).

372. *Volatinia jacarina jacarina*. (L., 1766).
Sierra sierra.
Distr.: Area 1 (Tigre, Rosas).
373. *Spinus magellanicus magellanicus*. (Vieillot, 1805).
Cabecita negra. Cabecita negra del oeste.
Distr. Toda la provincia.
374. *Spinus magellanicus tucumanus*. Todd, 1926.
Cabecita negra.
Distr.: Ocasional en área 1 (Quilmes).
375. *Sicalis flaveola pelzelni*. Sclater, 1872.
Jilguero. Doradito.
Distr.: Areas 1, 3 y norte de la 4.
376. *Sicalis luteola luteiventris*. (Meyen, 1834).
Misto. Misto cimarrón.
Distr. Toda la provincia.

Subfamilia EMBERIZINOS (*Emberizinae*).

377. *Diuca diuca minor*. Bonaparte, 1850.
Diuca chica.
Distr.: Area 4 (Río Negro).
378. *Phrygilus gayi caniceps*. Burmeister, 1860.
Come sebo chico.
Distr.: Ocasional en área 4 (Sierra de la Ventana).
379. *Phrygilus carbonarius*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).
Frigilo negro.
Distr.: Area 4 (Carmen de Patagones).
380. *Phrygilus fruticeti fruticeti*. (Kittlitz, 1832).
Yal-yal. Rara negra.
Distr.: Area 4 (Carmen de Patagones).
381. *Haplospiza unicolor*. Cabanis, 1851.
Cigarra.
Distr.: Area 1 (San Pedro).
382. *Coryphospingus cucullatus rubescens*. (Swainson, 1825).
Ará-guirá. Brasita de fuego.
Distr.: Area 1.

383. *Myospiza humeralis xanthornus*. (Gould, 1839).
Cachirlito. Manimbé.
Distr.: Toda la provincia.
384. *Zonotrichia capensis hypoleuca*. (Todd, 1915).
Chingolo.
Distr.: Toda la provincia.
385. *Donacospiza albifrons*. (Vieillot, 1817).
Monterita.
Distr.: Areas 1 y 3.
386. *Poospiza lateralis cabanisi*. Bonaparte, 1850.
Miente mi tío. Siete colores de rabadilla roja.
Distr.: Area 1.
387. *Poospiza melanoleuca*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).
Chivi chivi. Siete vestidos blanco y negro.
Distr.: Area 1 (Escobar).
388. *Poospiza nigro-rufa nigro-rufa*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).
Siete vestidos común.
Distr.: Areas 1, 3, 4.
389. *Poospiza ornata*. (Leybold, 1865).
Siete vestidos chico. Siete vestidos pintado.
Distr.: Area 1.
390. *Poospiza torquata pectoralis*. Todd, 1922.
Siete vestidos de collar. Quién te vistió de collar.
Distr.: Area 2 (Santa Elena).
391. *Embernagra platensis platensis*. (Gmelin, 1789).
Juan Chiviro de las pajas. Verdón.
Distr.: Toda la provincia.
-

Clase MAMIFEROS (*Mammalia*).
Orden MARSUPIALES (*Marsupialia*).
Familia DIDELFIDOS (*Didelphidae*).

1. *Didelphis paraguayensis paraguayensis*. Oken, 1816.
Comadreja overa. Comadreja picaza. Mbicuré. Micuré.
Considerada dañina.
Distr.: Toda la provincia.

2. *Lutreolina crassicaudata bonaria*. Thomas, 1923.
Comadreja colorada. Mbicuré-pitá. Coligrueso.
Considerada dañina.
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.
3. *Minuania fosteri*. (Thomas, 1925).
Minuania argentina.
Distr.: Sierra de la Tinta en partido de Juárez; probablemente dominio central.
4. *Marmosa pallidior*. (Thomas, 1902).
Achocaya común.
Distr.: Dominio central (Sierra de la Ventana).

Orden QUIROPTEROS (*Chiroptera*).

Familia FILOSTOMIDOS (*Phyllostomidae*).

5. *Glossophaga soricina soricina*. (Pallas, 1766).
Vampiro atrapa moscas.
Distr.: Dominio subtropical. (La Plata, Capital Federal).
6. *Sturnira lilium lilium*. (Geoffroy, 1810).
Falso vampiro flor de lis.
Distr.: Dominio subtropical.

Familia VESPERTILIONIDOS (*Vespertilionidae*).

7. *Myotis albescens*. (Geoffroy, 1806).
Murciélago chico de vientre blanco.
Distr.: Dominios subtropical, pampásico y central.
8. *Myotis chiloensis alter*. Miller y Allen, 1928.
Murciélago oreja de ratón.
Distr.: Dominio subtropical.
9. *Histiotus montanus*. (Philippi y Landbeck, 1861).
Murciélago orejudo. Murciélago orejón.
Distr.: Dominio subtropical, y probablemente dominio pampásico.
10. *Lasiurus borealis blossevillii*. (Lesson y Garnot, 1826).
Murciélago colorado. Murciélago boreal rojizo.
Distr.: Dominios subtropical, pampásico y central.
11. *Lasiurus cinereus villosissimus*. (Geoffroy, 1806).
Murciélago pardo blanquizo de Azara.
Distr.: Dominios subtropical y pampásico hasta la altura de Mar del Plata.

12. *Dasypterus ega argentinus*. Thomas, 1901.
Murciélago leonado.
Distr.: Dominio subtropical.

Familia MOLOSIDOS (*Molossidae*).

13. *Tadarida brasiliensis*. (Geoffroy, 1824).
Murciélago cola de ratón.
Distr.: Toda la provincia.
14. *Eumops bonariensis bonariensis*. (Peters, 1874).
Pequeño moloso de Buenos Aires.
Distr.: Dominio subtropical (Capital Federal, La Plata), y probablemente nordeste del dominio pampásico.

Orden CARNIVOROS (*Carnivora*).
Suborden FISIPEDIOS (*Fissipedia*).
Familia CANIDOS (*Canidae*).

15. *Pseudalopex gymnocercus antiquus*. (Ameghino, 1889).
Zorro gris común. Zorro de la Pampa. Aguaracháí.
Considerada dañina.
Distr.: Toda la provincia.
16. *Pseudalopex gracilis patagonicus*. (Philippi, 1860).
Zorro.
Distr.: Probablemente dominio patagónico.

Familia MUSTELIDOS (*Mustelidae*).
Subfamilia MUSTELINOS (*Mustelinae*).

17. *Galictis cuja huronax*. (Thomas, 1921).
Hurón menor.
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.
18. *Lyncodon patagonicus patagonicus*. (Blainville, 1824).
Huroncito.
Distr.: Dominios patagónico y central hasta Bahía Blanca y Guaminí; dominio pampásico (Azul).
19. *Conepatus castaneus castaneus*. (d'Orbigny, 1847).
Zorrinito. Zorrino chico.
Distr.: Dominios patagónico y central.

20. *Conepatus suffocans gibsoni*. Thomas, 1921.
Zorrino común. Zorrillo.
Distr.: Dominio pampásico.
21. *Conepatus suffocans pampanus*. Thomas, 1921.
Zorrino común. Zorrillo.
Distr.: Probablemente dominio central. (Bonifacio).

Subfamilia LUTRINOS (*Lutrinae*).

22. *Lutra platensis*. Waterhouse, 1839.
Lobito de río.
Distr.: Dominio subtropical.

Familia FELIDOS (*Felidae*).

Subfamilia FELINOS (*Felinae*).

23. *Lynchailurus pajeros pajeros*. (Desmarest, 1816).
Gato pajero. Gato de las pajas. Gato de pajonal.
Distr.: Toda la provincia. En retroceso numérico.
24. *Oncifelis geoffroyi*. (d'Orbigny, 1844).
Gato montés.
Distr.: Toda la provincia. En retroceso numérico.
25. *Puma concolor puma*. (Molina, 1782).
Puma. «León». Considerada dañina.
Distr.: Dominios central (Ventania), patagónico y probablemente pampásico (Sierra La Brava). En retroceso numérico.

Subfamilia PANTERINOS (*Pantherinae*).

26. *Panthera onca palustris*. (Ameghino, 1888).
Yaguareté. Jaguar. «Tigre» americano. «Jaguar».
Distr.: Dominio subtropical (Delta del Paraná). Ha desaparecido del resto de la provincia.

Suborden PINNIPEDOS (*Pinnipedia*).

Familia OTARIDOS (*Otaridae*).

27. *Otaria flavescens*. (Shaw, 1800).
Lobo marino. Lobo de un pelo.
Distr.: Costa atlántica y estuario del Río de la Plata. En retroceso numérico.

Familia FOCIDOS (*Phocidae*).

Subfamilia MONAQUINOS (*Monachinae*).

28. *Lobodon carcinophagus*. (Jacq. y Puch., 1842).
Foca cangrejera. Foca blanca. Lobo cangrejero.
Distr.: Accidentalmente en la costa atlántica. Hallazgos en el Río de la Plata (Río Santiago, San Isidro).

Subfamilia CISTOFORINOS (*Cystophorinae*).

29. *Mirounga leonina*. (L., 1758).
Elefante marino. Elefante marino del sur.
Distr.: Accidental en la costa atlántica. En retroceso numérico.

Orden ROEDORES (*Rodentia*).

Suborden MIOMORFOS (*Myomorpha*).

Familia CRICETIDOS (*Cricetidae*).

30. *Oryzomys flavescens*. (Waterhouse, 1837).
Colilargo del Plata.
Distr.: Dominio subtropical (Isla Ella en el Delta; La Plata), probablemente dominio pampásico.
31. *Oryzomys delticola*. Thomas, 1917.
Colilargo.
Distr.: Dominio subtropical. (Isla Ella en el Delta).
32. *Phyllotis xanthopygus*. (Waterhouse, 1837).
Pericote de nalga amarillenta.
Distr.: Dominios patagónico y central hasta Bahía Blanca.
33. *Graomys griseoflavus griseoflavus*. (Waterhouse, 1837).
Rata amarillenta grande.
Distr.: Dominio patagónico.
34. *Eligmodontia elegans*. (Waterhouse, 1837).
«Eligmodonte».
Distr.: Dominio central (Bahía Blanca).
35. *Akodon arenicola hunteri*. Thomas, 1917.
Ratón de las arenas.
Distr.: Dominio subtropical (Isla Ella en el Delta).
36. *Akodon arenicola beatus*. (Thomas, 1919).
Ratón de las arenas.
Distr.: Dominio pampásico.

37. *Akodon benefactus*. Thomas, 1919.
Distr.: Unica localidad Bonifacio.
38. *Akodon iniscatus iniscatus*. Thomas, 1919.
Distr.: Unica localidad Bahía Blanca.
39. *Hesperomys murillus murillus*. Thomas, 1916.
Laucha de campo mediana.
Distr.: Dominio pampásico (La Plata, Ensenada, Los Talas, Bahía Blanca).
40. *Hesperomys gracilipes*. (Waterhouse, 1837).
Distr.: Dominio central (Bahía Blanca).
41. *Hesperomys bimaculatus bimaculatus*. (Waterhouse, 1837).
Laucha manchada. Ratón manchado.
Distr.: Dominio subtropical (La Plata).
42. *Hesperomys bimaculatus bonariensis*. Osgood, 1933.
Laucha manchada. Ratón manchado.
Distr.: Dominio central (Bahía Blanca).
43. *Hesperomys laucha*. (Desmarest, 1819).
Laucha.
Distr.: Capital Federal.
44. *Oxymycterus nasutus*. (Waterhouse, 1837).
Ratón hocicudo. Hocicudo.
Distr.: Dominio subtropical.
45. *Oxymycterus platensis*. Thomas, 1914.
Hocicudo.
Distr.: Dominio subtropical (Isla Ella del Delta; Río Santiago).
46. *Reithrodon auritus auritus*. (Desmarest, 1819).
Ratón conejo de las pampas. Orejón.
Distr.: Probablemente dominio central.
47. *Reithrodon auritus marinus*. Thomas, 1920.
Ratón conejo de las pampas. Orejón.
Distr.: Mar del Plata, probablemente zona costera del dominio pampásico.
48. *Reithrodon typicus typicus*. Waterhouse, 1837.
Ratón conejo. Orejón.
Distr.: Dominio subtropical (Baradero).
49. *Holochilus darwini*. Thomas, 1897.
Rata de agua.
Distr.: Bahía Blanca.

50. *Holochilus vulpinus*. (Brants, 1827).
Rata de bañado. Ratón nutria.
Distr.: Dominio subtropical.
51. *Scapteromys aquaticus*. Thomas, 1920.
Rata acuática grande.
Distr.: Dominio subtropical (Río Carabelas e isla Ella en el Delta).
52. *Scapteromys tomentosus*. (Lichtenstein, 1830).
Rata acuática.
Distr.: Dominio subtropical (isla Ella en el Delta).
53. *Scapteromys tumidus*. (Waterhouse, 1837).
Rata acuática.
Distr.: Dominio subtropical (Río Capitán, en el Delta; La Plata).
54. *Deltamys kempi*. Thomas, 1917.
Distr.: Dominio subtropical (isla Ella en el Delta).

Suborden HISTRICOMORFOS (*Hystricomorpha*).
Familia CHINCHILIDOS (*Chinchillidae*).

55. *Lagostomus maximus maximus*. (Blainville, 1817).
Vizcacha. Vizcacha de la Pampa. Considerada plaga.
Distr.: Dominio pampásico; falta en la parte norte y en la faja costera.
56. *Lagostomus maximus petillidens*. Hollister, 1914.
Vizcacha. Vizcacha de la Pampa. Considerada plaga.
Distr.: Dominios patagónico y central con leve penetración al sur del pampásico.

Familia CTENOMIDOS (*Ctenomyidae*).

57. *Ctenomys talarum talarum*. Thomas, 1898.
Tuco de los talas. Tuco-tuco de los talas. Tucu-tuco de los talas.
Distr.: Franja de talaes del dominio pampásico, de Los Talas a Monte Veloz. (Río Santiago, Los Talas).
58. *Ctenomys talarum anthonii*. Thomas, 1910.
Tucu-tuco. Tuco. Oculto.
Distr.: Probablemente en la franja medanosa atlántica del dominio pampásico, desde Bahía Samborombón al sur (General Lavalle).
59. *Ctenomys porteوسي australis*. Rusconi, 1934.
Tucu-tuco acanelado. Tuco. Oculto.
Distr.: Necochea.

60. *Ctenomys portecousi portecousi*. Thomas, 1916.
Tucu-tuco. Tuco. Oculto.
Distr.: Sudoeste del dominio pampásico y probablemente dominio central (Bonifacio, Papín, El Inca, La Zanja).
61. *Ctenomys mendocinus recessus*. Thomas, 1912.
Tucu-tuco. Tuco. Oculto.
Distr.: Dominio central y quizás dominio patagónico (Bahía Blanca).

Familia CAPROMIDOS (*Capromyidae*).

62. *Myocastor coypus bonariensis*. (Geoffrey, 1805).
Quiyá. Falsa nutria. «Nutria». Coipo. Coipú.
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.

Familia CAVIDOS (*Caviidae*).

Subfamilia CAVINOS (*Caviinae*).

63. *Galea musteloides littoralis*. (Thomas, 1901).
Cuis. Cuis de dientes amarillos.
Distr.: Parte sur del dominio pampásico, central y probablemente patagónico (Quequén, Bahía Blanca).
64. *Microcavia australis australis*. (Geoffroy y d'Orbigny, 1833).
Cuis chico de las pampas. Cuis chico.
Distr.: Dominios patagónicos y central.
65. *Cavia pamparum*. Thomas, 1917.
Cuis. Cuis de la Pampa. Considerada plaga.
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.

Subfamilia DOLICOTINOS (*Dolichotinae*).

66. *Dolichotis patagonum patagonum*. (Zimmermann, 1780).
Mara. Marra. Liebre patagónica.
Distr.: Dominios patagónico y central. En retroceso numérico.

Familia HIDROQUERIDOS (*Hydrochoeridae*).

67. *Hydrochoerus hydrochaeris notialis*. Hollister, 1914.
Carpincho. Capibara.
Distr.: Dominio subtropical (Delta del Paraná).

Orden EDENTADOS (*Edentata*).

Suborden DASIPODOIDEOS (*Dasypodoidea*).

Familia CLAMYFORIDOS (*Chlamyphoridae*).

68. *Chlamyphorus truncatus minor*. Lahille, 1895.
Pichi ciego. Pichi ciego menor.
Distr.: Dominio central (Bahía Blanca, Chasicó).

Familia DASIPODIDOS (*Dasypodidae*).

69. *Tolypeutes matacos*. Desmarest, 1804.
Mataco. Quirquincho bola. Bolita.
Distr.: Dominios central y patagónico.
70. *Chaetophractus villosus*. (Desmarest, 1819).
Peludo. Quirquincho peludo.
Distr.: Toda la provincia.
71. *Zaedyus pichiy pichiy*. (Desmarest, 1804).
Piche. Piche de orejas cortas.
Distr.: Dominio central (Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, Bonifacio).
72. *Dasypus septemcinctus*. (Schreiber, 1775).
Mulita. Tatú mulita.
Distr.: Toda la provincia.

Orden ARTIODACTILOS (*Artiodactyla*).

Familia CAMELIDOS (*Camelidae*).

73. *Lama guanicoe guanicoe*. (Müller, 1776).
Guanaco. Huanaco.
Distr.: Sierras del sistema de Ventania.

Familia CERVIDOS (*Cervidae*).

74. *Blastocerus dichotomus*. (Illiger, 1815).
Ciervo de los pantanos. Ciervo del Delta. Guazú pucú. Guazuncho.
Distr.: Dominio subtropical (Delta). En retroceso numérico.
75. *Ozotoceros bezoarticus celer*. Cabrera, 1943.
Venado. Guazú-tí. Ciervo de la pampa.
Distr. Dominio pampásico. En retroceso numérico acelerado; existiendo únicamente en la zona de General Lavalle.

Orden CETACEOS (*Cetacea*).
Suborden ODONTOCETOS (*Odontoceti*).
Familia INIDOS (*Iniidæ*).

76. *Stenodelphis blainvillei*. Gervais, 1847.
Delfín del Plata. Franciscana.
Distr.: Costa atlántica y Río de la Plata.

Familia DELFINIDOS (*Delphinidae*).

77. *Prodelphinus coeruleoalbus* (Meyen, 1833).
Delfín azul.
Distr.: Costa atlántica.
78. *Prodelphinus longirostris*. (Gray, 1828).
Delfín de pico largo.
Distr.: Costa atlántica.
79. *Lagenorhynchus obscurus*. Gray, 1868.
Delfín oscuro. Delfín de Fitz Roy.
Distr.: Océano Atlántico hasta Mar del Plata.
80. *Phocaena dioptrica*. Lahille, 1912.
Marsopa de dos colores. Marsopa de anteojos.
Distr.: Hallada en el Río de la Plata. (Quilmes 1912; Río Santiago).
81. *Phocaena spinipinnis*. Burmeister, 1865.
Marsopa. Marsopa espinosa.
Distr.: Hallada frente a la desembocadura del Río de la Plata.
82. *Globicephalus melas*. (Traill, 1809).
Calderón.
Distr.: Costa atlántica (Mar del Plata).
83. *Pseudorca crassidens*. (Owen, 1846).
Falsa orca.
Distr.: Esporádicamente en la costa atlántica (bahía de Samborombón;
Mar del Plata 1946).

Familia ZIFIDOS (*Ziphiidae*).

84. *Tursiops geophysus*. Lahille, 1908.
Tursión.
Distr.: Hallado únicamente en el Río de la Plata (Quilmes 1904, Punta
Lara 1907).

85. *Tursiops truncatus*. (Montagu, 1821).
Tursión común.
Distr.: Océano Atlántico, penetrando en el Río de la Plata (Punta Blanca 1951).
86. *Ziphius cavirostris*. Cuvier, 1823.
Zifio común.
Distr.: Accidentalmente en la costa atlántica (Mar del Plata).
87. *Berardius arnouxii*. Duvernoy, 1851.
Ballena marsopa.
Distr.: Accidentalmente en la costa atlántica, habiéndose hallado en el Río de la Plata (desembocadura del arroyo El Pescado 1918).
88. *Hyperoodon planifrons*. Flower, 1882.
Gran calderón.
Distr.: Accidentalmente en la costa atlántica.

Suborden MISTACOCETOS (*Mystacoceti*).
Familia BALENOPTERIDOS (*Balaenopteridae*).

89. *Balaenoptera musculus*. (L., 1758).
Ballena azul. Rorcual, Rorcual gigante.
Distr.: Accidentalmente en la costa atlántica y del Río de la Plata (Miramar 1897; San Fernando).
90. *Balaenoptera physalus*. (L., 1758).
Rorcual. Rorcual común.
Distr.: Costa atlántica. Accidentalmente penetra en el Río de la Plata (San Fernando; Puerto de La Plata 1933).
91. *Balaenoptera acutorostrata*. Lacepede, 1803.
Rorcual menor. Ballena enana.
Distr.: Costa atlántica. Penetra en el Río de la Plata (hallazgos en Belgrano 1867; Puerto Buenos Aires 1907; Rivadavia 1917).
92. *Balaenoptera borealis*. Lesson, 1828.
Rorcual de Rudolphi.
Distr.: Ocasionalmente en la costa atlántica (hallazgo en Tres Arroyos).
93. *Megaptera nodosa*. Bonnaterre, 1789.
Ballena jorobada. Gubarta. Yubarta.
Distr.: Ocasionalmente en la costa atlántica (hallazgo en Punta del Indio).

Familia BALLENIOS (*Balaenidae*).

94. *Neobalaena marginata*. Gray, 1846.
Ballena pigmea.
Distr.: Accidentalmente en la costa atlántica.

ESPECIES EXOTICAS NATURALIZADAS

Orden ROEDORES (*Rodentia*).

Suborden MIOMORFOS (*Myomorpha*).

Familia MURIDOS (*Muridae*).

95. *Rattus norvegicus norvegicus*. (Berkenhout, 1769).
Rata noruega. Rata. Considerada plaga.
96. *Rattus rattus rattus*. (L., 1758).
Rata negra. Rata. Considerada plaga.
97. *Rattus rattus alexandrinus*. (E. Geoffroy, 1803).
Rata alejandrina. Rata parda. Rata. Considerada plaga.
98. *Mus musculus musculus*. (L., 1758).
Ratón. Ratón minero. Laucha. Considerada plaga.

Orden LAGOMORFOS (*Lagomorpha*).

Familia LEPORIDOS (*Leporidae*).

99. *Lepus europaeus europaeus*. L., 1758.
Liebre. Liebre europea. Considerada plaga.
100. *Oryctolagus cuniculus cuniculus*. (L., 1758).
Conejo. Considerada plaga.

Orden ARTIODACTILOS (*Artiodactyla*).

Familia CERVIDOS (*Cervidae*).

101. *Axis axis*. Erxleben, 1777.
Ciervo axis. Considerada dañina.
102. *Cervus elaphus*. L., 1766.
Ciervo. Ciervo rojo. Considerada dañina.
103. *Dama dama* (L., 1766).
Gamo. Gamo europeo. Considerada dañina.

Familia SUIDOS (*Suidae*).

104. *Sus scrofa*. (L., 1766).
Jabalí. Considerada dañina.
105. *Sus scrofa domestica*. Gray, 1868.
Chancho cimarrón.

ADDENDA.

Serie PECES (*Pisces*).

Clase TELEOSTOMOS (*Teleostomi*).

Familia LORICARIDOS (*Loricariidae*).

Plecostomus plecostomus plecostomus. (L., 1766).

Vieja. Vieja de agua.

Distr.: Río de la Plata.

Clase AVES.

Familia LARIDOS (*Laridae*).

Larus fuscus. L., 1758.

Gaviota.

Distr.: San Blas (*accidental*).

Familia COLUMBIDOS (*Columbidae*).

Columba livia domestica, Gmelin, 1788.

Paloma.

Especie exótica asilvestrada.

INDICE DE NOMBRES VULGARES

PECES (en sentido amplio)			
Amarillito	105	Castañeta	143
Anchoíta de río	8	Chafalote	39
Anguila	135	Chanchita	142, 143, 144, 146
Anguila criolla	135	Chucho de río	2, 3
Apretador	66, 85	Chupa chupa	96
Armado	67	Corvina de río	138, 139, 140
Armado amarillo	69	Cucharita	93
Armado chanco	68, 70	Cucharón	93
Armado común	70		
		Dentado	36, 37
Bagarito	76	Dientudito	31
Bagre	61, 62, 71, 75, 80	Dientudo	29 a 38
Bagre amarillo	82	Dorado	28
Bagre anguila	73		
Bagre aterciopelado	60	Golondrina	43
Bagre blanco	79	Guitarrita	97, 98, 99
Bagre cantor	77		
Bagre chanco	72	Hocicón	65
Bagre colorado	66		
Bagre cruz blanca	66	Jahú	90
Bagre gris	77	Juanita	151
Bagre manchado	82	Juncalero	134
Bagre overo	82		
Bagre plateado	87	Lacha	6
Bagre porteño	76	Lamprea de bolsa	1
Bagre rojo	66	Lenguado de río	153, 154, 155
Bagre sapo	83, 84	Lepidosirena	4
Bagre tosquero	85	Limpia vidrios	114
Bagre trompudo	72, 74	Lisa	132
Bagrecito	78, 81	Loloch	4
Bandera	58		
Bandera argentina	1	Machete	39, 43
Barriga de fuego	105	Madre del agua	123
Basurero	105	Madrecita del agua	129
Boga	23	Mal anuncio	87
Bombilla	56	Mandufia	5
Buchona	44	Manduvá	63
		Manduví	64
Cabeza amarga	149, 151	Manguruyú	85, 90
"Camarón"	96	Manguruyú pará	90
Carapo	59	Mojarra	9 a 19, 41
Carpa	156	Mojarra de velo	44
Cascarudo	100	Mojarra pacusa	9

Moncholo	79
Morena negra	57
Morena pintada	59

Otuno	60
Overito	128

Pacú	53,	54
Pacucito	53, 54,	55
Palometa	47 a 51, 53 a 55,	143
Palometa negra	50	
Patí	86	
Patí bastardo	87	
Patí de aletas negras	88	
Pavito	124	
Pechito	42,	129
Peine	143	
Pejerrey	133	
Perca	137	
Perca espinuda	136	
"Pescado"	22	
Pez guitarra	99	
Pico de pato	93	
Pique	95	
Pirá-guirá	43	
Pirafía	48,	49
Pirapitá	40	
Porteñito	76	

Ratona	58	
Raya de río	2,	3

Sábalo	22	
Sabalito	26	
Sabalito plateado	27	
Salmón del Paraná	40	
San Pedro	147,	148
Sardina	5,	8
Sardina de río	7	
Señorita	56,	58
Surubí	91	
Surubí atigrado	92	
Surubí rayado	92	

Tachuela	102 a	105
Tarallita	46	
Tararira	46	
Tarucha	46	
Tritolo	24	
Trucha arco iris	157	
Trucha criolla	137	

Vieja	106 a 112, 118 a	122
Vieja de agua	107 a 111, 118 a	121

Vieja de cola	122,	123
Vieja de látigo	123	
Vieja de manitos	113	

BATRACIOS

Escuerzo	21	
Escuerzo chico	22	
Rana	10, 11, 12,	13
Rana común	11,	12
Rana criolla	11,	12
Ranita de zarzal	4, 5, 6, 7,	8
Sapo	2	
Sapo común	2	
Sapito enano	24	
Sapito panza amarilla	3	
Tapalcuá	1	

REPTILES

Amberé	16	
Caimán	48	
Crótalo	47	
Culebra	36	
Culebra acuática	27,	23
Culebra fiata	34	
Falsa coral	35,	36
Falsa yarará	34,	38
"Iguana"	18	
"Iguana" colorada	17	
"Iguana" overa	18	
Lagartija	8, 12 a 15,	20
Lagartija negra	19	
Lagarto colorado	17	
Lagarto overo	13	
Lagarto verde	21	
Laúd	1	
Madre de las hormigas	23	
Mbói-chumbé-guazú	43	
Mbói-hovich	39,	41
Mbói-pé-mi	38	
Mbói-pepé	25	
Nandurié	30,	31
Parapintos	29	
Tedyú-chi	16	
Teyuguazú	18	
Teyú-hoby	21	
Teyú-i	21	
Tortuga comestible	5	
Tortuga de arroyo	7	
Tortuga de mar	4,	5
Tortuga de río	2,	6
Tortuga de tierra	3	
Tortuga franca	4	
Tortuga laúd	1	
Víbora de cascabel	47	
Víbora de coral	43	

Víbora de cristal	25
Víbora de dos cabezas	22, 23
Víbora de la cruz	44
Víbora fiata	34
Yacaré	48
Yarará	44
Yarará chica	46
Yarará fiata	45

AVES

Acahé	312
Afrechero	297
Agachona	124, 146, 158
Aguapeazó	123
Aguatero	124
Aguila blanca	84, 85
Aguila cabeza blanca	84
Aguila colorada	82
Aguila coronada	91
Aguila de cola blanca	83
Aguila de la flecha	91
Aguila gris	87
Aguila langostera	88
Aguila negra	90
Aguila pescadora	90
Albatros	12, 15
Albatros de cejas negras	16
Albatros de pico amarillo y negro	13
Albatros real	14
Alfárez	329
Alma de gato	190
Amarillito	275, 329
Anambé común	257
Angelito	130
Animita	261
Anumbí rojo de Azara	246
Añapero	202
Añumbí	250
Ara-guirá	382
Arañero	231
Arenero	129
Ataja caminos	206
Atí	168
Aurora	261
"Avestruz"	1
Avutarda	55, 56
Avutarda colorada	58
Avutarda de cabeza gris	57
Azulejo	356, 364
Azulejo chico	364
Bandurria	46, 47, 49
Bandurria de verano	46
Bandurria de invierno	47
Bandurria mora	45

Bandurrita común	238
Eatara	255
Batiti	134
Batuirá	131
Becasa	137
Bacasa grande	147
Becasina	146
Becasina de mar	137
Becasina del sur	145
Becasina migratoria	144
Benteveo	281
Benteveo chico	280
Benteveo real	278
Bichofeo	281
Bicho overo	280
Bienteveo	281
Biguá	31
Biguá blanco	32
Biguá de vientre blanco	32
Blandengue	341
Boyero	333
Boyero de alas amarillas	332
Bramador	41
Brasita de fuego	382
Bruja	38
Puen cantor	326
Buho	196
Buho chico	195
Buho chuchumeco	199
Buho orejudo	199
Burlisto ceniciento	282
Burlisto de pico crema	282
Burlisto irré	283
Burrito	113, 114
Burrito de patas rojas	113
Burrito silbón	114
Cabecita negra	373, 374
Cabecita negra del oeste	373
Caburé	197
Cacuí	201
Cachila	322
Cachirla	322
Cachirla chica	325
Cachirla cimarrona	324
Cachirla de uña corta	323
Cachirla enana	325
Cachirlito	383
Cachudita	291
Cachudita pico amarillo	290
Caiquén	55, 56
Calancaté	182
Calandria	317
Calandria común	317
Calandria chica	316
Calandria de la Patagonia	316
Calandria de la sierra	316

Calandria de tres colas	318	Chorlo agachón	158
Calandria real	318	Chorlo boreal	140
Caminera	225	Chorlo cabezón	132
Canasterito	242	Chorlo canela	133
Canastero	241, 243	Chorlo de Hudson	136
Canastero argentino	240	Chorlo de invierno	133
Canastero coludo	245	Chorlo de pico corvo	135
Canastero patagónico	244	Chorlo dorado	128
Capitá	363	Chorlo garganta blanca acanelada ..	154
Caracara	98	Chorlo grande de patas amarillas ..	139
Caracolero	81	Chorlo grande de pico corvo	136
Carachilla	151	Chorlo gris	127
Carancho	98	Chorlo manchado	143
Carau	104	Chorlo menor de patas amarillas ..	138
Cardenal	362	Chorlo pampa	128
Cardenal amarillo	361	Chorlo playero de la Patagonia ..	130
Cardenal azul	353	Chorlo rejizo	148
Cardenal sin copete	363	Chorlo semipalmado	131
Carnerito	300	Chorlote	252
Carnero del Cabo	18	Chotoy	233
Carpintero blanco	219	Chuchumenta	252
Carpintero campestre	218	Chumulucuco	206
Carpintero chorreado	222	Churí	279
Carpintero de gorro rojo	220	Churrinche	274
Carpintero negro de lomo blanco ..	221	Cigarra	381
Caserito	226	Cigüeña	43
Casero	226	Cigüeña de cabeza pelada	42
Caserote	251, 252	Cisne	54
Cata común	184	Cisne blanco	54
Cauquén	55, 56	Cisne de cuello negro	53
Cazamoscas	268	Cocha polla	106, 116
Ceniciento	189, 298	Cola aguda	241
Chajá	52	Col-col	188
Chalchalero	319	Coludito copetón	232
Charlatán	348	Coludo	240, 243, 245
Charrúa	342	Coludo enano	242
Chichí	236	Come sebo chico	378
Chiflón	37	Contramaestre	327
Chimachima	96	Copetón	299
Chimango	96	Corbatita común	365
Chincheró grande	224	Corbatita del Paraguay	366
Chingolo	384	Corbatita dominó	366
Chiricote	109	Corbatita gris	371
Chivi-chivi	327, 387	Corbatita paraguayito	367
Choca menor	255	Corbatita patativa	369
Chochí	193	Corbatita rojiza	370
Choliba	195	Corbatita semillera	363
Chopf	342	Coronada	330
Chorlito blanco	149	Corta ramas	300
Chorlito de collar	129	Correcaminos	225
Chorlito de lomo negro	152	Cotorrita de Buenos Aires	184
Chorlito de manchas acaneladas ..	141	Crespin	193
Chorlito de mar	156	Crispin	193
Chorlito de tres colores	157	Cuaco	38
Chorlito palmeado	153	Cucillo de ojo colorado	189
Chorlito rabadilla blanca	151	Cucillo de pico amarillo	187
Chorlito solitario	142	Cucillo de pico negro	188

Cucurucha	315	Gallineta rojiza	109
Cuervillo de cañada	49	Gallinetita	118, 114
Cuervillo de cara pelada	48	Gallinetita de pintas blancas	115
Cuervo de cañada	49	Gallinetita enana	115
Cuervo negro	76	Gallito de agua	123, 256
Curutlé	237	Gallito de las rocas	256
Damero del cabo	18	Ganso blanco	54
Diuca chica	377	Garcita	34
Diucón rojizo	265	Garcita azulada	34
Domador	276	Garcita mirasol	40
Dominó	366	Garganta amarilla	239
Doradoito	375	Gargantilla	365
Doradito copetón	287	Garza blanca	35
Dormilón	38, 203, 204, 207	Garza blanca grande	35
Dormilón de cola larga	206	Garza colorada	39
Dormilona	158	Garza mora	33
Dragón	344	Gaucho	259
Escarchero	266	Gaviero	327
Espátula	50	Gavilán aplomado	94
Espátula rosada	50	Gavilán ceniciento	92
Espinerito	248	Gavilán de alas largas	93
Esp'nero	249, 250	Gavilán de garganta negra	86
Espínero de frente roja	247	Gavilán mixto común	89
Espínero grande	246	Gavilán oscuro y canela	89
Federal	341	Gavilán plumizo	94
Fío fío	296	Gavilán semicollarado	95
Fío fío afrechero	287	Gaviota ártica	172
Fío fío mediano	298	Gaviota cabeza parda	167
Fío fío vocinglero	298	Gaviota capucho café	167
Flamenco	51	Gaviota capucho gris	165
Frigilo negro	379	Gaviota cocinera	166
Fruterito de la liga	349	Gaviota cocinera de cola blanca y negra	164
Frutero	354, 358	Gaviota de cabeza gris	165
Frutero azulejo del litoral	356	Gaviota de cola larga	162
Fueguero	357	Gaviota de rapiña	163
Gallareta	120, 121, 122	Gaviotín	168
Gallareta de alas blancas	121	Gaviotín chico	173
Gallareta de ligas rojas	120	Gaviotín de caperuza y nuca blancas	174
Gallareta de pico rojo	122	Gaviotín de ceja blanca	173
Gallineta	107	Gaviotín de patas y pico negros	169
Gallineta antártica	105	Gaviotín mayor de pico anaranjado	175
Gallineta azul	119	Gaviotín real	175
Gallineta cara negra	117	Gaviotón	166
Gallineta con casco	118	Golondrina ártica	172
Gallineta de agua	110	Golondrina azul	307
Gallineta de los alfalfares	111	Golondrina azul doméstica	301
Gallineta de pico largo	107	Golondrina blanca	309
Gallineta de pico rojo	105	Golondrina chica	306
Gallineta enana	111	Golondrina de cara castaña	306
Gallineta enana de vientre amarillo	112	Golondrina de garganta leonada	305
Gallineta overa	108	Golondrina de los campos	305, 311
Gallineta pico rojo	116	Golondrina de los hornos	303
		Golondrina de mar	170
		Golondrina de mar de pico y dedos bermejos	171
		Golondrina de rabadilla parda	304

Golondrina doméstica	301	Loica	347
Golondrina negra doméstica	302	Loica argentina	345
Golondrina rabadilla blanca	310	Loro barranquero	183
Golondrina tijereta	308	Loro de cabeza roja	186
Gorrión	331	Loro de Castilla	185
Guacara	284	Loro de los palos	182
Guira-hu	342	Loro hablador	185
Guirahuró	343	Loro real	185
		Loyca	347
Había ceniciento	360	Macá	10
Habiero	360	Macá blanco	9
Habrura	288	Macá grande	11
Halcón azulado	80, 100	Macá mediano	10
Halcón blanco	78	Macá plateado	9
Halcón canela	103	Macacito	8
Halcón caracolero	81	Mandioca	319
Halcón cola tijera	79	Manimbé	383
Halcón peregrino	101	Margarita	276
Halcón peregrino del Norte	101	Martín chico	217
Halcón tijereta	79	Martín pescador chico	217
Halcón viajero	101	Martín pescador grande	215
Halcón viajero del Sur	102	Martín pescador grande del Sur ..	214
Halconcito	99, 103	Martín pescador mediano	216
Halconcito colorado	103	Martineta	5
Halconcito gris	99	"Martínetá" colorada	4
Hocó	39, 41	Martineta copetona	5
Hocó jasjeado	39	Matadura	276
Hornero	226	Matraca	215
Huequero	278, 280	Mbiguá	31
		Meneacola	227
Irré	283	Mero común	258
Irupero	263	Mero cordillerano del Sur	259
Jabirú	44	Miente mi tío	386
Jacana	123	Mirasol	36, 40
Jilguero	375	Mirasol grande	36
Jote	76, 77	Misto	376
Juan Chiviro	326	Misto cimarrón	376
Juan Chiviro común	359	Monjita	184, 263, 264
Juan Chiviro de las pajas	391	Monjita blanca	263
Juan Chiviro pico grueso	360	Monjita coronada	261
Juan soldado	341	Monjita dominica	262
Junquero	230	Monjita escarchera	260
		Monjita negra	262
Ladrón de pollos	92	Monjita rojiza	265
Lechucita de las cuevas	198	Monterita	385
Lechuza de campo	198	Mosqueta	285
Lechuza de las vizcacheras	198	Mulata	334
Lechuzón	200	Músico	334
Lechuzón de campo	200	Naranjerito de la liga	349
Lechuzón de iglesia	194	Naranjero	354
Lechuzón de los campanarios	194	Ñacundá	203
Lechuzón de los pajonales	200	Ñacurutí	196
Leñatero	249, 250	Ñacurutucito	195
Lindo azul cabeza blanca	353	Ñandú	1

Oscurito	293	Pepoazá	268
Ostrero	125	Perdiz	3
Ovejero	276	Perdiz chica	3
		Perdiz chica de Patagonia	2
Pájaro bobo	7, 268	Perdiz colorada	4
Pájaro niffo	7	Petrel	22
Pajera pico curvo	229	Petrel azulado	21
Paleta	339	Petrel común	18
Paloma ala colorada común	181	Petrel de las tormentas	28
Paloma antártica	159	Petrel de las tormentas de cara blanca	28
Paloma de monte	181	Petrel de Wilson	28
Paloma de monte de alas man- chadas	177	Petrel del Atlántico Norte	27
Paloma grande de alas manchadas	177	Petrel gigante	17
Paloma montaráz	181	Petrel grande	20
Paloma torcaz	179	Petrel gris	24
Paloma torcaz común	179	Petrel gris plateado	19
Paloma turca	178	Petrel negro de barba blanca	23
Palomita	180	Petrel oscuro de pico largo	26
Pampita	273	Petrel pardo y blanco	25
Papa hormigas	284	Petrel zambullidor de las Malvinas	30
Papa piri	289	Picaflor azul de garganta blanca ..	202
Paraguayito	367	Picaflor azul de garganta roja ..	210
Patativa	369	Picaflor bronceado	208
Pato argentino	67	Picaflor de corona rojo anaranjada	212
Pato barcino chico	64	Picaflor de gargantarojiza	213
Pato barcino grande	69	Picaflor verde común	211
Pato cabeza negra	72	Picabuey	276
Pato cara blanca	68	Picazuro	178
Pato colorado	66	Pico de estuche	159
Pato crestudo	62	Pico de plata	272
Pato criollo	61	Pico ronzón azul y canela	350
Pato crestón	73	Pico tijeras	176
Pato cuchara	71	Picu-f	180
Pato de ceja blanca	65	Pijuf	234, 236
Pato de collar	65	Pijuf común	235
Pato dominico	74	Pinchiraca	192
Pato fierro	74	Pingüín	7
Pato franciscano	64	Pingüín de penacho amarillo	6
Pato gargantilla	68	Pingüino	7
Pato maicero	69	Piojito	294
Pato negro	72	Piojito amarillo	286
Pato overo	70	Piojito azulado	321
Pato picazo	70, 73	Piojito de las riberas	293
Pato pico cuchara	71	Piojito gris	293
Pato portugués	63	Pirincho	192
Pato silbón común	60	Pirincho negro grande	191
Pato viuda	59	Pitiayumi	328
Pato zambullidor común	75	Pito Juan	281
Pecho amarillo	344	Pola pula	330
Pecho amarillo guirá-huro	343	Polla de agua	106, 108
Pecho colorado chico	345	Polla de agua común	118
Pecho colorado grande	347	Pollito de mar	150
Pecho colorado mediano	346	Pollona	118
Pepitero	359	Pollona azul	119
Pepitero común	359	Punera	241

Quebrantahuesos	17	Tile	264
Quejón	300	Titirí	253, 254
Queo	300	Todavoz	234
Quién te vistió de collar	390	Tontito	266
		Torcacita	180
Rabicano	292	Torcaza	179
Rabicano del Sur	292	Tordo	335
Rara negra	380	Tordo bayo	334
Ratona	314	Tordo chaqueño	342
Ratona casera	314, 315	Tordo charlatán	348
Ratona común	315	Tordo de cabeza amarilla	340
Ratona de campo	313	Tordo de cobijas canelas	337
Rayador	176	Tordo de laguna cabeza canela	338
Remoloncito	271	Tordo de pico corto	336
Renegrído	335	Tordo militar	345
Rey de los pajaritos	197	Tordo zaino	334
Roraima	235	Tórtola	179
		Trepador del litoral	223
		Tuc	279
Sacha pollito	150	Tui-tui	294
Sahlobí	356	Tura	219
Sanasú	355	Turí turí	294
Santa Lucía	354	Tuyango	43
Saviá	319	Tuyuyú	42
Semillero	368	Tuyuyú coral	44
Semillero común	371		
Sierra sierra	372	“Urraca”	192
Siete colas	231, 232	Urraca azul y blanca	312
Siete colores	354	Urutaú	201
Siete colores de laguna	289		
Siete colores de rabadilla roja	386	Varillero	338
Siete cuchillas común	230	Verdón	391
Siete vestidos blanco y negro	387	Viguá	31
Siete vestidos chico	389	Volinista	336
Siete vestidos común	388	Viuda loca	104
Siete vestidos de collar	390	Viudita	272, 273
Siete vestidos pintado	389	Viudita de la sierra	270
Silbador	296, 297	Viudita del agua	273
Sirirí	60		
Sirirí pampa	59	Yal yal	380
Skua	160, 161	Yetapá chica	269
Sobrepuesto común	267	Ypecahá	110
Solitario	280		
Suindá	200	Zambullidor	11
		Zorro de agua	38
Tacuarita	314, 315	Zorzal blanco	319
Tachurí	288	Zorzal colorado	320
Tanagra espalda castaña	351	Zorzal de campo	258
Tangara	352		
Tarpui	205		
Tente en el aire	211		
Tero	126		
Tero real	155		
Teru teru	126		
Tijereta	277		
Tijereta de las pajas	269		
Tijerilla	285		

MAMIFEROS

Achocaya común	4
Aguarachaí	15
Ballena azul	89

Ballena enana	91	Gran calderón	88
Ballena jorobada	93	Guanaco	73
Ballena marsopa	87	Guazuncho	74
Ballena pigmea	94	Guazú-pucú	74
Bolita	69	Guazú-tí	75
		Gubarta	93
Calderón	82		
Capibara	67	Hocicudo	44, 45
Carpincho	67	Huanaco	73
Ciervo	102	Hurón menor	17
Ciervo axis	101	Huroncito	18
Ciervo de la pampa	75		
Ciervo de los pantanos	74	Jabalí	104
Ciervo del Delta	74	"Jaguar"	26
Coipo	62		
Coipú	62	Laucha	43, 98
Coligrueso	2	Laucha de Azara	42
Colilargo	31	Laucha de campo mediana	39
Colilargo del Plata	30	Laucha manchada	41, 42
Comadreja colorada	2	"León"	25
Comadreja overa	1	Liebre	99
Comadreja picaza	1	Liebre europea	99
Conejo	100	Liebre patagónica	66
Cuis	63, 65	Lobito de río	22
Cuis chico	64	Lobito del Plata	21
Cuis chico de las pampas	64	Lobo cangrejero	23
Cuis de dientes amarillos	63	Lobo de un pelo	27
Cuis de la pampa	65	Lobo marino	27
		Lobo marino de un pelo	27
Delfín azul	77		
Delfín de Fitz Roy	79	Mara	66
Delfín de pico largo	78	Marra	66
Delfín del Plata	76	Mataco	69
Delfín obscuro	79	Marsopa	81
		Marsopa de anteojos	80
Elefante marino	29	Marsopa de dos colores	80
Elefante marino del Sur	29	Marsopa espinosa	81
"Eligmodonte"	34	Mbicuré	1
		Mbicuré-hú	1
Falsa nutria	62	Mbicuré-pitá	2
Falsa orca	83	Micuré	1
Falso vampiro flor de lis	6	Minuania argentina	3
Foca blanca	28	Mullta	72
Foca cangrejera	28	Mullta chica	72
Franciscana	76	Murciélago boreal rojizo	10
		Murciélago cola de ratón	13
Gamo	103	Murciélago colorado	10
Gamo europeo	103	Murciélago chico de vientre blanco	7
Gato de las pajas	23	Murciélago leonado	12
Gato de pajonal	23	Murciélago oreja de ratón	8
Gato montés	24	Murciélago orejón	9
Gato pajero	23	Murciélago orejudo	9
		Murciélago pardo blanquizco de Azara	11

"Nutria"	62	Rorcual de Rudolphi	92
Nutria roedora	62	Rorcual gigante	89
		Rorcual menor	91
Oculto	59, 60, 61	Quirquincho bola	69
Orejón	46, 47, 48	Quirquincho peludo	70
		Quiyá	62
Peludo	70	Tatú mulita	72
Pequeño moloso de Buenos Aires ..	14	"Tigre" americano	26
Pericote de nalga amarilla	32	Tuco	57, 58, 59, 60, 61
Piche	71	Tuco de los talas	57
Piche de orejas cortas	71	Tuco tuco de los talas	57
Pichiclego	68	Tucu-tuco	57, 58, 60, 61
Pichiclego menor	68	Tucu-tuco acanelado	59
Puma	25	Tucu-tuco de los talas	57
		Tursión	84
Rata	95, 96, 97	Tursión común	85
Rata acuática	52, 53	Vampiro atrapa moscas	5
Rata acuática grande	51	Venado	75
Rata alejandrina	97	Vizcacha	55, 56
Rata amarillenta grande	33	Vizcacha de la pampa	55, 56
Rata de agua	49	Yaguar	26
Rata de bañado	50		
Rata negra	96	Yaguareté	26
Rata noruega	95	Yubarta	93
Rata parda	97		
Ratón	98	Zifio común	86
Ratón conejo	48	Zorrillo	20, 21
Ratón conejo de las pampas .. 46,	47	Zorrinito	19
Ratón de agua	48	Zorrino común	20, 21
Ratón de las arenas	35, 36	Zorrino chico	19
Ratón hocicudo	44	Zorro	15, 16
Ratón del palo	4	Zorro de la pampa	15
Ratón manchado	41, 42	Zorro gris de la Patagonia	16
Ratón minero	98	Zorro gris común	15
Ratón nutria	50		
Rorcual	89, 90		
Rorcual común	90		

Versión Electrónica

Justina Ponte Gómez

División Zoología Vertebrados

FCNyM

UNLP

Jpg_47@yahoo.com.mx



DIRECCION

DE IMPRESIONES OFICIALES

DE LA

PROVINCIA DE BS AS

LA PLATA