

2010 Octubre, 2(1): 1-

## ¿PENSARÍA USTED EN SÍFILIS?

Autores: Vereza, Alejandra; Ochoa, Ana K.; Raffaelli, Rocío.

Lugar de Trabajo: Cátedra de Dermatología, Facultad de Ciencias Médicas, UNLP

e-mail de contacto (IMPORTANTE): dermatol@aetos.med.unlp.edu.ar

### Introducción

La sífilis es una enfermedad infecciosa prevalente, transmisible a la descendencia, de evolución crónica con períodos de actividad y latencia, con manifestaciones cutáneas, mucosas y viscerales, transmitida fundamentalmente por contacto sexual, curable si se diagnóstica en forma correcta y precoz, de denuncia obligatoria. Sus múltiples manifestaciones clínicas le han valido el título de “gran simuladora”, razón por la cual el médico debe sospecharla para realizar un correcto y oportuno diagnóstico.

### Objetivos

- Recordar que la sífilis puede simular numerosas entidades por lo cual es importante tenerla en cuenta a la hora del diagnóstico diferencial.
- Enfatizar la importancia de la investigación de contactos y de la denuncia de casos para llevar a cabo políticas sanitarias adecuadas.

### Materiales y métodos

Se presentan 5 pacientes con diagnóstico de sífilis secundaria de presentación inusual que concurren a la consulta dermatológica entre los años 2000 a 2008 al Servicio de Dermatología del HIGA “San Juan de Dios”

Caso 1: sexo femenino, 15 años, lesiones anulares en cuello.

Caso 2: sexo masculino, 55 años, lesiones papulosas y nodulares en tronco y raíz de miembros.

Caso 3: sexo femenino, 23 años, lesiones papulocostrosas diseminadas.

Caso 4: sexo masculino, 41 años, úlceras miembros inferiores.

Caso 5: sexo femenino, 36 años, pápulo-pústulas en rostro.

### Resultados

	<u>CASO 1</u>	<u>CASO 2</u>	<u>CASO 3</u>	<u>CASO 4</u>	<u>CASO 5</u>
<u>SEROLOGÍAS</u>					
<u>VDRL</u>	1/512	1/128	1/8	1/128	1/32
<u>HIV</u>	HIV -	HIV -	HIV +	HIV +	HIV-
<u>DIAGNÓSTICO</u>	sífilis secundaria tardía	sífilis secundaria nodular pseudolinfomatosa	sífilis maligna	sífilis secundaria (atípica)	sífilis secundaria simil rosácea

### Conclusiones

- A la hora de realizar diagnósticos clínicos presuntivos ante cuadros dermatológicos es importante PENSAR en Sífilis para poder diagnosticarla.
- Se debe informar a las autoridades pertinentes el caso índice ya que la sífilis es una ITS de denuncia obligatoria.
- Se deben investigar todos los contactos con el objetivo romper la cadena de contagio y realizar oportuno tratamiento.