MINISTERIO DE EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

TRANSPLANTES MUSCULARES
EN POLIOMIELITIS

Tesis para optar
al título de doc-
tor en medicina
presentada
por
RENE NEMER MASSUR

PADRINO DE TESIS
PROFESOR DOCTOR
VALENTIN C. GIRARDI

AÑO 1951

MINISTERIO DE EDUCACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

AUTORIDADES

RECTOR : Prof. Dr. Luis Irigoyen

VICERECTOR : Dr. Pedro G. Paternosto

SECRETARIO GENERAL INTERINO : Don Victoriano Pa Lucas

SECRETARIO ADMINISTRATIVO : Don Rafael G. Rosa

CONTADOR GENERAL : Horacio J. Blako.

CONSEJO UNIVERSITARIO

Prof. Dr. Pascual R. Corvini

Prof. Dr. Rodolfo Bossi

Prof. Dr. José F. Molfino

Prof. Dr. Pedro G. Paternosto

Prof. Dr. Carlos María Harispe

Prof. Dr. Horis del Proto

Prof. Dr. Eugenio Mordeglia

Prof. Dr. Obdulio A. Ferrari

Prof. Silvio Mengaricchio

Prof. Arturo Cambours Ocampo

Ingeniero Carlos Pascali

Ing. Ag. René R. F. Thiery

Ing. Ag. José María Cantigliano

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

AUTORIDADES

DECANO :

Prof. Dr. Pascual R. Corvini

VICEDECANO :

Prof. Dr. Diego M. Arguello (int.)

SECRETARIO :

Prof. Dr. Flavio J. Briasso

Oficial Mayor a cargo de Prosecretaría :

Sr. Rafael Lafuente

CONSEJO DIRECTIVO

PROF. DR. Alberto Gascón

- " " **Inocencio E. Canestrí**
- " " **Roberto Gandolfo Herrera**
- " " **Julio B. A. Obiglio**
- " " **Pómulio E. Lumbre**
- " " **Víctor A. W. Bach**
- " " **Victorio Nacif**
- " " **Enrique A. Votta**
- " " **Erminio L. M. Zetti**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

PROFESORES HONORARIOS

Dr. Rophillo Francisco

" Graco Nicolás V.

" Soto Mario L.

PROFESORES TITULARES

Dr. Arguello Diego E. - Cl. Oftalmológica

" Beldosarre Enrique C. - F. F. y T. Terapéutica

" Bionchi Andrés E. - Anatomía y H. Patológicas

" Casiro José A. - Patología quirúrgica

" Camestri Innocencio E. - Medicina Operatoria

" Carratellé Rogelio F. - Toxicología

" Carroño Carlos V. - Higiene y H. Social

" Cervini Pascual R. - Cl. Pediátrica y Pueric.

" Corezzi Eduardo S. - Patología Médica Ia.

" Christmann Federico E. D. - Cl. Quirúrgica Ila.

" D'Ovidio Francisco R. E. - P. y Cl. de la Tuberc.

" Errecart Pedro L. - Cl. Otorrinolaringológica

" Echeve Dionisio - Físico Biológica

" Floriani Carlos - Parasitología

" Gandolfo Herrera Roberto I. - Cl. Ginecológica

" Gascoña Alberto - Fisiología y Psicología

" Girardi Valentín J. - Ortopedia y Traumatología

" Gonzalez Hernán D. - Cl. de Pat. Inf. y P. Trop.

" Irigoyen Luis - Embriología e H. Normal

" Lambro Rómulo R. - Anatomía Ia.

" Loudot Osvaldo - Cl. Psiquiátrica

- Dr. Lyonnet Julio H. - Anatomía IIs.**
- " **Maciel Crespo Fidel A. - Semiología y Cl. Prop.**
 - " **Martinez Fiogo J.J. - Patología Médica IIs.**
 - " **Mazei Egidio S. - Cl. Médica IIs.**
 - " **Montenegro Antonio - Cl. Ginecología**
 - " **Maese Soto Alberto - Microbiología**
 - " **Montevardo Victorio - Cl. Obstétrica**
 - " **Obiglio Julio R. A. - Medicina Legal**
 - " **Othaz Ernesto L. - Cl. Dermatosifilográfica**
 - " **Rivas Carlos I. - Cl. Quirúrgica Ia.**
 - " **Rossi Rodolfo - Cl. Médica Ia.**
 - " **Sepich Marcelino J. - Cl. Neurológica**
 - " **Uslengui José P. - Radiología y Fisioterapia**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

PROFESORES ADJUNTOS

- Dr. Aguilar Giraldo Dolio J. - Cl. Pediat. Y Puor.
" Acovado Benigno S. - Química Biológica
" Andrieu Luciano M. - Cl. Médica Ia.
" Bach Víctor Eduardo A. - Cl. Quirúrgica Ia.
" Baglietto Luis A. - Medicina Operatoria
" Beilo Mario Raúl - Cl. Médica IIa
" Berani Luis T. - Cl. Dermatosifilográfica
" Bellingi José - Patología y Cl. de la Tuberc.
" Bigatti Alberto - Cl. Dermatosifilográfica
" Briasco Flavio J. - Cl. Pediatría y Puor.
" Caino Héctor V. - Cl. Médica Ia.
" Calzotta Raúl V. - Semiología y Cl. Propédeutica
" Cabarron Arturo - Cl. Médica Ia.
" Cerri Enrique L. - Parasitología
" Cartelli Natalio - Cl. Genitourológica
" Castedo César - Cl. Neurológica
" Castillo Odón Isidro - Ortopedia y Traumatología
" Ciafero Roberto - Cl. Psiquiátrica
" Conti Alcides L. - Cl. Dermatosifilográfica
" Correa Bustos Horacio - Cl. Oftalmológica
" Curcio Francisco I. - Cl. Neurológica
" Chesotta Néstor A. - Anatomía Ia.
" Dal Lago Héctor - Ortopedia y Traumatología
" De Lera Rogelio B. A. - Higiene y H. Social
" Dobric Beltran Leonardo L. - Pat. y Cl. de la Tuberc.

- Dr. Dragonezzi Arturo R. - Higiene y H. Social**
- " **Dussaut Alejandro - Medicina Operativa**
 - " **Fernandez Audicio Julio César - Cl. Ginecológica**
 - " **Fuertes Federico - Cl. de Inf. Inf. y P. Trop.**
 - " **Garibotto Remon C. - Patología Médica IIa.**
 - " **Garcia Olivera Miguel A. - Medicina Legal**
 - " **Giglio Irma C. de - Cl. Oftalmológica**
 - " **Giroto Rodolfo - Cl. Genitourológica**
 - " **Gorostazu Carlos Mario - Anatomía IIa.**
 - " **Gotusso Guillermo C. - Cl. Neurológica**
 - " **Guixé Héctor Lucio - Cl. Ginecológica**
 - " **Imbrisco Aldo Enrique - Fisiología**
 - " **Ingratta Ricardo W. - Cl. Obstétrica**
 - " **Lascano Eduardo Florencio - Anatomía y F. Patol.**
 - " **Logascio Juan - Patología Médica Ia.**
 - " **Lora Julio César - Higiene y H. Social**
 - " **Lozano Federico S. - Cl. Médica Ia.**
 - " **Mairetti José María - Cl. Quirúrgica Ia.**
 - " **Marguol Mauricio - Cl. Médica IIa.**
 - " **Marini Luis C. - Microbiología**
 - " **Martinez Joaquín D. A. - Semiología y Cl. Prop.**
 - " **Martini Juan Livio - Cl. Obstétrica**
 - " **Matusovich José - Cl. Otorrinolaringológica**
 - " **Meilij Elías - Pat. y Cl. de la Tuberc.**
 - " **Michellini Raúl T. - Cl. Quirúrgica IIa.**
 - " **Moreno Brandi José F. - Cl. Pediat. y Pueric.**
 - " **Morcedo Julio M. - Radiología y Fisioterapia**
 - " **Nacif Victorio - Radiología y Fisioterapia**

- Dr. Naveiro Rodolfo - Patología Quirúrgica**
- " Negrete Daniel Hugo - Patología Médica
 - " Pereira Roberto F. - Cl. Oftalmológica
 - " Prieto Elías Heriberto - Embriología e H. Normal
 - " Primi Abel - Cl. Otorrinolaringológica
 - " Peña Raúl P. - Cl. Quirúrgica Ia.
 - " Polizza Amleto - Medicina Operatoria
 - " Roselli Julio - Cl. Pediatría y Puéric.
 - " Ruera Juan - Patología Médica Ia.
 - " Sanchez Héctor J. - Patología Quirúrgica
 - " Schepoznik Fidel - Cl. Médica IIs.
 - " Taylor Gorostiaga Diego J. J. - Cl. Obstétrica
 - " Torres Manuel M. del C. - Cl. Obstétrica
 - " Trince Raúl E. - Cl. Quirúrgica IIs.
 - " Tropano Antonio - Microbiología
 - " Tolosa Emilio.- Cl. Otorrinolaringológica
 - " Tossi Bruno - Cl. Oftalmológica
 - " Vazni Edmundo O. - Semiología y Cl. Prop.
 - " Vazquez Pedro C. - Patología Médica IIs.
 - " Votta Enrique A. - Patología Quirúrgica
 - " Tau Ramón - Semiología , Cl. Prop.
 - " Zabludovich Salomón - Cl. Médica IIs.
 - " Zatti Hermínio L. M. - Cl. de Enf. Inf. y P. Trop.

A MIS PADRES

AL Dr. HECTOR GIGLIO

Al profesor
Dr. Valentín C. Girardi

TRANSPLANTES MUSCULARES EN POLIOMIELITIS

Transplante. Definición. Consiste en seccionar el tendón de un músculo sano a nivel de su inserción distal o en sus vecindades, o insertarlo sobre un punto determinado del esqueleto o de las partes blandas, en reemplazo de un músculo paralizado para suplirlo en su función, o con el objeto de restablecer el equilibrio funcional de una articulación alterada por la parálisis de uno o varios de sus músculos.

Fundamentos

1º - Reemplazar la acción de un músculo paralizado mediante el tendón de un músculo sano.

2º - Mejorar el aspecto de una región.

3º - Estabilizar un segmento del cuerpo afectado por la parálisis.

4º - Corregir una deformación

5º - Servir de rienda en un segmento determinado.

Principios del transplante tendinoso

1º - Elección cuidadosa del tendón a transplantar procurando que sea aproximadamente del grosor del tendón el cual reemplazará.

2º - Determinar el sitio de implantación y el trayecto que seguirá el tendón que no debe ser angulado sino oblicuo.

3º - Fijación cuidadosa y de acuerdo a la técnica que se elija: al periostio, a la aponeurosis, al músculo o a otro tendón.

4º - Que el tendón quede en un estado lo más aproximado posible al del tono normal del músculo, no muy flácido ni muy tenso.

5º - Buena hemostasia y el menor traumatismo posible del tendón a trasplantar.

6º - Uso de material adecuado a estas intervenciones.

7º - Meticulosa vigilancia y cuidados postoperatorios.

- -

Factores que condicionan el éxito de un trasplante

1º - Inmovilización rigurosa durante un tiempo variable entre 20 y 30 días en buena posición.

2º - Quitado el vendaje o el aparato onyesado, readucción funcional del músculo mediante movilización pasiva y activa.

3º - En los intervalos de la terapéutica, el paciente llevará férulas o aparatos que mantengan

el segmento en posición para evitar posteriores deformaciones.

4º - Elección y uso moderado de la fisioterapia adecuándola a cada caso en particular.

-

Requisitos que deben preceder a un trasplante.

1º - Que la parálisis muscular esté ya constituida y que no sea susceptible de mejoras con tratamiento ortopédico o fisioterápico, ni agravarse con la posterior evolución de la enfermedad.

2º - Corrección previa de la deformidad.

3º - Libre movilidad de la articulación sobre la cual actuará el músculo trasplantado.

4º - Elección cuidadosa de un músculo sano y estudio funcional y eléctrico de los músculos afectados.

- -

TECNICA GENERAL

Preoperatorio - Habitual

1erº Tiempo. Incisión sobre el extremo distal del músculo paralizado, lo suficientemente amplia como para reconducir el estafío vital de sus fibras.

2do. Tiempo. Incisión sobre el extremo distal del músculo a trasplantar, y sección de su tendón apro-

vechando el máximo utilizable.

3er. Tiempo. Exteriorización del cabo seccionado por la primera incisión.

4to. Tiempo. Nueva incisión esta vez sobre el lugar elegido para la fijación del tendón a trasplantar.

5to. Tiempo. Pasaje de una sonda de Codivilla entrando por la primera incisión y a través de la vaina del tendón paralizado, hasta que aparezca por la tercera incisión. Se ata al extremo superior de la sonda el cabo tendinoso movilizado, y se lo tracciona suavemente a través del túnel.

6to. Tiempo. Fijación.

a) Al Periostio. En el lugar de la tercera incisión se levanta con ligeros un puente perióstico y partes blandas vecinas. Por este puente se pasa el extremo del tendón y formando un asa, se lo fija a sí mismo y el puente mediante hilo de seda.

b) A la aponeurosis. Método poco usado.

c) A otro tendón. Técnica aconsejada por varios autores para miembro superior.

d) Al hueso. Con el trócano se labra un conducto en ángulo obtuso en el espesor del hueso; se redondean sus bordes con una cureta, se divide el tendón en dos partes o bien se le practica un ojal

y luego de pasado por el conducto se lo sutura asimismo.

7º Tiempo. Cierre por planos.

- -

A continuación se describen los trasplantes más comunmente usados deteniéndose particularmente en aquellos sobre los cuales se tiene experiencia en el Servicio de Poliomielitis y Ortopedia del Hospital de Niños de La Plata.

Trasplantes en particular

1 - En miembro superior

A) En la parálisis deltoidea

Operación de Ober. Consiste en el trasplante del biceps y el tríceps al acromion.

Técnica

1º - Incisión en montura practicada a nivel del hombro y cuyo trazo anterior desciende por la cara antero-interna del brazo en una extensión de unos 7.5 cms.

2º - Se pone al descubierto la apófisis coracoides y la porción corta del biceps separándola de aquella junto con un pequeño trozo de hueso y liberándola del nervio musculocutáneo.

3º - A través del trazo posterior de la incisión, se pone al descubierto y se desinserta junto con un pequeño trozo de hueso la porción larga del biceps en su inserción escapular, disecándolo luego de su inserción en la cuarta parte superior del húmero.

4º - Se practica una osteotomía en la extremidad saliente del acromion que se mantiene separada.

5º - Se suturan con seda los extremos libres del triceps y del biceps a los extremos posterior y anterior respectivamente de la hendidura ósea, para luego suturarlos entre sí.

6º - Cierre por planos y colocación de una férula con el brazo en ángulo recto.

Operación de Meyer. Consiste en prolongar el músculo trapecio mediante un tendón de fascia lata y fijarlo a nivel de la inserción humeral del deltoídes. Técnica. Modificada por el mismo en 1939 a raíz de su observación de que la forma triangular del deltoídes era una enorme ventaja mecánica para la abducción del brazo.

1º - Incisión en U que pone al descubierto el músculo trapecio que se disecciona.

2º - Incisión vertical que partiendo del scromion llega a la inserción humeral del deltoides.

3º - Se labra una escotadura en el húmero.

4º - Se secciona un segmento triangular de fascia lata cuya base alcance a 8 ó 10 cms. y de una longitud suficiente para alcanzar desde el trapecio hasta el deltoides.

5º - Se sutura este triángulo de fascia lata aplicando su superficie lisa en contacto con el scromion, a la cara profunda del trapecio. Fijando luego un segundo triángulo de fascia al borde lateral del primero y a la superficie exterior del trapecio.

6º - Colocado el hombro en abducción de 60° se suturan las porciones anterior y posterior del deltoides a los colgajos aponeuróticos.

7º - Se fijan a la escotadura practicada en el húmero los extremos de los triángulos de fascia.

8º - Cierre por planos.

En esta operación puede reemplazarse el trapecio, por el serrato anterior el pectoral mayor, el romboides etc. Está contraindicada cuando coincide con una subluxación de hombro.

Técnica

1ª - Incisión que desde la cara pósterolateral del húmero a 10 cms. por encima del epicóndilo, se extiende hasta 10 cms por debajo de la cabeza radial en la cara lateral del antebrazo.

2ª - Se ponen al descubierto el tendón del tríceps y el olecranon.

3ª - Se diseca el borde anterior del supinador largo hasta ver las ramas de los vasos y nervios radiales.

4ª - Se sutura el borde anterior libre de este músculo a la aponeurosis, al periostio y al tendón del tríceps.

5ª - Cierre por planos e inmovilización en férula de yeso con el brazo en extensión y supinación.

- -

D) En el codo pánulo o débil

Operación: Plastia de los flexores de Steindler. Consiste en lograr la flexión activa del codo, mediante una plastia que desplaza el origen de los flexores de la muñeca, haciendo que actúan como flexores del codo.

Técnica

1ª - Incisión que partiendo entre el borde in-

terno del braquial anterior y el triceps a 7.5 cms. por encima de la epitroclea se dirige hacia abajo y afuera de la cara anterior del antebrazo.

2º - Se disecciona con sus inserciones el origen de los músculos: pronador redondo, palmar mayor y cubital anterior, cuidando de rechazar el nervio cubital.

3º - Mediante disocación se aborda la cara interna del húmero entre los músculos triceps y braquial anterior, y de acuerdo a la reciente técnica del autor, se realizan perforaciones en el húmero.

4º - Mientras el codo es mantenido en flexión aguda, se atraen hacia arriba los músculos seccionados y se fijan pasando las suturas por las perforaciones hechas previamente.

5º - Cierre por planos e inmovilización en flexión aguda durante dos meses.

- -

E) En la parálisis de los supinadores o contractura de los pronadores.

Operación de Tubby - Consiste en unir mediante sutura los cuerpos musculares del palmar mayor y del pronador redondo.

Técnica. Se libera y secciona el tendón del palmar

mayor por encima de la muñeca y se lo sujete circularmente alrededor del radio después de pasarlo por su orificio practicado en la membrana interósea transformando así el pronador en supinador.

Operación de Steindler. Superior desde el punto de vista mecánico, consiste en llevar el tendón del cubital anterior al dorso de la extremidad inferior del radio.

Técnica:

1ª - Incisión que en la cara anterior del antebrazo abarca la mitad inferior del cubital anterior que una vez disecado se secciona a nivel de su inserción inferior.

2ª - Incisión dorsal trazada entre los tendones del extensor propio del índice y el extensor largo del pulgar, poniendo al descubierto el extremo inferior del radio.

3ª - Se hace pasar el tendón del cubital anterior a través de un túnel subcutáneo que va de una incisión a otra y reflejándolo alrededor del radio se lo sutura a si mismo convirtiéndolo así en supinador.

4ª - Cierre por planos o inmovilización durante dos o tres semanas.

F) En la parálisis de los extensores

Operación de Steindler. Consiste en convertir en ex tensores a los músculos palmar mayor, palmar menor y cubital anterior.

Técnica

1º - Una vez aislados y disecados a través de una incisión anterior los músculos antedichos, se efectúa otra pequeña incisión esta vez dorsal entre los músculos extensores: largo del pulgar y común de los dedos y haciendo rodear el borde radial se lleva al palmar mayor al tercer compartimento para suturarlo al extensor largo del pulgar.

2º - El palmar menor es llevado después de rodear el borde cubital al compartimento de los extensores comunes, donde dividido en varias tiras es sutureado a los cuatro tendones de los extensores de los dedos.

Modificación de R. Jones. Usa este autor el palmar mayor, el pronador redondo y el cubital anterior.

El palmar mayor es sutureado al extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice.

El pronador redondo se une a los radiales primero y segundo, y por último el cubital anterior se fija a los extensores de los tres últimos dedos.

Modificación de Stiles. Consiste en fijar el palmar mayor abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar.

El pulgar mayor es suturado a los tendones extensores de los dedos y del pulgar.

Post-operatorio. Inmovilización en extensión de la muñeca y articulaciones metacarpofalángicas, con los extremos de los dedos libres.

De los ocho a los catorce días se instituye la movilización activa siempre que la cicatrización haya sido buena.

- -

G) En la parálisis de los flexores

Operación de Steindler. Consiste en convertir el primer radial externo y el cubital posterior en flexores de la muñeca.

Técnica

1º) Aislamiento y desinserción mediante una incisión dorsal de los músculos primer radial externo y cubital posterior.

2º) Aislamiento mediante una incisión anterior del flexor común profundo de los dedos y del flexor largo del pulgar.

3º) A través de túneles subcutáneos se hacen

pasar el primer radial rodeando el borde del mismo lado y el cubital posterior por el borde cubital, hacia la incisión palmar, fijando luego el primer radial al flexor largo del pulgar y el cubital posterior dividido en tiras al flexor común profundo de los dedos.

H) En la parálisis de los músculos de la eminencia tenar.

Operación de Steindler. Consiste en reemplazar la función abolida del oponente, mediante la del flexor largo del pulgar, siempre que éste último conserve su actividad y que la movilidad pasiva del pulgar sea normal.

Técnica.

1º) Disecación del flexor largo del pulgar, a través de una incisión que en la cara radial del pulgar se extiende, desde la articulación interfalángica hasta poco más allá de la metacarpofalángica, teniendo precaución de no lesionar el nervio cutáneo lateral del pulgar y las ramas del nervio mediano.

2º) Abierta la vaina el tendón se ^{divide} en dos partes iguales, desinsertando la porción radial en su extremo distal y suturando luego la vaina con puntos

separados de seda fina o catgut.

38) Colocando el pulgar en máxima aducción y sus falanges flexionadas, se pasa la porción radial libre del tendón a través de un túnel subcutáneo labrado alrededor de la cara dorsal de la primera falange y se lo inserta a tensión en la base de la primera falange mediante sutura a las partes blandas o en un conducto labrado en la falange.

42) Inmovilización con el pulgar en oposición y la falange distal flexionada durante tres semanas. Operación de Bunnell. Consiste en reemplazar la acción del oponente por la de cualquier flexor largo disponible.

Principios que rigen el éxito de la intervención.

1º) El túnel subcutáneo por el que se introduce el tendón debe tener una dirección que vaya hacia el pisiforme.

2º) A fin de restablecer la pronación el tendón se fijará en la base de la primera falange del pulgar.

Técnica

1º) A través de una incisión en L cuya vertical tome la línea media de la muñeca y la horizontal se dirige hasta el pisiforme se divide en dos el tendón

del cubital anterior, seccionando su mitad radial en su porción proximal y la cubital a nivel del pisiforme.

22) Con la mitad radial se forma un asa que se sutura al pisiforme o partes blandas vecinas.

32) Incisión en la cara radial del pulgar que deja al descubierto el extensor corto del pulgar.

42) Incisión de 6 cms. que partiendo de cerca de la articulación de la muñeca, se extiende hacia arriba por el dorso y borde radial del antebrazo.

52) Se secciona en su unión musculotendinosa el flexor corto que se exterioriza por la segunda incisión y atravesando su extremo mediante ^{sutura} de seda se lo exterioriza por la primera incisión a través de un trayecto subcutáneo que rodea la eminencia tenar.

62) Estando el pulgar en oposición y pasado por el asa el tendón del extensor corto se sutura a tensión adecuada al extremo distal del cubital anterior.

La combinación más efectiva según Campbell es utilizar el cubital anterior como motor; como polea la mitad del grosor de su extremo distal y como tendón el extensor corto del pulgar.

I) En la parálisis de los extensores del pulgar

Operación de Steindler. Consiste en reemplazar a los músculos paralizados por el extensor propio del índice.

Técnica

1ª - Se disecciona y secciona en su extremo distal el tendón del extensor propio del índice.

2ª - Incisión que sobre el extensor largo del pulgar se extiende desde la parte media de la tabaquera anatómica hasta la parte media de la primera falange del pulgar.

3ª - Tomado con pinzas y a través de un túnel subcutáneo se lleva el tendón del índice hasta la segunda incisión.

4ª - Se avivan y suturan los bordes del extensor del índice y el extensor largo del pulgar en una extensión de 2,5 a 4 cms. cuidando de mantener el pulgar en hiperextensión.

- -

J) En la parálisis de los músculos lumbricales e interóseos.

Operación de Stiles. Consiste en adosar tiras del flexor común profundo, a los bordes laterales de las primeras falanges.

2 - En Abdomen

Fueron Lowman y Mayer respectivamente, los primeros que publicaron casos de parálisis de los músculos abdominales, tratados mediante transplantes de tiras aponeuróticas fijadas por un lado al músculo afectado y por el otro al seno; o bien tomando como punto fijo 2 relieves óseos, lograron por lo menos restablecer el desequilibrio muscular existente.

- -

A - En la parálisis de los rectos-inferiores y oblicuos del abdomen.

Operación de Lowman. Consiste en trasplantar tiras de fascia fijándolas por una parte a músculo sano y por otra a una hendidura osteoperióstica labrada en el pubis.

Técnica

1ª - Incisión que se extiende desde 5 cms. por encima del ombligo, hasta la sínfisis púbica poniendo al descubierto la aponeurosis del recto en el lado derecho.

2ª - Se transplanta una tira aponeurótica de 2,5 cms. de ancho por 22 de longitud y se la sutura por una parte a los 5 cms. inferiores sanos del rec-

to, y por el otro lado a una hendidura osteoperiós-
tica practicada en el pubis.

Para hacer más fácil esta operación, Lowman hizo bajar la parte media de la masa de operaciones disminuyendo mucho la tensión abdominal. En estos últimos años Lowman pasa por túneles subcutáneos ti-
ras aponeuróticas de 1,5 a 2,5 cms. Tiene además
tiras desde los músculos sanos al miembro inferior.

3ª - Reposición de la aponeurosis suturándola
con catgut cromado.

4ª - Antes de cerrar la brecha operatoria se
pasa otra tira aponeurótica insertándola en el pe-
riostio correspondiente a la zona donde termine el
ligamento de Poupert.

5ª - Cierre por planos. Posición semicostada
del paciente durante 3 semanas, y luego reeducación
debajo del agua.

- -

B) En la parálisis del recto superior y oblicuos del
abdomen

Operación. Consiste en insertar las tiras aponeurósti-
cas, por una parte en los rectos inferiores funcio-
nalmente sanos y por otro lado y llevando la aponeu-
rosis por la vaina del recto se sutura al borde in-

terior de las costillas; se pone además otra tira que se fija hacia afuera y por debajo de la anterior siempre en el reborde costal.

- -

C) En la oblicuidad pélvica paralítica

Operación de Mayer. Modificación de la ^{de} Lowman, consistente en fijar tiras esponuróticas al reborde costal y al periostio externo por una parte y al ilion por otra.

Técnica

1º - Incisión que desde la línea axilar anterior y sobre la novena costilla se extiende en una longitud de 10 cms.

2º - Se pone al descubierto la novena costilla que se suspende, pasando luego una sutura alrededor de ella y que pende por su extremo inferior.

3º - Incisión que desde 7.5 cms. aproximadamente de la espina ilíaca antero-superior se extiende hasta un poco por debajo del ligamento de Poupert.

4º - Se talla un colgajo osteoperióstico de 7,5 cms. sobre el ilion en el que queda la inserción de la banda iliotibial.

5º - Se ponen en comunicación las dos insicio-

nes mediante un túnel subcutáneo de 7,5 cms. de ancho; por el cual se pasan dos suturas, una por la parte lateral y otra por la interna.

6ª - Nueva incisión sobre la cara externa del muslo, suficiente para conseguir una tira de fascia lata del ancho del túnel, y de un largo suficiente como para llegar a la novena costilla.

7ª - Se fija por medio de suturas de catgut cromado n.º 1 uno de los extremos de la fascia a la cresta ilíaca y al ligamento de Poupart.

8ª - Se repone el colgajo osteoperiostico por otra serie de suturas.

9ª - Dividiendo el otro extremo de la tira en dos, se pasan a través del túnel a tracción, fijándolas: una alrededor de la novena costilla por intermedio de la sutura guía antes practicada y la otra a la sponurosis esternal, facilitada por una manobra de aproximación de la pelvis y las costillas del lado afecto.

10ª - Los bordes laterales del injerto se suturan a los músculos abdominales.

- -

3 - En miembro inferior

A) En la cadera en flexión

Operación de Campbell. Consiste en llevar a un nivel inferior una porción de cresta ilíaca con todas sus inserciones musculares.

Técnicas

1ª - Incisión que desde la parte media de la cresta ilíaca se extiende hacia la espina ilíaca anterosuperior y luego por el borde interno del tensor de la aponeurosis femoral se extiende en el muslo unos 15 cms.

2ª - Sección completa de la espina ilíaca o de los dos tercios anteriores de la cresta (según el caso) con todas sus inserciones musculares.

3ª - Subperióticamente se desprenden todos los músculos hasta la caja cotiloidea, por encima de la cual se donudan 2,5 cm. de hueso paralelos a la cresta, de este modo se aproximan luego las dos superficies cruontas.

4ª - Cierre por planos y vendaje enyesado con cadara en extensión durante dos a tres meses.

- -

B) En la parálisis de los músculos abductores del muslo.

Operación de Lagg. Utilizada en la parálisis del glúteo mediano, consiste en trasplantar el tensor de la

fascia lata a la cara externa del fémur.

Operación de Lange. Consiste en trasplantar la mitad externa de los músculos de los canales vertebrales e insertarlos por medio de cordones de seda en el gran trocánter y parte superior del fémur. De esta manera de músculo extensores de la columna pasan a ser abductores del muslo.

Kreuscher al practicar la operación de Lange interpone fascia lata bajo la superficie del músculo para prevenir adherencias.

Operación de Hey Groves. Asociación de las 2 anteriores pasa el tensor de la fascia lata por un túnel y lo sutura a los músculos de los canales vertebrales.

Operación de Telson. Consiste en desplazar hacia adelante la porción lateral del glúteo mayor y suturar la aponeurosis a la cresta del ilion.

Operación de Dickson. En la cual se lleva el tensor de la fascia lata junto con una porción de espina anterosuperior a la espina ilíaca pósterosuperior.

Steindler opina que ante el resultado incierto de una de estas operaciones que estén indicadas en pocos casos, es preferible realizar la artrodesis.

Operación de Ober

Técnica actual. Paciente en decúbito lateral.

1ª - Incisión que por fuera de las apófisis espinales se extiende por arriba hasta unos 15 cms. de la primera vértebra sacra.

2ª - A través de un espacio que se encuentra en la aponeurosis lumbar que aparece a la vista, se hace una incisión en toda la extensión de la herida, liberando luego por disección el cuerpo muscular cuidando de no lesionar los vasos y nervios.

3ª - Incisión de 20 cms., que desde la cabeza del peroné se extiende hacia arriba con la cara del muslo, y pone al descubierto el tensor de la fascia lata que se disecciona en sus bordes cuidadosamente.

4ª - Nueva incisión de 7,5 cms. por delante del gran trocánter, uniendo luego por un túnel esta incisión con la anterior y pasando a través de él a la extremidad inferior de la banda iliotibial.

5ª - Se labra un túnel subperióstico por debajo del vasto externo, haciendo pasar luego la aponeurosis por debajo del glúteo mayor, y después a través del túnel recién efectuado.

6ª - Estando el miembro en abducción se sutura dicha aponeurosis al glúteo mayor con seda nº 4.

78 - Se suturan los bordes de la aponeurosis a la aponeurosis lumbar profunda, formándose así un tendón entre los músculos de los canales vertebrales y el trocánter.

82 - Cierre por planos.

- - -

C) En la parálisis del cuádriceps femoral

En una estadística sobre 63 casos, Crigo y Fincher expresan los buenos resultados que obtuvieron realizando el trasplante del bíceps femoral o la rótula en reemplazo del cuádriceps paralizado. Pero día a día observaron que la desviación lateral de la rótula era mayor, razón por la cual era necesario una nueva intervención corrigiendo dicho desplazamiento.

Dunn realiza según el caso, el trasplante del sartorio o del tensor de la fascia lata a la rótula.

Manfredi sostiene que los mejores resultados se obtienen asociando el trasplante del sartorio con el del bíceps y del tensor de la fascia lata.

Operación de Eyerson aconsejada por sus buenos resultados, consiste en realizar el trasplante del bíceps femoral y del semitendinoso a la rótula evitando de esta manera los desplazamientos laterales de esta última.

Técnica

1ª - A través de dos incisiones laterales, se ponen al descubierto en gran extensión los músculos bíceps y semitendinoso a fin de que puedan realizar un trayecto oblicuo, condición ésta que influye enormemente en el éxito del trasplante.

2ª - Guiando su irrigación o inervación se seccionan sus extremos distales en los cuales se disponen suturas de seda.

3ª - Se labran dos túneles subcutáneos en dirección a la cara anterior de la rodilla, pasando por ellos los tendones.

4ª - Se suturan estos fuertemente a los elementos anatómicos de la región anterior de la rodilla.

5ª - Cierre por planos y vendaje oyesado.

La readaptación muscular precoz tiene gran importancia para el éxito de este trasplante.

- -

Trasplantes en el tobillo y el pie

A) Trasplante del extensor propio del dedo gordo a tibial anterior.

Preoperatorio. Común a todas las intervenciones que se realizan en tobillo y pie, debe ser muy meticuloso.

El primer día se procede al baño y afeitado de la región, limpieza con benzina y luego aplicación de mercuriato u otro antiséptico y envoltura estéril.

El segundo día se procede a una aplicación de alcohol y nuevo apósito estéril.

Preparatorio inmediato. Aplicación mediante pulverizador de alcohol, mientras se quita el resto de mercuriato que quedó, y nueva aplicación de antiséptico con todas las reglas de la asepsia.

Este trasplante está indicado en casos de vultus paralítico ligero.

Técnica

1ª - Incisión curva de 4 cms. sobre el tibial anterior, que una vez puesto el desahuerto se incide longitudinalmente en una extensión de 4 cms. →

2ª - Se labra en el cuneiforme interno o en su cartílago el lecho para alojar el extensor propio.

3ª - Incisión que partiendo a 3 cms. por encima del maleolo tibial hasta el primer metatarsiano en su parte media.

4ª - Se incide en una extensión de 3 cms. la aponeurosis del extensor. Puesta de manifiesto la porción delgada del tabique, situada por encima del maleolo, se practica en ella una pequeña incisión

por la cual se introduce un estilote que se hace llegar hasta la inserción del tendón.

5º - Se abre en toda su longitud la vaina del extensor propio, seccionándolo luego a la altura de la mitad del metatarsiano.

6º - Se enhebra con catgut cromado el extremo del tendón, y gracias a una sonda en la cual se enhebran los cabos libres de la sutura, se hace pasar al extensor por dentro de la vaina del tibial anterior.

7º - Se sutura firmemente el extensor a las dos mitades del tibial. Luego con aguja gruesa se lo sutura nuevamente esta vez al hueso y partes blandas vecinas.

8º - Cierre por planos.

- -

B) Transplante del tibial anterior a abductor y pronador.

Esta intervención está indicada en caso de varus poralítico intenso, usándose el extensor propio del dedo gordo, si es solo de grado ligero.

Técnica - Común a ambas intervenciones. Describiré solo la primera.

1º - Incisión curva de 4 cms. en el lugar de

inserción del peroneo anterior formando un colgajo de las fendas. Una vez expuesto el tendón es incin-
dido longitudinalmente en una extensión de 4 cms.

2ª - Se labra un lecho en los metatarsianos para la recepción del tibial anterior.

3ª - Incisión que desde unos 4 cms. por encima del malleolo llega siguiendo el trayecto del tendón del tibial hasta su inserción. Se abre su vaina en su parte superior y se le rechaza hasta encontrar el extensor largo de los dedos.

4ª - Luego se introduce un estilete siguiendo la vaina del peroneo anterior para no perturbar a los tendones extensores que van unidos al peroneo.

5ª - Se abre toda la vaina del tibial anterior y se secciona su extremo distal lo más cerca posible de su inserción ósea. Luego se lo envuelve con catgut cromado y por medio del estilete se lo desliza en el interior de la vaina del peroneo anterior.

6ª - Se lo sutura fuertemente al hueso y al peroneo anterior.

7ª - Cierre por planos.

0) Transplante del peroneo lateral largo a tibial anterior

En las condiciones comunes en que se efec-

efectúan este trasplante no cumple eficazmente la función de supinación que hacía el tibial anterior; ésta es la razón por la cual ahora se practica una plastia aponeurótica, intervención especialmente indicada en casos de pie valgus paralítico.

Técnica

1º - Incisión a nivel del lugar de inserción del tibial anterior, que puesto al descubierto se lo divide longitudinalmente en dos. Se lebra luego un lecho sobre el condiforme interno.

2º - Incisión de 3 cms. en la parte superior de la vaina del mismo músculo que se abre, haciendo pasar por elle una sutura guía por medio de un estileto.

3 - Incisión que sobre el peroneo lateral largo se extiende desde la parte media de la pierna hasta el hueso cuboideas, disecando luego las faneras hasta visualizar los tendones de los extensores.

4º - En este tiempo de la plastia aponeurótica, se incide la aponeurosis de los peroneos y de los extensores. Esta última se invierte y se sutura a la aponeurosis de los peroneos también invertida con puntos de Lambert. De esta manera se construye un trayecto fisiológico para el peroneo largo.

5º - Se introduce un estilote desde la incisión superior de la vaina del tibial hasta hacerlo aparecer en el lugar de la plastia. Se procede entonces a pasar la sutura guía del segundo tiempo por debajo de la aponeurosis.

6º - Se abre entonces la vaina del peroneo lateral largo y se lo secciona en el punto en que se dirige a la planta del pie. Se le hace una sutura en su extremo libre y aprovechando la sutura guía se lo introduce en la vaina del tibial anterior.

7º - Se lo sutura luego al conoiforme y partes vecinas. Se cierran las brechas espontóricas y se termina suturando los demás planos.

- -

D) En la parálisis de los Gemelos

Operación de Meyer. Consiste en suplir los gemelos por medio de los peroneos y dos de los siguientes músculos: tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo.

Técnica

1º - Incisión curva a nivel del tendón de Aquiles llegando hasta su inserción inferior.

2º - Se divide longitudinalmente dicho tendón en una extensión de 2,5 cms. y se labra un lecho en

el calcáneo para recibir los tendones a transplan -
tes.

32 - Incisión en el trayecto de los peroneos laterales. Con el pie colocado en abducción se abre su vaina, seccionándolos luego en la extremidad inferior de la incisión efectuada.

42 - Se abre un túnel subcutáneo que llega al lecho calcáneo practicado y se los sutura firmemente después de haberlos hecho pasar por el túnel.

52 - Incisión en la región interna del tobillo disecando hasta dejar al descubierto los tendones del tibial posterior flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo.

62 - Se abren las vainas de los tendones para el transplante, seccionándolos en su extremo inferior.

72 - A través de trayectos subcutáneos, se pasan los tendones seccionados hasta alcanzar la primera incisión.

82 - Se suturan los tendones transplantados al lecho calcáneo y a los bordes del tendón de Aquiles.

92 - Cierre por planos.

Transplantes musculares para corregir deformidades
del pie

A) Transplante tendinoso para el pie calcáneo

Esta intervención casi nunca se realiza aisladamente, sino asociada a otras destinadas a estabilizar el pie, desequilibrado por la parálisis del tríceps sural.

Operación de Steinböck. Consiste en realizar el transplante de ambos peroneos o del peroneo lateral largo y el tibial posterior para reemplazar al tríceps sural paralizado.

Técnica.

1ª - Incisión dorsolateral en el pie, disecando hasta poner al descubierto los tendones de ambos peroneos.

2ª - Incisión a nivel del borde interno del pie y disecación hasta ver las superficies interna y externa del calcáneo.

3ª - Se labra con el trépano un túnel transversal en este punto, destinado a recibir el tendón peroneo

4ª - Se libera ambos peroneos por disecación y por trayectos subcutáneos se los lleva al extremo posterior de la incisión.

5ª - Se introducen ambos tendones en el am-

plio túnel labrado, uno por el lado interno y el otro por el externo y reflejándolos sobre sí mismos se suturan fuertemente y a tensión en la parte posterior.

68 - Cierre por planos y vendaje inmovilizador por el término de 1 mes y medio.

- - -

B) Transplantes musculares para el pie cavo. Pie en garra.

Pie cavo. Deformidad inversa al pie plano que se caracteriza por una acentuación del arco plantar posterior y una disminución del anterior, asociada a una contractura de los extensores de los dedos. A causa de esta deformidad suelen desarrollarse: hiperqueratosis, dedos en martillo, hiperostosis, etc.

Son muchas las operaciones propuestas para corregir esta deformidad. Citaré aquellas que lo hacen mediante trasplantes musculares solos o asociados a otras intervenciones.

Shornes fija los tendones extensores de los dedos en las cabezas de los metatarsianos.

Jones combina el trasplante tendinoso y la osteotomía.

Hibbs en su técnica descrita por Smith y von Lackum, realiza la operación de Steindler que con -

siste en el despegamiento de la aponeurosis plantar del calcáneo seguida a los tres meses del trasplante de los extensores común de los dedos y propio del dedo gordo a los cuneiformes, a la base de uno o más metatarsianos o al cuboideas según se quiera o no llevar la tracción muscular al lado interno, medio o externo del pie.

Según Smith y Von Lackum esta operación tiene ^{siempre} muy buenos resultados, siendo que la elección de los casos se haga después de cuidadoso estudio.

Como en todos los trasplantes, en este caso particular es necesario corregir antes cualquier deformidad ósea existente.

Operación de Dickson y Divoley. Indicada en los casos de pie cavo leve: consiste en llevar el extensor propio del dedo gordo a la planta y suturarlo a tracción al flexor puesto también a tensión. Se completa la intervención realizando la artrodosis de la articulación interfalángica del dedo gordo.

Operación de Jones. Para los dedos y pie en garras consiste en la sección de la aponeurosis plantar y distensión de los elementos de la planta. Después se realiza el trasplante del extensor largo del dedo gordo al primer metatarsiano, suturándolo después

de haberlo pasado por un túnel óseo cercano a la cabeza del mismo.

Se inmoviliza luego el pie mediante una placa metálica adaptada a la planta y sujeta mediante un vendaje.

Una vez quitada la sutura, se inmoviliza el pie en posición correcta permitiéndose la marcha durante un mes. Pasado este lapso se suprime el talón al calzarse y se adapta un vástago transversal a la altura de los metatarsianos.

- -

6) Transplante del flexor propio del dedo gordo a tibial posterior

Este transplante ideado y ejecutado por primera vez por el Dr. Héctor W. Giglio, Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Niños de La Plata, consiste en suplir la función abolida del tibial posterior por la del flexor propio del dedo gordo.

Técnica

1º - Incisión interna sobre el trayecto del tibial posterior, que se incursa en su extremo inferior llegando a la tuberosidad del escafoide. Se aisla y rechaza el paquete vascular, y por detrás de él se

obre la vaina del flexor del maleolo hacia arriba.

2º - Manteniéndolo calzado con una pinza de tendones, se busca el extremo anterior del mismo por la incisión interna, dejando un puente maleolar para no lesionar los vasos.

3º - Llegado al tabique intermuscular interno plantar se lo abre y se aisla el tendón, liberándolo del ramo anastomótico del extensor común; luego se lo secciona y traccionándolo se lo pasa a través del túnel.

4º - Pequeña incisión en el extremo superior de la vaina del tibial posterior, por lo cual se introduce una pinza que pase por debajo del paquete, tomando luego el tendón del flexor, e introduciéndolo en la vaina.

5º - Se hace un ojal en el escafoides a nivel del tibial posterior, y se introduce una sonda para tendones hasta el ojal superior. Se introduce el tendón del flexor y se lo hace salir por el ojal inferior.

6º - Se labra un túnel en la tuberosidad del escafoides y se pasa el tendón del tibial posterior suturándolo sobre sí mismo.

7º - Cierre por planos. Piel con puntos de Do-

natti.

Bata de yeso en aducción y supinación. A los 20 días se retiran los puntos y se inicia termoterapia y reeducación muscular.

Los resultados de este trasplante han sido exitosos en un 100 % de casos.

- - -

Estadística del Servicio de Ortopedia y Poliomielitis del Hospital de Niños de La Plata

Miembro Superior

Operación

	No. de casos
Trasplante de los músculos epitroclares al húmero (operación de Steindler)	3
Trasplante del extensor propio del dedo gordo a la primera falange del mismo dedo	1
Trasplante del cubital anterior a abductor largo del pulgar	<u>1</u>
Total	5

- - -

Miembro Inferior

Trasplante del biceps semitendinoso y semimembranoso a la rótula	1
Trasplante del biceps y semitendinoso a la rótula	3

Transplante del recto interno y del semiten- dinoso a la rótula	1
Transplante del semitendinoso y semimembranoso a la rótula	1
Transplante del biceps a la rótula	1
Transplante del extensor del dedo gordo a ti- bial anterior	20
Transplante del peroneo lateral largo a tibial anterior	7
Transplante del flexor largo a tibial anterior	4
Transplante del extensor común de los dedos al 2º metatarsiano y del extensor del dedo gordo al 1er. metatarsiano. (Operación de Hibbs)	2
Transplante del flexor propio del dedo gordo al escafoideo	1
Transplante del peroneo lateral largo al calcá- neo (Técnica del Dr. Héctor Giglio)	1
Operación de Hibbs Bustos Ansart Campbell modi- ficada en el servicio	1
Operación del Steinert Bustos Ansart Hibbs	1
Transplante del tibial anterior al dorso del pie	1
Transplante del flexor del dedo gordo a tibial anterior	1

Transplante del tibial anterior al 3er. metatarsiano	1
Transplante del tibial anterior al 5º metatarsiano	3
Transplante del tibial anterior a peroneo anterior	4
Transplante del peroneo lateral largo al calcáneo (Operación de Dieckert y Móc)	1
Hemitransplante del tendón de Aquiles al 5º metatarsiano	1
Transplante de los peroneos laterales a extensores	1
Transplante del extensor del dedo gordo al 2º metatarsiano	1
Transplante del extensor común al sordo del pie	<u>1</u>
Total	59

Los trasplantes hechos en dicho servicio han sido seguidos de éxito en un porcentaje altamente satisfactorio.

Los fracasos en general no han sido debidos a mala técnica, sino más bien al descuido por parte de

los familiares de una de las partes fundamentales del tratamiento, como es la readaptación funcional.

Es de notar que en algunos casos la avanzada edad del paciente era el primer obstáculo en la readaptación post-operatoria. Considerase pues el factor edad como muy importante en esta parte del tratamiento.

- - -

Conclusiones. Basadas en ésta y otras estadísticas de autores extranjeros de trasplantes en particular, muestran claramente que los trasplantes musculares en Poliomielitis están destinados a ocupar un lugar de privilegio en el tratamiento de las secuelas de esta grave enfermedad.

BIBLIOGRAFIA

- 1 - ALESSANDRINI S. S. - 1901 - Dei trapianti tendinei nella cura della paralisi spinale infantile (-
- 2 - BAILEY G.L. - 1907 - Notes on tendon transplantation in the treatment of infantile paralysis.
- 3 - BOORSTEIN S. - 1914 - Tendon transplantation in anterior poliomyelitis.
- 4 - BONOLINI D. - 1923 - Contributo alle cure chirurgiche della paralisi infantile con i trapianti musculo-tendinei.
- 5 - BARR Joseph S. - Poliomyelitic hip deformity and the erector spinae transplant.
- 6 - CHRISTMANN - OTTOLENGHI - RAFFO - VON GROLMAN -
Técnica quirúrgica.
- 7 - BROUQUE P. 1904 - Les résultats éloignés de la transplantation tendineuse dans la paralysie infantile -
- 8 - de GAETANO L. - 1938 - Postumi di paralisi infantile. Técnica dell'intacco osteo-periosteo nel trapianto tendinei (ancoraggio tendineo osteo-periosteo)
- 9 - GIRARDI VALENTIN G. - Ortopedia y Traumatología
- 10 - GOLDTHWAIT D.F. - 1896 - Tendon transplantation in the treatment of paralytic deformities
- 11 - GILLINI G. - 1904 - A propos de la transplantation tendineuse dans la paralysie infantile

- 12 - GALLOWAY H.P.H. - 1913 - Observation on tendon transplantation operations
- 13 - JOHNSON J. H. - 1907 - Tendon transplantation
- 14 - FREIBERG A. H. - Tendon transplantation in infantile paralysis
- 15 - BRACK C. - 1903 - Die Sehnenbörpftanzung in der Behandlung der spinaleu Kinderlähmung.
- 16 - LEWIN - Paralysis infantil
- 17 - MESSER Walter - Orthopaedic Surgery
- 18 - MAC MURRAY - A practice of Orthopaedic Surgery
- 19 - MAC KENZIE - 1901 - The orthopaedic treatment of deformities and disabilities resulting from diseases of the nervous system special reference to tendon transposition.
- 20 - MILLS E. P. - 1913 - A case of tendon transplantation to overcome defect resulting from poliomyelitis.
- 21 - Mc KACHERN - 1915 - Tendon transplantation following infantil paralysis.
- 22 - MURPHY J.B. - 1916 - Infantile paralysis tendon transference.
- 23 - MONTGOMERY W.P. - 1901-02 - Some remarks on the results of tendon transplantation in twenty-five cases of infantile paralysis of the lower extremity.
- 24 - MIL IKEN S.F. - 1896-97 - Tendon grafting: a new operation for deformities following infantile paralysis with report of a successful case.

- 25 - MAYER L. and BIESALOKY K. - 1946 - Die physiologische Sehnenverpflanzung`
- 26 - MAYER L. - 1919 - Recent studies in the physiology of tendons and their application to the operative treatment of poliomyelitis
- 27 - NEUSTADT E. - 1929 - Zehn Jahre Sehnenplastik. Spectorergebnisse der an der unteren Extremität vorgenommenen Ueberpflanzungen bei Folgezuständen von poliomyelitis
- 28 - OBER Frank R. - Tratamiento y rehabilitación del paciente poliomiélfítico
- 29 - BYERSON E. W. - 1917. - Tendon transplantation for relief of paralysis following anterior poliomyelitis
- 30 - RECINE Dott Aldo - Il trapianto del sartorio negli esiti di poliomielite anteriore acuta
- 31 - SCHEPP R. - 1938 - Zur Sehnentransplantation bei poliomyelitischen Lähmungen
- 32 - STAN G.L. - Tendon transplanting in paralytic deformities - 1901
- 33 - SCHWARTSMANN J. R. - Trasponto del tendón de la corva para el alivio de la parálisis del cuádriceps en poliomiélfitis de escuela 134 casos
- 34 - SCHWARTZMANN R. and GREGO C. H. - Hamstring tendon transplantation for the relief of quadriceps femoris paralysis in residual poliomyelitis.
- 35 - THOMPSON A. - 1903-04 - Transplantation of tendons for infantile paralysis.

- 36 - TRUETA PASPELL - El tratamiento de la parálisis postpoliomielítica infantil con las trasplantaciones tendinosas - Oct. 1935
- 37 - TAYLOR H. T. - 1916 - Infantile paralysis, its treatment with special reference to an original method of tendon transplantation
- 38 - VULPIUS O. - Ueber die Technik an der art der schonüberpflanzung bei der Behandlung der spinalen Kinderlähmung
- 39 - WHITE S. - 1901 - Ultimate results of tendon grafting in infantile paralysis.

Handwritten signature

San 35 foyas.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

DR. FLAVIO MARIASCO
SECRETARIO

29/11/09