UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de Química y Farmacia

ACCION DE LA FORMAMIDA SOBRE LOS ARILACETONITRILOS

Tesis presentada para optar al grado.

de doctor en Bioquímica y Farmacia

por

Jacobo Meseri

AÑO : 1948

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de química y Farmacia

ACCION DE LA FORMAMIDA SOBRE LOS ARILACETONITRILOS

Tesis presentada para optar al grado
de doctor en Bioquímica y Farmacia

por

JACOBO MESERI

Trabajo realizado en el
Laboratorio de la cátedra
de QUIMICA ORGANICA DE
FARMACIA.-

AÑO 1948

14300

PADRINO DE TESIS

Profesor Doctor Armando Novelli

A Mis Padres

Señores Profesores:

Cumpliendo con las disposiciones reglamentarias, someto a vuestra consideración el presente trabajo de tesis para optar al grado de Doctor en Bioquímica y Farmacia. El trabajo fué realizado en el laboratorio de la cátedra de Química Orgánica de Farmacia de esta Facultad. La elección del tema fué insinuada por el profesor doctor Armando Novelli, quien me orientó y aconsejó durante la realización del mismo. Expreso mi reconocimiento y gratitud a tan distinguido profesor. Agradezco también a la doctora Ana G. de Varela por la colaboración prestada.-

La formamida reacciona con los arilacetnitrilos. Esta interesante reaccón fue descubierta por Novelli (1) y deseando generalizarla decidimos ensayarla sobre algunos derivados de toxilidas del fenilacetnitrilo.

Novelli estudió la reaccón sobre el fenilacetnitrilo y sobre el α naftilacetnitrilo. Calentando el fenilacetnitrilo con exceso de formamida obtuvo fenilacetamida y una base de fórmula de $C_{10}H_9N_3$. Con el α naftilacetnitrilo la reaccón siguió un curso semejante, logrando aislar la base correspondiente de fórmula $C_{14}H_{11}N_3$ y α naftil acetamida. Las bases obtenidas son monobásicas, forman sales fácilmente solubles en agua, precipitan con los reactivos generales de alcaloides y permanecen inalteradas por prolongada ebullición con ácidos y álcalis.

Novelli previendo que el grupo nitrilo era el reactivo y que la reaccón se conducía como en una reaccón de Leuckart, supuso que las bases tenían como estructura fundamental el núcleo de la triazina: 2 bencil 1:3:5 triazina en el caso del fenilacetnitrilo.

En el año 1945 W.H. Davis y H.A. Piggott (2) calentando fenilacetnitrilo con formamida en corriente de amoníaco gaseoso obtuvieron una base de fórmula $C_6H_7N_3$ y trazas de α iminometilfenilacetnitrilo. Estos investigadores consideraron a la base como idéntica a la obtenida por Novelli, pero le asignaron una estructura pirimidínica: 4 amino 5 fenil pirimidina (1)

fué excluido cuando con dióxido de

rivado.

El isómero 2 bencil 1:3:5 triazina se encontró que la base no se oxida selenio y que forma un monoacetilde-

La estructura de la base como así también del α iminometilfenilacetoni-
nitrilo fueron probadas por degradación. El segundo compuesto fué ade-
más sintetizado calentando α formilfenilacetoni- nitrilo con amoníaco.
 α formil, α acetil, α iminometil y α feniliminometilfenilacetoni- nitrilo
con formamida dieron la misma pirimidina.

Las pruebas de degradación realizadas por los investigadores ingle-
ses fueron las siguientes:

Por tratamiento prolongado de la base con
ácido clorhídrico concentrado dió un producto anfótero $C_{10}H_9CN$

con las propiedades generales de una hidroxil - pirimidina.

Tratando (2) con oxicloriguro de fosforo (pero no con cloriguro
de tionilo) dió un clorigo-compuesto $C_{10}H_7N_2Cl$ (3)

el cual con amoníaco alcohólico regeneró la base ori-
ginal $C_{10}H_9N_3$. Ensayos efectuados para reducir el clo-

ro-compuesto utilizando zinc con solución acuosa de fosfato de sodio
fueron negativos. En cambio hidrogenando con paladio 1-2% se llega a

un producto al que atribuyeron la estructura $C_{10}H_{12}N_2$

este producto no pudo ser purificado, pero dió un pi-

crato $C_{10}H_{12}N_2 \cdot C_6H_3O_7N_3$ (?) de punto de fusión 201-202°

identico con el que se obtiene por similares reacciones, partiendo
del 2,4 dihidroxil 5 fenilpirimidina:

Otra degradación se basó en la observación de Johnson. (J. Am. Chem. Soc.
1916, 38, 1335-1355), que señala que algunas pirimidinas tratadas con
sodio y alcohol son reducidas a hexahidropirimidinas, las cuales con

agua son hidrolizadas a una aldehida y a γ -diamino propano. La reduccion de la base (1) en esta forma, dió amoniaco como único producto identificable, pero en cambio el correspondiente hidroxil-derivado $C_{10}H_8O N_2$ (2) dió una base (3) de la cual fueron preparados un picrato y un dibenzoil-derivado. Esta base parecería ser derivada del γ -diamino

(β fenil propano anteriormente preparada por Jackson y Kenner (J.1923-1657), pues el picrato fué un monohidrato del obtenido por estos investigadores. Desgraciadamente carecieron de muestras para hacer punto de fusion de la mezola.

M E C A N I S M O D E L A R E A C C I O N

Según W.H. Davis y H.A. Piggott (2), el mecanismo de la reaccion se desarrollaría por directa condensacion de la formamida con el fenilacetnitrilo para dar α aminometilfenilacetnitrilo (6) $C_6H_5 \cdot C_6H_4 \cdot (C N) \cdot C H_2 \cdot N H$ el cual posteriormente reacciona con formamida, dando un compuesto de cadena abierta; finalmente la molécula se cicliza sobre el grupo nitrilo, de una manera análoga como ocurre en la condensacion del α cianosuccinato de etilo con úrea para dar 4 amino 2:6 dihidroxi 5 carboximetilpirimidina (7)

dió

α cianosuccinato de etilo
+ úrea

4 amino 2:6 dihidroxi
5 carboximetilpirimidina

α iminometilfenilacetnitrilo

4 amino 5 fenil-pirimidina

La imina (6) cuando se calienta con formamida dá la pirimidina (1) en un 52 % de rendimiento. Aunque el rendimiento no es tan alto como el que se obtien partiendo del fenilacetnitrilo, la reacción marcha más rapidamente, ya que la imina es un producto intermedio en la reacción del fenilacetnitrilo con la formamida.

REACCION DE LA FORMAMIDA SOBRE DERIVADOS SUSTITUIDOS DEL FENILACETONITRILLO

W.H.Davies A.W.Johnson y H.A.Piggott (3) obtuvieron calentando a 180° y en corriente de amoniaco gaseoso, derivados sustituidos del fenilacetnitrilo con formamida, las correspondientes 4 amino 5 aril-pirimidinas.

Estos investigadores condensaron la formamida con el p. clorofenilacetoni-
trilo, p. metoxifenilacetoni-
trilo, p. hidroxifenilacetoni-
trilo, p. nitrofenilacetoni-
trilo y o. metoxifenilacetoni-
trilo, obteniendo 4 amino 5 p. cloro fenilpirimidina (51 %), 4 amino 5 p.
metoxifenilpirimidina (38%), 4 amino 5 p. hidroxifenilpirimidina
(25 %), 4 amino 5 p. nitrofenilpirimidina (4,5 %) y 4 amino 5 o.
metoxifenilpirimidina (4 %) respectivamente. Entre paréntesis se
indica los rendimientos.

ENSAYOS CON OTROS NITRILLOS Y AMIDAS

No tuvieron éxito ensayos realizados para condensar los nitrilos an-
teriormente citados, con otras amidas distintas de la formamida.
También resultaron negativos los intentos de condensar la formami-
da con nitrilos alifáticos o arilnitrilos distintos del tipo "a-
rilacetoni-
trilo". En algunos casos el grupo α metileno fué inerte
para reaccionar y en otros el nitrilo se polimeriza o destruye.
Los autores arriba citados señalan como condiciones en esta sínte-
sis pirimidínica, que el nitrilo debe tener un grupo metileno,
el cual es más tarde activado; preferentemente, el punto de ebulli-
ción del nitrilo debe ser superior a 180° y ser suficientemente es-
table frente al amoníaco y pequeñas cantidades de agua a la tempe-
ratura de 180°.

En el presente trabajo estudiamos la acción de la formamida sobre algunos derivados metoxilados del fenilacetnitrilo. Ensayamos con el p.metoxifenilacetnitrilo, o.p.dioximetilfenilacetnitrilo, m.p.dimetoxifenilacetnitrilo y con el m.metoxi p.acetoxifenilacetnitrilo, llegándose a obtener las respectivas 4 amino 5 aril-pirimidinas.

Los nitrilos fueron preparados siguiendo la técnica indicada por Percy L. Julian y Bernard M. Sturgis (4), para la obtención de homonaminas y homoácidos. Se parte de los correspondientes aldehidos aromáticos que se condensan con la rodanina. La reacción de condensación de los aldehidos aromáticos con la rodanina ha sido estudiada por Gránacher y sus colaboradores (5).

El compuesto resultante, aldehido-rodanina (I), se somete a la acción del hidróxido de sodio, la molécula se escinde y se origina un α -tiocetoácido (II); se obtiene luego por acción de la hidroxilamina la correspondiente oxima (III) que rinde el nitrilo (IV) cuando se trata con anhídrido acético.

La rodanina fué obtenida haciendo reaccionar cloroacetato de sodio con ditiocarbamato de amonio. Este último compuesto es muy inestable y se obtiene extemporaneamente haciendo pisar una corriente de amoníaco seco sobre sulfuro de carbono. Las siguientes reacciones se desarrollan:

En los restantes casos:

piperonal

m.p. dioximetilfenilacetoniitrilo

vainillina

m. metoxi p. acetoxifenilacetoniitrilo

vainillina

aldehido verátrico

al. verátrico

m.p. dimetoxifenilacetoniitrilo

Trabajando en las condiciones señaladas por Novelli (1) los nitrilos antes mencionados rindieron las respectivas 4 amino 5 aril-pirimidinas, cuando se calentaron con formamida.

El p.metoxifenilacetnitrilo condujo a la obtención de 4 amino 5 p.metoxifenil-pirimidina

El m.p.dioximetilfenilacetnitrilo rindió 4 amino 5 m.p.dioximetilfenilpirimidina

El m.p..metoxi p.acetoxifenilacetnitrilo rindió 4 amino 5 m.me-toxi p.acetoxifenilpirimidina

El m.p.dimetoxifenilacetnitrilo rindió 4 amino 5 m.p.dimetoxifenilpirimidina

Las bases pirimidínicas obtenidas se comportan de una manera análoga a la 4 amino 5 fenilpirimidina. Son solubles en ácidos y precipitan frente a los álcalis. Precipitan con los reactivos generales de alcaloides y son resistentes a la acción prolongada de ácidos y bases diluídas.

Las bases se purificaron aprovechando la propiedad de ser solubles en medio ácido e insolubles en medio alcalino.

De las mismas se obtuvieron los compuestos de combinación con el ácido clorhídrico, ácido pícrico y bicloruro de mercurio.

La purificación de la base 4 amino 5 m.metoxi p.acetoxifenilpirimidina presentó serias dificultades por la formación de resinas difícil de separar. El rendimiento, además, fue pobre (12%).

La reacción marchó mejor con el homopiperonalnitrilo y con el homoanisalnitrilo (rendimiento 20% y 25%, respectivamente).

Las bases correspondientes a estos nitrilos no presentaron dificultades para su purificación.

Con el homoveratralnitrilo el rendimiento fué escaso (13,8%) y la purificación de la base presentó ciertos inconvenientes, debido a la formación de resinas.

P A R T E E X P E R I M E N T A L

.....

LA PARTE EXPERIMENTAL COMPRENDE:

PREPARACION DE RODANINA.

OBTENCION DE LOS NITRILOS.

Obtención del p.metoxifenilacetnitrilo

Obtención del m.p.dioximetilenfenilacetnitrilo

Obtención del m.p.dimetoxifenilacetnitrilo

Obtención del m.metoxi p.acetoxifenilacetnitrilo

OBTENCION DE LAS BASES PIRIMIDINICAS.

Obtención de 4 amino 5 p.metoxifenil-pirimidina

Obtención de 4 amino 5 m.p.dioximetilenfenil-pirimidina

Obtención de 4 amino 5 m.p.dimetoxifenil-pirimidina

Obtención 4 amino 5 m.metoxi p.acetoxifenil-pirimidina

- . - . - . - . -

PREPARACION DE RODANINA

En la preparación de esta substancia se ha seguido la técnica indicada por Percy L. Julian y Bernard M. Stur-
gis (4) ().

Durante tres horas y media una corriente de amoniaco seco, es pasa-
da por una mezcla de 250 gs. de sulfuro de carbono, 200 c.c. de al-
cohol y 200 c.c. de eter, bién enfriada con una mezcla frigorífica.
El contenido del frasco, representa al cabo de ese tiempo, una masa
casi sólida, de color amarillo pálido, de ditiocarbamato de amonio.
Los cristales son filtrados por succión, lavados bién con 50 c.c. de
alcohol frío, seguido por 100 c.c. de eter. El ditiocarbamato de a-
monio debe ser usado inmediatamente pués se deteriora con rapidez.
Simultaneamente se prepara una solución de cloroacetato de sodio, a-
ñadiendo una solución de 98 gs. de hidróxido de sodio en 150 cc. de
agua a una solución de 238 gs. de ácido cloroacético en 200 c.c. de
agua. Se añade carbonato de sodio hasta que la solución sea neutra
frente al tornasol. A la solución así preparada, se agrega gradual-
mente bajo agitación y buen enfriamiento el ditiocarbamato de amo-
nio. Si todo ha marchado bién, el color se vuelve obscuro al prin-
cipio, gradualmente se aclara y finalmente llega a ser amarillo pa-
jizo. Esta solución es entonces, añadida bajo agitación a 300 c.c.
de ácido clorhídrico concentrado, el cual ha sido previamente calen-
tado a 80° - 90°. La rodanina se separa lentamente en brillantes
prismas de color amarillo pálido. Después de dejar en reposo duran-
te una hora, el frasco con su contenido es enfriado en un baño de
hielo; la rodanina es filtrada y lavada bién con agua.

El rendimiento del material secado al aire fué de 200 gs., punto de fusión 162°.

Esta rodanina es suficientemente pura para practicar todas las condensaciones, pero puede ser purificada por recristalización de alcohol o mejor de ácido acético glacial.

OBTENCION DEL p-METOXIFENILACETONITRILO

a). -Preparación de ANISAL-RODANINA

Fórmula $C_{11}H_9O_2NS_2$ P.M. 251

en un matraz de 1000 c.c. se colocan 95 gs., de rodanina, 95 gs. de aldehído anísico, 150 gs. de acetato de sodio fundido y 400 c.c. de ácido acético glacial. Se adapta un refrigerante a reflujo y se calienta durante media hora, con ocasional sacudimiento. La anisal rodanina pronto se separa en cristales coloreados de amarillo. La masa reaccionante es volcada sobre tres litros de agua; los cristales se separan por filtración, se lavan bien con agua, luego con pequeña cantidad de alcohol y eter. Rendimiento 79 % del teórico. Punto de fusión, una vez recristalizada de acetona 248°-249°.

b). -Ruptura de la ANISAL RODANINA CON ALCALI

Obtención del ácido α tio β (p.metoxifenil) pirúvico

Fórmula $C_{10}H_{10}O_3$ P.M. 210

Se efectuaron diez ensayos utilizando 10 gs. de anisal-rodanina por vez.

10 gs. de anisal-rodanina fueron suspendidos en 50 c.c. de hidróxido de sodio al 15 % y calentado en baño maría hasta que todo el material (x) 135 gs. de anisal-rodanina.

se disolvió. Esta operación requiere alrededor de 45 minutos. La solución alcalina es bien enfriada con una mezcla frigorífica y el ácido es precipitado rápidamente con 50 c.c. de ácido clorhídrico 10% (p/v.). Al cabo de estar en reposo durante media hora, el ácido amorfo cristaliza en forma de un polvo amarillo pálido. Rendimiento 70 gs., 83.7% del teórico. Punto de fusión 211° una vez recristalizado de alcohol metílico.

Para obtener buenos resultados no es conveniente ensayar con grandes cantidades de sustancia. Los pequeños ensayos son preferidos ya que el proceso es simple y varios ensayos pueden ser hechos simultáneamente. La acidificación debe hacerse rápidamente, pues, la lenta adición del ácido precipita una goma que posteriormente cristaliza con gran dificultad, desarrollándose al mismo tiempo considerable cantidad de ácido sulfhídrico.

c). - Obtención del ácido α oxima (p. metoxifenil pirúvico).

Fórmula $C_{10}H_{11}O_4N$ P.M. 209

A una solución de etilato de sodio preparada con 7.5 gs. de sodio en 216 c.c. de alcohol, es agregada una solución caliente de 22.5 gs. de hidroxilamina en 20 c.c. de agua.

La solución de hidroxilamina es filtrada del precipitado de cloruro de sodio y volcada sobre 25 gs. del ácido α tio (p. metoxifenil pirúvico, después de haber sido recristalizado de alcohol metílico.

La solución resultante es calentada en baño maría alrededor de veinte minutos y el alcohol es recuperado más tarde bajo presión disminuida. La masa sólida residual obtenida es disuelta en 55 c.c.

de hidróxido de sodio al 5%, filtrada del azufre bien fría cuidadosamente acidificada con 55 c.c. de ácido clorhídrico al 10%. Raspando las paredes del vaso la oxima-ácido pronto cristaliza en copos blancos. Se filtra, se lava bien con agua y se seca en un desecador al vacío sobre hidróxido de potasio.

Rendimiento 24 gs., prácticamente cuantitativo. Punto de fusión después de recrystalizar de agua 165°.

Otro ensayo con 20 gs. de ácido α tio β p. metoxifenil pirúvico bruto rindió 18,200 gs.

d).- Obtención del p. metoxifenilacetónitrilo.

Fórmula C_7H_9ON P.M. 147

40 gs. del ácido α oxima β p. metoxifenil pirúvico crudo y seco es suspendido en 150 c.c. de anhídrido acético. El desprendimiento de anhídrido carbónico comienza con un ligero calentamiento y después de total descomposición el anhídrido acético es recuperado bajo presión disminuída. El residuo se toma con agua y éter. La capa etérea es bien lavada con agua, carbonato de sodio 2% y nuevamente con agua. Se seca sobre sulfato de sodio anhidro y se destila.

Se recogió únicamente lo que destiló a 140° y 5 mm de presión. Rendimiento 20 grs. de un líquido amarillo espeso. 71% del teórico.

OBTENCION DEL m.p. DIOXIMETILENFENILACETONITRILLO.a).- Obtención de piperonal-rodanina.Fórmula $C_{11}H_7O_3N S_2$ P.M.265.

55 gs.de piperonal tratados con 55 gs.de rodanina, en condiciones análogas a la síntesis para la obtención de anisal-rodanina, rindieron 75 gs.de piperonal-rodanina. Cristales amarillos, de punto de fusión 277° una vez recristalizado de acetona. Rendimiento del producto bruto 77,3% del teórico.

b).- Ruptura del piperonal-rodanina con alcali.Obtención del ácido α tio β m.p.dioximetilfenil pirúvico.Fórmula $C_{10}H_8O_4N$ P.M.224.

Ocho ensayos simultáneos con 9 gs.de piperonal-rodanina, trabajando en forma similar a la seguida para la obtención del ácido α tio β p.metoxifenil - pirúvico dieron 55 gs.de un polvo color amarillo pálido. Rendimiento 90,4% del teórico. Punto de fusión, recristalizado de metanol 226° .

c).- Obtención del ácido α oxima β m.p.dioximetilfenil-pirúvico.Fórmula $C_{10}H_9O_5N$ P.M.223.

Para la obtención del ácido α oxima β m.p.dioximetilfenil pirúvico se siguió la marcha indicada al obtener el ácido α oxima p.metoxifenil pirúvico.

50 gs.de ácido α tio β m.p.dioximetilfenil pirúvico rindieron 49 gs.de oxima. Rendimiento prácticamente cuantitativo. Punto de fusión 164° , recristalizado de agua.

d).- Obtención del m.p. dioximetilfenilacetónitrilo.

Fórmula $C_7H_7O_2N$ P.M.161.

50 gs. de ácido α oxima (β m.p. dioximetilfenil pirúvico (producto bruto) fueron tratados con 150 c.c. de anhídrido acético. Después de calentar cuidadosamente y una vez que hubo cesado el desprendimiento de anhídrido carbónico, se recuperó el exceso de anhídrido acético bajo presión disminuída. La masa residual se purificó de una manera análoga a la seguida para la obtención del p. metoxifenilacetónitrilo. Finalmente se destiló al vacío recogiendo lo que pasó entre 150-155°/10 mm de presión. Rendimiento producto puro 20 gs. (55.5% del teórico). Punto de fusión 42°.

OBTENCIÓN DEL m.p. DIMETOXIFENILACETONITRILO.

a).- Obtención del ALDEHIDO VERATRICO.

Para la obtención de aldehído verátrico se siguió la marcha indicada por Organic Synthesis (6), que a continuación se transcribe.

En un balón de tres bocas una mezcla de 132 gs. (1,2 moles) de vainillina (nota 1) y 450 c.c. de agua hirviente, es calentada en un baño de vapor de agua. Aparte se prepara una solución de hidróxido de sodio, disolviendo 150 gs. de hidróxido de sodio en 200 - 300 c.c. de agua y diluyendo a 750 c.c.

360 c.c. de esta solución son calentados alrededor de 100° y añadidos de una sola vez a la mezcla caliente de vainillina y agua (nota 2). Al balón se le adapta ahora, un condensador de reflujo, agitador mecánico y un embudo separador de 250 c.c.

Sin dejar de calentar, 189 gs. (142 c.c.) de sulfato de dimetilo (nota 3) son agregados mediante embudo separador, tan rápidamente como para mantener la ligera ebullición que comienza después de adicionar los 10-15 primeros c.c. (nota 4). Después de agregar todo el sulfato de dimetilo, operación que requiere aproxi-

madamente una hora; la mezcla reaccionante es calentada 45 minutos y una porción adicional de 39 gs. (300 c.c.) de sulfato de dimetilo es añadida de la misma manera que la primera porción. Al final de esta primera adición la mezcla reaccionante debería mostrarse ácida frente al papel de tornasol (nota 5). Después de calentar diez minutos la mezcla reaccionante se hace ligeramente alcalina por el agregado de 60 c.c. aproximadamente de la solución de hidróxido de sodio (arriba preparada) y otra porción de 39 gs. de sulfato de dimetilo es añadida. La adición alternada de solución de hidróxido de sodio y de sulfato de dimetilo (39 gs.) es repetida por dos veces más, de manera que la cantidad total empleada de sulfato de dimetilo es de 345 gs. (2,7 moles). Después del último agregado de sulfato de dimetilo la mezcla reaccionante es hecha fuertemente alcalina por el agregado de 150 c.c. de la solución de hidróxido de sodio y calentada durante 20 minutos. Al cabo de ese tiempo se enfría rápidamente a 25° (nota 6) con continua agitación y el aldehído verático es extraído con tres porciones de 300 c.c. de éter. Reunidos los extractos son secados sobre sulfato de magnesio anhidro y el éter es separado por destilación. Como remanente queda un aceite ligeramente amarillento que pronto solidifica. El rendimiento es de 164-173 gs. (82-87% del teórico). Punto de fusión 43-44,5°. Este producto es suficientemente puro para muchos propósitos. Puede ser purificado, con ligera pérdida, por medio de una destilación bajo presión disminuida. De 164 gs. de producto bruto se obtiene 156 gs. de aldehído verá-

trico puro (p.e. 153°/8 mm.). El aldehído verátrico se oxida con facilidad estando en contacto con el aire, por lo tanto debe guardarse en frascos con cierre hermético.

NOTAS

- 1).- Debe usarse una vainillina suficientemente pura (p.f. 81°-82°).
- 2).- Los reactivos deben mezclarse calientes, de manera de evitar la precipitación de la sal sódica de la vainillina.
- 3).- Un sulfato de dimetilo técnico rinde resultados satisfactorios. El sulfato de dimetilo es tóxico y hay que cuidar no inhalar sus vapores (el amoníaco es el antídoto específico). Es preferible llevar a cabo la reacción bajo una buena campana.
- 4).- El rendimiento es bajo si esta ebullición no ocurre.
- 5).- Es esencial, para obtener buenos resultados, que la mezcla reaccionante se vuelva ácida varias veces. Por esta razón los últimos 156 gs. son añadidos en cuatro pequeñas porciones. La mezcla reaccionante vuélvese ácida después de haber añadido cada porción. Es conveniente controlar la reacción de la solución, haciendo bajar a través del refrigerante una varilla de vidrio con un trozo de papel de tornasol adosado en la punta.
- 6).- Si la mezcla reaccionante es enfriada lentamente o por debajo de 25° el aldehído verátrico puede solidificarse; si esto ocurre es conveniente volver a fundir el producto antes de extraer con éter.

Trabajando en las condiciones arriba señaladas, 100 gs. de vainillina (dos marchas de 50 gs. cada una) rindieron 85 gs. de aldehído verátrico, p.f. 44°.

Para practicar la condensación con la rodanina no fué necesario purificar el producto por destilación.

b).- obtención de veratral-rodanina.

Fórmula $C_{12}H_{11}O_3N_2S_2$ P.M. 281

30 gs. de aldehído verátrico, 30 gs. de rodanina y 120 gs. de acetato de sodio recientemente fundido, fueron calentados durante media hora con 320 c.c. de ácido acético glacial. La veratral-rodanina pronto se separa en cristales coloreados de amarillo. La masa reaccionante se vuelca en 2800 c.c. de agua. Los cristales se separan por filtración, se lavan bien con agua y luego con pequeña cantidad de alcohol y éter. Rendimiento 115 gs. (34,9%), p.f. 231° recristalizada de acetona.

c).- Ruptura del veratral-rodanina con álcali.

obtención del ácido α tio β m.p. dimetoxifenil pirúvico.

Fórmula $C_{11}H_{12}O_5$ P.M. 240

Trabajando en las condiciones señaladas para la obtención de los ácidos tiocetónicos, 110 gs. de veratral-rodanina (once ensayos simultáneos de 10 gs. cada uno) rindieron 82 gs. de ácido α tio β m.p. dimetoxifenilpirúvico (87,3%), p.f. 178° después de recristalizar en metanol

d).- obtención del ácido α oxima β m.p. dimetoxifenil pirúvico.

Fórmula $C_{11}H_{13}O_2N$ P.M. 239

50 gs. de ácido α tio β m.p. dimetoxifenil pirúvico rindieron 49 gs. de ácido α oxima β m.p. dimetoxifenil pirúvico (prácticamente cien). p.f. 160° una vez recristalizado de agua.

e).- obtención de m.p. dimetoxifenilnitrilo.

Fórmula $C_{10}H_{11}O_2N$ P.M. 177

50 gs. de ácido α oxima β m.p. dimetoxifenil pirúvico se calientan cuidadosamente con 150 c.c. de anhídrido acético. La efervescencia comienza con un ligero calentamiento y el ácido-oxima gradualmente se disuelve.

Después de total descomposición el anhídrido acético es eliminado bajo presión disminuida y el residuo tomado con agua y éter. La capa etérea se lava bien con carbonato de sodio, se seca sobre sulfato de sodio anhidro y se destila, a 187° - 188° destila un líquido ligeramente amarillento que pronto cristaliza por enfriamiento. Rendimiento 26 gs. (70%), p.f. 64° - 65°).

OBTENCION DEL m. METOXI p. ACETOXIFENILACSTONITRILO.

Para la obtención de este nitrilo se siguió la técnica dada por Herbert K. Fisher y Harold Hibbert (7).

a).- Preparación de vainillin-rodanina.

Fórmula $C_{11}H_9O_3NS_2$ P.M.267.

Durante 45 minutos, vainillina (100 gs.), rodanina (100 gs.) y acetato de sodio fundido (150 gs.) fueron calentados a temperatura de reflujo con ácido acético glacial (400 c.c.). La mezcla reaccionante fué volcada sobre agua destilada (3000 c.c.). Después de tres horas de agitación el producto fué filtrado por succión, lavado bien con agua y secado al vacío.

Rendimiento 130 gs. (74%). Microcristales amarillos, recristalizados de acetona, p.f.227°-228°.

b).- Ruptura de la vainillin-rodanina con álcali.Obtención del ácido α tio β m. metoxi p. hidroxifenil pirúvico

Fórmula $C_{10}H_{10}O_4S$ P.M.226

10 gs. de vainillin-rodanina fueron calentados a 100°, durante 45 minutos, con 65 c.c. de hidróxido de sodio 15%. La solución roja oscura que se obtiene fué enfriada a -15° y rápidamente acidificada con 65 c.c. de ácido clorhídrico 10%. Después de estar en reposo media hora a -15° la cristalización del producto fué completa. Al cabo de ese tiempo los cristales fueron filtrados por succión, lavados bien con agua y secados al vacío.

12 ensayos simultáneos (10gs. cada uno) rindieron 80 gs. de cristales amarillos pálidos (91,3%), p.f.157°-158° después de recristalizar de metanol.

Obtención del ácido oxima m-metoxi p.hidroxisfenil pirúvico

Fórmula $C_{10}H_{11}O_5N$ P.M. 225

67 gs. de clorhidrato de hidroxilamina en 64 c.c. de agua fueron tratados con 24,5 gs. de sodio en 630 c.c. de alcohol absoluto. Después de filtrar el material inorgánico, la base libre fué añadida a 70 gs. de ácido tio m-metoxi p.hidroxisfenilpirúvico y la mezcla fué calentada a reflujo durante 60 minutos. Después de eliminar el solvente bajo presión disminuida, el residuo fué disuelto en 530 c.c. de hidróxido de sodio al 5%, la solución fué filtrada, enfriada a -15° y acidificada con ácido clorhídrico 10%. El ácido α -oxima β m-metoxi p.hidroxisfenil pirúvico pronto cristaliza (raspar el vaso con una varilla) en escamas casi incoloras. El rendimiento fué de 64 gs. (91,3%). p.f. 138, después de recrystalizar en agua.

Obtención del m-metoxi p-acetoxifenilacetónitrilo

Fórmula $C_{11}H_{11}O_3N$ P.M. 205

50 gs. de ácido α -oxima β m-metoxi p.hidroxisfenil pirúvico, fueron calentados cuidadosamente con 220 c.c. de anhídrido acético hasta que la disolución fué completa y el desprendimiento de anhídrido carbónico hubo cesado. Después la solución, en un aparato totalmente de vidrio

drio, fué calentada a temperatura de reflujo durante 2 horas, El exceso de anhídrido acético fué eliminado bajo presión disminuida y el residuo fué disuelto en benceno (800 c.c.), la solución benecénica fué lavada con agua, con bicarbonato de sodio 1 % y nuevamente con agua, secada sobre sulfato de sodio anhidro y después de eliminar el solvente bajo presión disminuida, el residuo fué destilado en un baño de 200° - 220° de temperatura y a 15 mm. de presión. El producto (32 gs., 70,4 %) pronto cristaliza por enfriamiento. Cristales blancos p. f. 51° - 52°.

. - . - . - . -

SINTESIS DE 4 AMINO 5 p.METOXIFENIL PIRIMIDINA Fórmula $C_{11}H_{11}O N_3$ P.M. 201

22 gs. de carbonato de amonio y 22 gs. de ácido fórnico se mezclan en un balón de destilación de 100 c.c.; terminada la reacción se calienta el líquido lentamente hasta 175°, manteniendo esta temperatura mientras se desprenda vapor de agua. Se deja enfriar y se añaden 10 gs. de p.metoxifenilacetónitrilo, se calienta rápidamente a 175° manteniendo esta temperatura durante 3 horas, luego durante el curso de 3 horas más se eleva lentamente la temperatura hasta 210°. La reacción es evidente a 180° y el líquido se vá oscureciendo progresivamente hasta llegar a ser casi negro. Se deja enfriar, se toma el residuo con 40 c.c. de ácido clorhídrico 10 % y se filtra. El líquido filtrado se extrae con éter, se decolora con carbón, y luego de filtrar se precipita con hidróxido de sodio. Rendimiento 3,4 gs. (25 %) de un polvo amarillento.

La base se purifica redisolviéndola repetidas veces en ácido clorhídrico diluido, decolorando la solución con carbón y reprecipitando con álcali. Finalmente se recristaliza de alcohol. Finas escamas brillantes p. f. 166°^(x)

(x) Los puntos de fusión de las bases pirimidínicas y sus derivados fueron determinados en aparato de Fisher. Los puntos de fusión de los productos intermedios fueron determinados en tubo capilar (corrigiendo la temperatura).

~~Análisis (x) Substancia: _____ gastado: _____ c.c. ácido sulfúrico
0,02 N. Calculado para C₁₁H₁₁O N₃; N % _____; hallado N % _____~~

Combinación con ácido clorhídrico.

Una pequeña cantidad de la base fué disuelta en alcohol absoluto saturado de ácido clorhídrico y seprecipitó la sal por agregado de éter. Después de filtrar los cristales se secaron al vacío sobre potasa.

Los cristales por calentamiento ennegrecen a 220° y funden a 257°.

Análisis. Substancia 0,1043 grs., gastado 4,05 c.c. N₃Ag 0,1 N,

Calculado para C₁₁H₁₁O N₃. HCl: Cl% 14,94; hallado Cl% 13,73.

Combinación con ácido pícrico.

0,10 grs. de la base se disuelven en 5 c.c. de alcohol hirviente y la solución se mezcla con igual volumen de solución alcohólica de saturada de ácido pícrico. se deja enfriar se separan los cristales por filtración y se reocrystalizan de alcohol hirviente; finas agujas amarillas. Cuando se calienta la combinación se ennegrece a los 200° y funde totalmente con descomposición a 213°.

Análisis. ^(x) Substancia 0,00531 grs. gastado; 3,680 c.c. ácido sulfúrico

0,02 N. Calculado para C₁₁H₁₁O N₃ C₆H₃O₇N₃ N % 19,5; hallado

N % 19,4

(x) Las determinaciones de nitrógeno fueron efectuadas por la Dra. Ana G. de Varela, en el laboratorio de la cátedra de Química orgánica Farmacia II U. de la Escuela de Farmacia de la Facultad de Medicina de Buenos Aires.

Combinación con bicloruro de mercurio.

0,20 gs. de la base se disuelven en 5 c.c. de ácido clorhídrico diluido. En caliente se agregan 0,50 gs. de bicloruro de mercurio disueltos en 20 c.c. de agua. Dejar enfriar, separar los cristales por filtración. P.f. 195°/196° recristalizado de alcohol caliente.

Análisis. Substancia 0,0954 gs.; gastado: 1,80 c.c. SCN.NH_4 0,1N.

Calculado para $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{O}_2\text{N}_3 \cdot \text{HgCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ Hg% 39,63; hallado

Hg% 37,84.

SINTESIS DE 4 AMINO 5 m.p. DIOXIMETILENFENIL PIRIMIDINAFórmula $C_{11}H_9O_2N_3$ P.M. 215

Para la obtención de esta base y sus derivados se siguió el mismo método que el indicado para obtener la base 4 amino 5 p.metoxifenil pirimidina y sus derivados.

10 gs. de m.p.dioximetilenfenilacetnitrilo dieron 2,5 gs. (20%) de un polvo amarillo. Recristalizado de agua, p.f. 174°

Análisis. Substancia 0,00711 gs., gastado: 4,688 c.c. H_2SO_4 0,02 N.

Calculado para $C_{11}H_9O_2N_3$: N % 19,53; hallado: N % 18,46

Combinación con ácido clorhídrico

La combinación con ácido clorhídrico funde a 250° - 251°

Análisis. Substancia 0,1047 grs.; gastado 4,04 c.c. NO_3Ag 0,1 N.

Calculado para $C_{11}H_9O_2N_3 \cdot HCl$ % 14,11; hallado Cl % 13,69

Combinación con ácido pícrico

. . .

Recristalizado de alcohol hirviente, finas agujas amarillas, p.f. 223°
224°.

Análisis. Substancia 0,01531 gs.; gastado: 2,89 H_2SO_4 0,02 N.

Calculado para $C_{11}H_9O_2N_3 \cdot C_6H_3O_7N_3$: N % 18,91; hallado: N % 18,21

Combinación con bicloruro de mercurio.

Recristalizado de agua caliente p.f. 219°-220°.

Análisis. sustancia 0,1014 gs. Gastado: 1,82 c.c. SCN.NH_4 0,1 N. Calculado para $\text{C}_{11}\text{H}_9\text{O}_2\text{N}_3 \cdot \text{Cl}_2\text{Hg} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: Hg% 38,38; hallado: Hg% 37,42.

SÍNTESIS DE 4 AMINO 5 m.p. DIMETOXIFENIL PIRIMIDINAFórmula $C_{12}H_{13}O_2N_3$ P.M. 231

10 gs. de m.p. dimetoxifenilacetónitrilo fueron tratados como se indica en la marcha señalada para la obtención de las otras bases pirimidínicas, con la diferencia que la precipitación se efectuó con carbonato de sodio, desechando la precipitación inicial que arrastra consigo impurezas resinosas formadas en la reacción.

Rendimiento: 1,8 gs. (13,8 %) de un polvo pardo-amarillento,

Recristalizado de alcohol, prismas incoloros p.f. 163°

Análisis. Substancia 0,00355 gs. gastado: 5,539 c.c. H_2SO_4 0,02 N.

Calculado para $C_{12}H_{13}O_2N_3$: N % 13,13; hallado N % 13,15

Combinación con ácido clorhídrico

Cristales blancos p.f. 254°

Análisis. Substancia 0,1033 gs. gastado: 3,85 c.c. HCl 0,1 N.

Calculado para $C_{12}H_{13}O_2N_3 \cdot HCl$ Cl % 11,9; hallado: Cl % 12,26

Combinación con ácido pícrico

Recristalizado de alcohol hirviente finas agujas amarillas que calentadas se oscurecen a 190° y funden con descomposición a 216°

Análisis. Substancia 0,01247 gs. gastado: 2,32 c.c. H_2SO_4 0,02 N.

Calculado para: $C_{12}H_{13}O_2N_3 \cdot C_6H_3O_7N_3$: N % 18,28; hallado: N % 18,21

Combinación con bicloruro de mercurio.

Recristalizado de agua, finas agujas, p.f. 197°/198°.

Análisis. Sustancia 0,1038 gs.; gastado 1,88 c.c. SCN.NH_4 0,1

N. Calculado para $\text{C}_{12}\text{H}_{13}\text{O}_2\text{N}_3 \cdot \text{Cl}_2\text{Hg} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: Hg% 37,24, hallado

Hg% 36,34.

SINTESIS DE 4 AMINO 5 m. METOXI p. ACETOXIFENIL PIRIMIDINAFórmula $C_{13}H_{13}O_3N_3$ P.M./259

Para la obtención de esta base se siguió la marcha indicada para la obtención de la 4 amino 5 m.p. dimetoxifenil pirimidina.

10 gs. de m. metoxi p. acetoxifenilacetónitrilo rindieron 7,5 gs. (12%) de un polvo amarillo. Recristalizado de alcohol, prismas incoloros p.f. 230°/231°.

Análisis. sustancia 0,00817 gs., gastado: 5,285 c.c. H_2SO_4 0,02 N. Calculado para $C_{13}H_{13}O_3N_3$: N% 16,21; hallado N% 17,97.

Combinación con ácido clorhídrico.

Cristales blancos, p.f. 260°/261°.

Análisis. sustancia 0,1034 gs., gastado: 3,88 c.c. HNO_3 0,1N. Calculado para $C_{13}H_{13}O_3N_3 \cdot HCl$: Cl% 12,01, hallado Cl%: 10,86.

Combinación con ácido pícrico.

Recristalizado de alcohol hirviente, finas agujas amarillas p.f. 230°/232°.

Análisis. sustancia 0,00625 gs., gastado: 4,082 c.c. H_2SO_4 0,02N. Calculado para $C_{13}H_{13}O_3N_3 \cdot C_6H_3O_7N_3$ N% 17,21; hallado N%: 18,2

Combinación con bicloruro de mercurio.

Recristalizado de agua caliente, p.f. 212°/213°.

Análisis. Substancia 0,1057 gs., gastado 1,75 c.c. SCN.NH 0,1 N

Calculado para $C_{13}H_{13}O_3N_3HgCl_2 \cdot 2H_2O$ Hg% 35,40; hallado

Hg% 36,05.

- C O N C L U S I O N E S -

La formamida reacciona con los siguientes nitrilos: p.metoxifenil-acetonitrilo, m.p.dioximetilenfenilacetónitrilo, m.p.diacetoxifenil-acetonitrilo y m.metoxi p.acetoxifenilacetónitrilo, en las o-ciones señaladas por Novelli, conduciendo a la obtención de las co-rrespondientes bases pirimidínicas.

En el curso de este trabajo se han preparado las siguientes nuevas especies químicas:

4 amino 5 m.p.dioximetilenfenil pirimidina.

4 amino 5 m.p.dimetoxifenil pirimidina.

4 amino 5 m.metoxi p.acetoxifenil pirimidina.

De las mismas se han preparado los respectivos clorhidratos, picratos y derivados de combinación con bicloruro de mercurio.

. - . - . - . - .

- B I B L I O G R A F I A -

- 1.- Novelli A.; An.Asoc.Qca.Arg. 31, 23.
- 2.- Davies W.H. y Piggott H.A.; J.Chem.Soc. año 1945 pag. 347.
- 3.- Davies W.H., Johnson A.W. y Piggott H.A.; J.Chem.Soc. año 1945 pag. 352.
- 4.- Julian P.L. y Sturgis B.M.; J.Am.Chem.Soc. 57 1126.
- 5.- Granacher y Colaboradores; Helv.Chim Acta 5 610 y 6 458.
- 6.- Organic Syntheses. Volumen XIII p. 102.
- 7.- Fisher H.E. y Hibbert H.; J.Am.Chem.Soc. 69 2203.

. - . - . - . - . - .

A handwritten signature in cursive script, possibly reading "Pover", is written over a diagonal line that extends from the bottom left towards the top right of the page.