

2023 Diciembre, 13(5): 1-1

PERFORACIÓN DE LA VESÍCULA BILIAR: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE LA COLECISTITIS AGUDA

Dra. Candia Guillermina, Jefe de Residentes HIGA San Roque, Gonnet

Dra. Tizzano Sofia, Residente HIGA San Roque, Gonnet

Dr. Sanz Alan, Staff de División de Esofagogastró HIGA San Roque, Gonnet

Dra. Arro Carolina Staff de División Cirugía Percutánea HIGA San Roque, Gonnet

Dr. Guerrini Nicolas, Jefe de Servicio de Cirugía HIGA San Roque, Gonnet

Resumen

La perforación de la vesícula biliar se presenta hasta en el 10% de todos los casos de colecistitis aguda. Si bien es una complicación poco frecuente, puede llegar a ser potencialmente mortal. La incidencia aumenta en el sexo masculino y a partir de los 60 años de edad. Raramente se diagnostica en el preoperatorio, pero con un alto índice de sospecha clínica asociado a estudios de imágenes como la ecografía o la tomografía, se puede llegar a un diagnóstico precoz adecuado. Se asocia a una mortalidad de hasta el 70%.

Presentamos un caso clínico resuelto en nuestro Servicio