DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN PIEZA DENTARIA CON ANTECEDENTE DE TRAUMATISMO. CASO CLÍNICO.

Autoras: MICOZZI Paz, PIROVANI Manuela
 Tutoras: Diez Laura, Obregoso Ma. Eugenia
 Dr. Prof. Pablo Alejandro Rodriguez
 Facultad de Odontología. Universidad de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN

Las lesiones dentales traumáticas de piezas permanentes ocurren con frecuencia en niños y adultos jóvenes. Las fracturas y luxaciones son las más comunes. El diagnóstico adecuado, la planificación del tratamiento y el seguimiento son importantes para mejorar un resultado favorable. Dependiendo de la secuela que el traumatismo genere, se proponen varias opciones de tratamiento con el fin de buscar la rehabilitación completa del paciente.

El objetivo de este trabajo es destacar la importancia de realizar un correcto diagnóstico clínico-radiográfico de piezas dentarias con antecedentes de traumatismo.

CASO CLÍNICO

- Paciente de sexo masculino.
- 23 años.
- Antecedente de traumatismo dentario hace 7 años (golpe de puño).

• Dx Pulpar: Necrosis
 • Px. Periapical: Periodontitis Apical Crónica

Foto preoperatoria

CBCT preoperatoria

Rx Preoperatoria

Conductometría

Conometría

Rx Postoperatoria

PROTAPER-GOLD™

Foto postoperatoria

Rx control !mes

CONCLUSIÓN

El correcto examen clínico, radiográfico y tomográfico, un tratamiento juicioso y el seguimiento por parte del odontólogo sumado a la colaboración por parte del paciente permite mantener a largo plazo la pieza traumatizada en boca.

BIBLIOGRAFÍA

- Anthony JA. (2012; Febrero). International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 1. Fractures and luxations of permanent teeth. Dental traumatology.
- Aras MH. (2008 Octubre). Treatment of traumatized maxillary permanent lateral and central incisors horizontal root fractures. Department of oral and Maxillofacial Surgery