

2016 Junio, 6(3): 1-1

INSIDENCIA Y MANEJO DEL DIVERTICULO DE MECKEL COMPLICADO EN EL ADULTO

Schlain SF, Ferrari EC, DeSimone R, Antelo MV

HIGA San Roque de Gonnet. sergioschlain@hotmail.com

Introducción

El divertículo de Meckel es una malformación congénita del intestino delgado, consecuencia de la falla en la obliteración del conducto vitelino durante el desarrollo embriológico. La mayoría son asintomáticos. Las complicaciones son poco frecuentes e incluyen inflamación, perforación, hemorragia, intususcepción, obstrucción intestinal, y transformación maligna.

Objetivos

El trabajo presenta un doble objetivo: 1-Presentar la incidencia que observamos en el HIGA San Roque en los últimos 7 años y 2-mostrar el tratamiento que se les dio a los casos complicados observados.

Materiales y Método

Se presentaron 11 casos de divertículo de Meckel complicado. 9 se interpretaron como apendicitis, y 2 como abdomen agudo obstructivo. Todos los pacientes fueron de resolución quirúrgica.

Resultados

Se realizaron 10 laparotomías y 1 laparoscopia. En 8 casos se llevó a cabo la diverticulectomía, y en 3 casos se realizó resección y anastomosis término-terminal de intestino delgado.

Discusión

El 60% de los pacientes con divertículo de Meckel sintomáticos son menores de 2 años. No tiene prevalencia de sexo, pero la incidencia de complicaciones es 3 a 4 veces mayor en varones. Nuestra incidencia de divertículo de Meckel complicado en pacientes adultos resulta elevada en comparación con la bibliografía consultada en periodos de tiempo similares. Las manifestaciones clínicas inespecíficas llevaron a que el diagnóstico fuese intraoperatorio. Todos se resolvieron quirúrgicamente y evolucionaron de forma satisfactoria.

Palabras claves: Insidencia-Manejo-Diverticulo de Meckel