

Resumen

Para alcanzar el éxito en el tratamiento endodóntico, uno de los grandes desafíos es acceder, conformar y sellar la totalidad de los conductos radiculares. El clínico no sólo deberá tener conocimiento básico de la morfología interna del sistema de conductos, sino conocer las variaciones anatómicas de los conductos en las piezas dentarias. Estadísticamente, la posibilidad de un tercer conducto, en el primer premolar inferior es menor al 1%. El objetivo del siguiente trabajo es demostrar, dos casos clínicos de primeros premolares inferiores con tres conductos realizados en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Plata

Descripción del Caso

Caso clínico 1


Pieza 44

Paciente femenino

Diagnostico: Pulpitis irreversible

Tratamiento:

Biopulpectomia total



Caso clínico 2

Pieza 34

Paciente masculino

Diagnostico : Necrosis pulpar séptica

Tratamiento:

Tratamiento de conducto

Conclusiones

Se encontraron tres conductos principales en la pieza número 44 y tres conductos principales en la pieza número 34

Conclusión:

El conocimiento de la morfología interna y externa de la pieza dentaria nos permitirá, junto a la correcta interpretación radiográfica y el estudio de la casuística, resolver las variaciones anatómicas y morfológicas complejas que estas puedan presentar, y así mejorar el pronóstico del tratamiento.