

NOTAS SOBRE UNA COLECCION OFIDIOLOGICA DE
H. WEYEMBERG (1883) DEL MUSEO ZOOLOGICO DE
LA UNIVERSIDAD DE FLORENCIA (ITALIA).

Durante un trabajo de revisión taxonómica realizado recientemente en la Colección Herpetológica del Museo Zoológico de la Università di Firenze, Italia, dirigido por el Prof. B. Lanza, a quien deseo expresar aquí mis agradecimientos, me encontré con la grata sorpresa de una notable serie ofidiológica de la provincia de Córdoba, Argentina, todavía en espera de identificación. Una colección enviada como homenaje, en 1883, por H. Weyemberg al Ministero della Pubblica Istruzione, en Roma, y luego depositada en el Museo Zoológico de la Universidad de Florencia. El material, en perfectas condiciones, permite presentar una lista interesante de especies de Colubridae, Xenodontinae y de Crotalidae, todas rotuladas "Sierras de Córdoba". A continuación se consigna dicha lista, en orden alfabético, con los números actuales de la Colección de Florencia.

Colubridae:

- Clelia rustica (1 Ej.): MZUF -M.2552, N° C-11836.
Liophis anomalus (4 Ej.): MZUF -M.2552, N° C-11841, 11861, 11863, 11864.
Liophis poecilogyrus platensis (4 Ej.): MZUF -M.2552, N° C-302, 11834, 11845, 11855.
Liophis sagittifer modestus (3 Ej.): MZUF -M.2552, N° C-11838, 11852, 11854.
Lystrophis d'orbignyi (1 Ej.): MZUF -M.2552, N° C-11857.
Lystrophis semicinctus (2 Ej.), localidad "Córdoba", probablemente también de Weyemberg, 1888: MZUF -N° 12020, 12023.
Oxyrhopus rhombifer bachmanni (1 Ej.): MZUF -M.2552, N° C-11858.
Philodryas aestivus aestivus (1 Ej.): MZUF -M.2552, N° C-11842.
Philodryas psammophideus psammophideus (2 Ej.): MZUF M.2552, N° C-11835-11862.
Rhadinea occipitalis (2 Ej.): MZUF-M.2552, N° C-11859, 11860.
Thamnodynastes strigilis (3 Ej.): MZUF-M.2552, N° C-11839, 11847, 11856.
Tomodon ocellatus (2 Ej.): MZUF -M.2552, N° C-11850-11851.
Waglerophis merremi (2 Ej.): MZUF-M.2552, N° C-11840, 11846.
 Crotalidae:
Rothrops newwiedi diporus (3 Ej.): MZUF -M.2552, N° C-11837, 11843, 11849.

Rasgo interesante de la serie ofidiológica remitida por Weyemberg es la presencia en ella de elementos de fisonomía mesopotámica y pampásica, como Tomodon ocellatus, Liophis poecilogyrus platensis, y Thamnodynastes strigilis, este último no incluido en la lista de Di Fonzo de Abalos y Rucher (1981) por carecer de datos precisos de colección. Asimismo merecen particular relieve las especies de reconocida distribución nortea, como Rhadinea occipitalis, Liophis sagittifer modestus, y Philodryas aestivus aestivus, también no incluido en la lista de Di Fonzo de Abalos y Rucher (1981) por las razones ya recordadas. El elenco sistemático de los ofidios argentinos de Abalos y Mischis (1975) no da, por otro lado, detalles pormenorizados sobre los límites exactos, meridionales y occidentales, de todas aquellas formas.

Cabe reexaminar aquí una publicación muy poco mencionada sobre la herpetofauna cordobesa (De Marietti, 1969), en la cual la autora literalmente afirma, con respecto a los ofidios: "... en Córdoba encontramos alrededor de unas 25 especies; ordenadas sistemáticamente citaremos las más importantes." A continuación transcribo la enumeración de De Marietti, añadiendo entre parentesis donde se necesita, las actualizaciones correspondientes.

- Clase Reptilia
 Subclase Lepidosauria
 Orden Ophidia
 Suborden Colubriformes
 Familia I Colubridae
 Subfamilia I. Colubrinae
 Géneros/
Leimadophis poecilogyrus (Liophis poecilogyrus)
Liophis occipitalis (Rhadinea occipitalis)
Liophis undulatus (incertae sedis, fide Dixon 1980).
Ophis newwiedi (Xenodon newwiedi)
Ophis merremi (Waglerophis merremi)
Lystrophis semicinctus
 Subfamilia II. Roiginae
 Géneros:
Pseudoboa labialis (Oxyrhopus labialis = O. formosus ?)
Chlorosoma psammophideus (Philodryas psammophideus psammophideus)
Chlorosoma schottii (Liophis poecilogyrus)
Elapomorphus bilineatus (Elapomorphus spegazzinii suspectus)
Pseudoboa rhombifera (Oxyrhopus rhombiferus bachmanni)
Rhinostoma guianense (Phimophis guerini) (?)
Dryophylax pallidus strigilis (Thamnodynastes strigilis)
Tomodon ocellatus ocellatus (Tomodon ocellatus)
 Familia II. Elapidae
 Subfamilia. Elapinae
 Géneros:

Micrurus frontalis (Micrurus frontalis pyrro-
cryptus)

Micrurus lemniscatus (Micrurus frontalis py-
rhocryptus).

Familia III. Crotaloidea

Subfamilia I. Lachesinae

Géneros:

Rothrops alternata

Rothrops newiedii meridionalis (Rothrops neu-
wiedi diporus)

Subfamilia II. Crotalinae

Géneros: Crotalus terrificus terrificus (Cro-
talis durissus terrificus)

El breve análisis arriba realizado de la colección ofidológica de Weyemberg, del Museo Zoológico de Florencia, junto con los comentarios y datos que la acompañan, una vez más ponen énfasis sobre el peculiar carácter de transición de la herpetofauna de la región serrana cordobesa, a la vez por las varias formas subtropicales del noroeste que en ella se integran, y por la repetida penetración de elementos de fisonomía mesopotámica y pampásica. Estos últimos acrecentan sin duda el evidente significado biogeográfico de los recientes hallazgos en Córdoba de quelonios acuáticos de la biota litoral, como Hydromedusa tectifera para Río Tanti, y Phrynops hilarii para el Lago San Roque y la confluencia de los ríos Anisacate y Segundo, señalados por Cabrera, Haro y Manguiño (1985). Desco subrayar, por último, el valor histórico de la colección objeto de las presentes notas, debido a la gran escasez, en las colecciones herpetológicas del país, de los materiales reunidos en el siglo pasado por Weyemberg, en particular entre las reliquias actualmente existentes en el Museo de Ciencias Naturales de Córdoba, a las cuales probablemente debía referirse De Marietti (1969) en su lista textualmente transcrita.

Bibliografía.

- Abalos, J.W. y C.C. Mischis. 1975. Elenco sistemático de los ofidios argentinos. *Bolet. Acad. Nac. Cien. Córdoba* 51 (1-2): 55-76.
- Cabrera, M.R., J.G. Haro y J.C. Manguiño. 1985. Chelidae en la provincia de Córdoba. Comunicaciones III Reunión Com. Herpetol. Córdoba, 6 Sept. 1985.
- De Marietti, E.M.R. 1969. Notas ofidológicas, en: Follote 10, Depart. Hist. Nat., Museo Wien. Nat., 19 Mitre, Córdoba.
- Di Fonzo de Abalos, A. y E.H. Bucher. 1981. La fauna de serpientes de la provincia de Córdoba, Argentina. *Ecosur* 8 (16): 89-98.
- Dixon, J.R. 1980. The neotropical colubrid Snake genus Liophis: The generic concept. *Contr. in Biol. and Geol. Milwaukee Public Mus.* 31: 1-40.

José María Ceí
Departamento de Ciencias Naturales
Univ. Nac. de Río Cuarto. Córdoba.

SOBRE LA PRESENCIA DE TORTUGAS DULCEACUICOLAS (TESTUDINES: CHELIDAE) EN LA PROVINCIA DE MENDOZA (ARGENTINA). (1)

ABSTRACT: ABOUT THE PRESENCE OF THE FRESHWATER TURTLES (TESTUDINES: CHELIDAE) IN MENDOZA (ARGENTINA).

We mention the "freshwater turtle" Phrynops hilarii for Mendoza province and we give favour argument in its origin as a case of anthropocory no official.

Durante el período comprendido entre los años 1981 a 1984, el Grupo de Actividades Subacuáticas del Acuario Municipal de Mendoza, a cargo del Prof. R. Gutiérrez y del autor, emprendió distintos viajes de exploración a espejos de agua de los sectores Sur y Suroeste (Valle Grande, Nihuil, Pozo de las Animas y laguna de La Niña Encantada; 1981), Centro y Norte (Lagunas de Alto Verde, El Carrizal y Río Mendoza; 1981 y 1982) de la provincia de Mendoza. En el último sector mencionado se pudo constatar fehacientemente la presencia de la tortuga de laguna, Phrynops hilarii (D. et B.), quelonio pleurodirio no mencionado hasta el presente en la literatura herpetológica referente a la fauna local (Ceí y Roig, 1977; Ceí et al., 1978; Freiberg, 1977 y 1979; Roig y Contreras 1975).

Viajes posteriores (1982, 1983, 1984) permitieron la captura de algunos ejemplares para su precisa asignación específica (A), como así también de la ictiofauna acompañante.

Los datos obtenidos nos permiten citar por el momento sólo dos poblaciones estables de este Chelidae para la provincia (Sin embargo creemos probable que su número es mayor).

Una de dichas poblaciones se ubica en el embalse El Carrizal (Dpto. Rivadavia, Dto. Carrizal) donde en Enero de 1981, en el embarcadero del Yacht Club tuvimos oportunidad de ver repetidas veces, a horas de la tarde, grupos de cuatro a seis adultos moviéndose lentamente o posados a tres o cuatro metros de profundidad (profundímetro de columna Cressi Sub) en extensas praderas de characeas (Chara sp.) con particular abundancia de moluscos (Ampullaria sp.). El sitio de anidación lo hallamos sobre la costa este del embalse, en las proximidades del Río Tunuyán, donde encontramos varias puestas en el mes de Diciembre (1981). En cuanto a la ictiofauna acompañante, se relevaron las siguientes especies: Cnesteiodon decemmaculatus (panzona), Myxosia lineata lineata (madrecita o ovejito), Chelodactylus sp. (mojarra plateada), Odontesthes bonariensis (pejerrey), Pericichthys trucha (perca) y Cyprinus carpio (carpa, pez rojo).

(1) Trabajo presentado en la III Reunión de Comunicaciones de la Asociación Herpetológica Argentina, Córdoba 6 de setiembre de 1985.