

**NOVEDADES ZOOGEOGRÁFICAS****NUEVAS LOCALIDADES PARA *BUFO FERNANDEZAE* GALLARDO, 1957 EN EL CENTRO DE ARGENTINA**R. M. TORRES<sup>1-2</sup>; J. G. HARO<sup>1-2</sup>, M. SIRONI<sup>2</sup> & M. A. BISTONI<sup>2</sup>

1. Museo de Zoología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.

2. Cátedra de Diversidad Animal II, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.

*Bufo fernandezae* Gallardo, 1957. REP. ARGENTINA, PROVINCIA DE CÓRDOBA, Feb. 1985. Dpto. San Justo, Cañada de Jeanmaire, 31° 24' S, 62° 28' W. 1 individuo. Museo de Zoología de la Fac. Cs. Ex. Fís. y Nat., Univ. Nac. Córdoba (MZUC 2115): 74. Colectores: J. G. Haro y M. A. Bistoni. Ene. 1997. Desembocadura del río Plujunta en la laguna Mar Chiquita, 30° 55' S, 62° 44' W. 2 individuos. MZUC 2115: 88, 89. Colector. R. M. Torres. PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, Mar. 1997. Dpto. Quebrachos, Paso de la Cina, 29° 49' S, 62° 48' W. 1 individuo. MZUC 2115: 90. Colector: M. Sironi.

lada junto a individuos de *Leptodactylus ocellatus* y *Philodryas patagoniensis*. Los individuos de la desembocadura del río Plujunta fueron hallados en regurgitados de ejemplares de "Garza Bueyera" *Bubulcus ibis* que nidificaban en la zona. El ejemplar de Paso de la Cina fue hallado en la orilla de un bañado junto a individuos de *Leptodactylus chaquensis*.

La presencia de esta especie en noreste de la provincia de Córdoba y sur de Santiago del Estero no es extraña, considerando que la misma fue citada para el departamento Castellanos en la provincia de Santa Fe (Gallardo, 1974), el cual es colindante con dicha zona.

**COMENTARIOS**

El "sapito jardinero" *Bufo fernandezae* se distribuye en la Argentina por la región litoral-mesopotámica, desde la provincia de Corrientes a la parte norte y central de la provincia de Buenos Aires (Cei, 1980). Di Tada *et al.* (1996) lo citan para la región sudeste de la provincia de Córdoba, dando como límite norte de su distribución la zona sur del departamento San Justo. En la presente comunicación se amplía el área de distribución conocida de esta especie a todo el este de Córdoba.

El ejemplar coleccionado en Cañada de Jeanmaire se halló en una pequeña laguna sa-

**BIBLIOGRAFÍA CITADA**

- CEI, J. M. 1980. Amphibians of Argentina. *Monitore zool. Ital. Monogr.* N° 2, 609 pp.
- DI TADA, I. E., M. V. ZAVATTIERI, M. E. BRIDAROLLI, N. E. SALAS Y A. L. MARTINO. 1996. Anfibios anuros de la provincia de Córdoba. Pp. 191-213, en: Bucher, E. H. e I. E. Di Tada eds. *Biodiversidad de la provincia de Córdoba. Vol. I. Fauna.* U.N.R.C. y C.Z.A. Córdoba.
- GALLARDO, J. M. 1974. *Anfibios de los alrededores de Buenos Aires.* Eudeba. Buenos Aires.