

NOVEDADES ZOOGEOGRÁFICAS**MELANOPHRYNISCUS
MONTEVIDENSIS (PHILIPPI, 1902)
(ANURA, BUFONIDAE)**

Localidad: Brasil, Estado de Rio Grande do Sul, Alvorada, Barra do Chui, 33° 45'S 53° 16' W. Febrero de 1989. Colector: M. Tedros. (Colección de Batracios de la Sección Zoología Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Uruguay ZVCB 7276, ZVCB 7277 y ZVCB 7278).

Comentarios: *Melanophryniscus montevidensis* ha sido considerada hasta el momento como una especie endémica del Uruguay, habitando una estrecha banda de praderas y arenales en las costas del Río de la Plata y del Océano Atlántico (Departamentos de Canelones, Maldonado, Montevideo y Rocha) (Langone, 1995, Mus. Dámaso Antonio Larrañaga, Intend. Muncip. Montevideo, Divulg. 5: 1-123). El registro que se presenta aquí es el primero para el Brasil, implicando la pérdida de status de especie endémica del Uruguay. Todos los ejemplares fueron encontrados vocalizando luego de intensas lluvias en charcos temporarios en los arenales cercanos a la costa del Océano Atlántico y en la vecindad de pequeños cursos de agua que drenan al Arroyo Chuy. Algunas parejas fueron vistas y fotografiadas en amplexo. El hábitat en esta localidad es similar al descrito para la especie en el Uruguay (Kolenc, 1987, Aquamar, Madrid, 5: 16-21). Los autores agradecen a José Langone por la revisión del manuscrito, a Raúl Maneyro y a Diego Núñez.

MARCELO TEDROS¹
FRANCISCO KOLENC²
& CLAUDIO BORTEIRO³

1. China 2202, CP 12800, Montevideo, Uruguay. E-mail: mtedros@adinet.com.uy

2. Grecia 3678, CP 12800, Montevideo, Uruguay. E-mail: kolenc@adinet.com.uy

3. Rio de Janeiro 4058, CP 12800, Montevideo, Uruguay. E-mail: caiman@adinet.com.uy

NOVEDADES ZOOGEOGRÁFICAS**LIOLAEMUS SILVANAЕ (DONOSO
BARROS & CEI, 1971) (IGUANIA:
LIOLAEMIDAE)**

Localidad: República Argentina, Provincia de Santa Cruz, Dep. Río Chico (48° 34' S 71° 25' W), Estancia La Justita, Meseta Lago Strobel, 1100 msnm. Dos adultos (un macho y una hembra). MACN 31916-31917. Johnson, Casañas & Piagazzi cols., 10 de Diciembre de 1985.

Comentarios: El género monotípico *Vilcunia* fue descrito por Donoso Barros y Ceí (1971, J. Herpet., 5: 89-95), citando a *Vilcunia silvanae* como endémica de la meseta del lago Buenos Aires con ejemplares colectados en el Puerto Lebrun y Laguna del Sello. En publicaciones posteriores (Ceí, J. M. 1986, *Mus. reg. Sci. nat. Torino, Monogr.* 4: 1-527; Scolaro, J. A. 1992, *Acta zool. Lilloana*, 41: 287-293) mencionan el endemismo de *Liolaemus silvanae* en la meseta del lago Buenos Aires. Posteriormente, Frost y Etheridge (1989, *The University of Kansas, Museum of Natural History, Miscellaneous Publication*, 81: 1-65) incluyeron a *Vilcunia* en la sinonimia de *Liolaemus*. Esta nueva cita extiende la distribución de *Liolaemus silvanae*, 190 km al sur, tomando como referencia la Laguna del Sello de la meseta del Lago Buenos Aires.

CRISTIAN SIMÓN ABDALA¹
& JUAN MANUEL DÍAZ GÓMEZ²

1. Instituto de Herpetología, Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. 4000- Tucumán. Argentina. E-mail: popper@tucbbs.com.ar

2. Cátedra de Anatomía Comparada, Fac. de Cs. Naturales, Universidad Nacional de Salta. Avda. Bolivia 5150, 44. Avda. Bolivia 5150, 4400- Salta, Argentina. E-mail: jman_acunsa@yahoo.com.ar