

NOVEDADES ZOOGEOGRÁFICAS

PHYSALAEMUS ALBONOTATUS
STEINDACHNER, 1864 (ANURA:
LEPTODACTYLIDAE)

Localidad. República Argentina, Provincia de Buenos Aires, Partido de Ramallo. Islas de Obligado (33° 32' S, 59° 53' O). 1.- Colector: R. Herrera, 24 de enero de 2001, MACN 37381. 2.- Cueva «de los lechuzones» (33° 27' S, 60° 02' O). Colector: D. Voglino, 30 de marzo de 2002, MLP A. 3421.

Comentarios. Los ejemplares (ambos machos adultos) se colectaron sobre los bajíos ribereños existentes frente a las barrancas del río Paraná y dentro de uno de los cavernamientos naturales de las mismas. Desde el año 1999 se individualizó a esta especie mediante registros audioespectrográficos en bajos de inundación, cubiertos por hidrófitas de pequeño porte (como ciperáceas, verdolagales y duraznillares, etc). Además se reconocieron individuos en aguas estancadas (zanjas), dentro del casco urbano de Ramallo. Este taxón ha sido considerado de distribución matogrosso-chaqueña o chaqueña, y citado en Argentina para las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco y Santa Fe (Barrio, 1965. El género *Physalae-mus* en la República Argentina. *Physis*, Buenos Aires, 26 (70): 421-448; Gallardo, 1966. Zoogeografía de los anfibios chaqueños. *Physis*, Buenos Aires, 26(71): 67-81; Gallardo, 1979. En: The South American Herpetofauna: Its Origin, Evolution, and Dispersal. W. E. Duellman (ed.). Monogr. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas, (7): 302-307; Lobo, 1993. Descripción de una nueva especie del género *Physalae-mus* (Anura: Leptodactylidae) del noroeste argentino. *Rev. Española Herpetol.*, 7: 13-20; Céspedes *et al.*, 1995. Composición y distribución de la anfibiofauna de la Provincia de Corrientes, Argentina. *Facena*, 11: 25-49). La nueva cita amplía la distribución de la especie hacia la Región Litoral-Mesopotámica de la provincia de Buenos Aires (reforzando la existencia de

una zona de interdigitación entre ambas regiones zoogeográficas), encontrándose a 110 km al sur de Roldán, Santa Fe (localidad considerada como límite sur para la distribución de anfibios chaqueños) (Gallardo, 1968. Relaciones zoogeográficas de la fauna batracológica del oeste de la provincia de Santa Fe (Argentina). *Rev. Mus. Arg. Cs. Nats.* «B. Rivadavia», (Ecol.)1(1): 1-13), y a 230 km de la localidad de Recreo, Santa Fe (punto más austral conocido donde ha sido colectada; véase Barrio, *op. cit.*). Agradecemos a Gustavo Carrizo por sus comentarios y confirmar la identidad taxonómica de uno de los ejemplares.

RAÚL HERRERA¹
DAMIÁN VOGLINO²

¹C.C. Nº 253 (B1900ZAA) La Plata, Buenos Aires.
r h e r r e r a @ e n v i r o w e b . o r g

²Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Paseo del Bosque s/n (1900), La Plata.

d v o g l i n o @ e n v i r o w e b . o r g

Recibido: 03 / 03 / 2002

Aceptado: 02 / 06 / 2002