

NOVEDAD ZOOGEOGRÁFICA

NUEVA LOCALIDAD PARA
LEPTODEIRA ANNULATA
PULCHRICEPS EN ARGENTINA

Leptodeira annulata pulchriceps Duellman, 1958. Localidad: República Argentina, Provincia de Santiago del Estero, Departamento Copo, Monte Quemado (25°48'S, 62°52'W), «El Indio». 31 de Mayo de 1957. Coleccionista desconocido. Colección Herpetológica Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Buenos Aires, Argentina (MACN 37216). Un ejemplar macho adulto (490 mm LHC, 600 mm LT).

Comentarios: *Leptodeira annulata pulchriceps*, única representante del género en la Argentina, posee una distribución netamente relacionada a la región Chaqueña y fue citada en Tucumán, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, (Scrocchi, 1980, *Acta zool. lilloana* 36 (1): 149-151; Williams y Couurier, 1983, *Bol. Asoc. Herpet. Argentina* 1 (3): 7; Cei, 1993, *Mus. Reg. Sci. Nat. Torino, Monogr.* 14; Giraudo, 2002, *Serpientes de la Selva Paranaense y del Chaco Húmedo*, L.O.L.A., Buenos Aires; Giraudo y Scrocchi, 2002, *Smithsonian Herpetol. Info. Serv.* 132: 1-53). La presente es la primera cita para Santiago del Estero, en la zona central de la región Chaqueña Argentina.

SANTIAGO J. NENDA

Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Div. Herpetología. Angel Gallardo 470, (1405) Bs. As., Argentina.

s a n t i a g o j n e n d a @ y a h o o . c o m . a r

GUSTAVO J. SCROCCHI

Instituto de Herpetología, Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251, (4000) Tucumán, Argentina.

s o n i a k @ w e b m a i l . u n t . e d u . a r