

ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES GUSTATIVAS, OLFATORIAS, HALITOSIS Y CLÍNICAS EN PACIENTES FUMADORES CRÓNICOS CON FINES PREVENTIVOS.

Oviedo Arévalo JJ.

Patología y Clínica Estomatológica. F.O.L.P. 1 y 50

Universidad Nacional de La Plata

oviedoarevalo@hotmail.com

Las mucosas bucal y nasal de pacientes fumadores crónicos activos, son los primeros tejidos que toman contacto con el tabaco y sus productos de degradación. Los objetivos del presente trabajo fueron, la determinación de capacidades olfatorias, gustativas y manifestaciones de halitosis, para establecer conductas preventivas. Se examinaron clínicamente 50 pacientes de ambos sexos entre 20 a 40 años, fumadores de entre 10 a 20 cigarrillos diarios. Se realizó pruebas funcionales (test ciego para el paciente) de los sabores dulce y ácido, se completó e estudio investigando la capacidad olfatoria de la población involucrada en este estudio. Los resultados, nos permiten establecer que existieron diferencias significativas a favor del grupo masculino, en a capacidad olfatoria en relación al grupo femenino. En el examen en clínico se hallaron la presencia de gingivitis, palatitis nicotínica y úlcera traumática e hiperqueratosis. Es evidente que el consumo del tabaco produjo alteraciones gustativas y olfatorias en pacientes del sexo masculino. La halitosis tiene mayor prevalencia en el grupo femenino.