

## NOTAS

### RECTIFICACION TAXONOMICA Y NOMENCLATORIAL DEL PRESENTE STATUS DEL TAXON *LIOLAEMUS MELANOPS* BURMEISTER 1888

José M. CEI<sup>(1)</sup> y J. Alejandro SCOLARO<sup>(2)</sup>

**ABSTRACT:** The real status of the localised *Liolaemus melanops* Burmeister 1888 from Quelé Curá, Chubut, on the basis of its rediscovered original type, previously given as lost, is established. A reconsideration of the population units included in a general taxon "melanops", is carried out. The formerly synonymized *Liolaemus goetschi* Müller & Hellmich 1938 from Río Negro sandy habitats is revalidated as separated species from *L. melanops*.

Esta antigua especie de Burmeister (1888) quedó por muchas décadas en un estado de reactiva incertidumbre debido a la pérdida de su tipo original, oficialmente admitida por el Museo Argentino de Ciencias Naturales. En época relativamente reciente (1973), la localidad referida por Burmeister como Terra Typica (Quelé Curá o Sierra Colorada, aproximadamente a 50 km al nordeste de Telsen, Chubut) fue explorada por uno de nosotros (J.A. Scolaro), colectando algunos ejemplares que resultaron corresponder a la escueta descripción de Burmeister. Sobre la base de estos individuos se describió un Neotipo (Ceí, 1975) proponiéndose comparaciones de carácter deductivo con otras poblaciones del género *Liolaemus* localizadas en áreas aledañas. En particular, con *Liolaemus goetschi*, especie descrita por Müller & Hellmich (1938) para la región de Gral. Roca (Río Negro), la que por afinidades que posteriormente han demostrado ser inadecuadas, fue adscripta al mencionado taxón de Burmeister.

Siempre en condiciones de escasa información, demostrada por la inestabilidad nomenclatorial de ésta y otras formas del "grupo *fitzingeri*", se intentó establecer luego, mediante diferentes argumentaciones morfológicas y no morfológicas, una entidad taxonómica de extensa distribución geográfica y notable variación poblacional, a la cual una general denominación binomial pudo asociarse: *Liolaemus melanops*.

Dicho status taxonómico se mantuvo por un largo período hasta que en 1997 una prolija búsqueda de G. Carrizo (herpetólogo del citado Museo) condujo al hallazgo del Tipo de Burmeister inicialmente dado por perdido. En base a tal hallazgo, Ceí (1998) realizó una redescipción de la especie sugiriendo una reconsideración de la entidad taxonómica. Se aconsejaba además, una evaluación de las varias entidades poblacionales que desde 1975 la componían, y una oportuna verificación de los criterios que habrían predominado en la sinonimización de *Liolaemus goetschi* como forma psamófila del taxón *melanops*.

---

(1) Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. Hilario Cuadros 81 (5501) Godoy Cruz, Mendoza.

(2) CENPAT-CONICET, Universidad Nacional Patagonia, H.L. Jones 143, (9120) Puerto Madryn, Chubut. E-mail: scolaro@cenpat.edu.ar

Las poblaciones que se registran desde Río Negro a Chubut, formando parte de "melanops", presentan una morfología claramente heterogénea. En razón de ello, y teniendo en cuenta la evidente combinación de caracteres diferenciales observada, se estima ahora necesario volver a dar status no sinónimo a la especie *Liolaemus goetschi* Müller & Hellmich 1938. Su distribución se extendería a lo largo de las áreas medanosas de Río Negro, desde su Terra Typica y zonas aledañas (Catriel, Auca Mahuida) hasta áreas intermedias (Choele Choel) y las costas atlánticas (San Antonio Oeste, Bahía Creek).

En cuanto a las poblaciones al sur de estas últimas localidades (Península de Valdés, Puerto Madryn), las que exhiben algunas afinidades morfológicas con la forma *goetschi*, tampoco pueden asignarse al taxón *melanops*. En consecuencia, se considera necesario para ellas un detallado estudio biomorfológico para definir con suficiente claridad su real status taxonómico.

#### BIBLIOGRAFÍA

- BURMEISTER, H., 1888. Suplemento al grupo de los lagartos (algunas noticias sobre la fauna patagónica). *An. Mus. Nac. Buenos Aires*, 3: 252.
- CEI, J.M., 1975. *Liolaemus melanops* Burmeister and subspecific status of the *Liolaemus fitzingeri* group (Sauria, Iguanidae). *Journal of Herpetology*, 9 (2): 217-222.
- CEI, J.M., 1998. La mélanocéphalie chez les Lézards liolaemines et redécouverte de l'holotype de *Liolaemus melanops* Burmeister, 1888 longtemps considéré comme perdu (Reptilia: Squamata: Iguania: Tropiduridae). *Rev. Fr. Aquariol.*, 25 (1-2): 59-62.
- CEI, J.M. y J.A. SCOLARO, 1977. Herpetología Patagónica. XIII. La identidad de *Liolaemus goetschi* y de la forma *melanops* del grupo *Liolaemus fitzingeri* en Río Negro y Chubut. *Physis, Sec. C*, 36 (92): 225-226.
- MÜLLER, L. and W. HELLMICH, 1938. *Liolaemus*-arten aus dem westlichen Argentinien. I. *Liolaemus darwini* (Bell) und *Liolaemus goetschi* n.sp. *Zoologischer Anzeiger*, 123 (5-6): 130-142.

Recibido/Received/: 06-Nov-03  
Aceptado/Accepted/: 15-Dic-03