



VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE ZOOLOGIA 1980



5

A L

11

Universidad de Los Andes / Facultad de Ciencias Forestales / Teléfono (074 - 49538) / Mérida, Venezuela

ESPECIACIÓN DE LOS ICUANIDOS DEL GÉNERO *TROPIDURUS* EN EL DOMINIO CHAQUEÑO.

J. M. Cei

Departamento Ciencias Naturales

Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Prov. Córdoba,
Argentina.-

RESUMEN- Los procesos de especiación repetidamente observados en los más diferentes grupos herpetofaunísticos, ponen énfasis en la importancia biogeográfica del dominio subárido chaqueño y en su carácter de área de génesis. Entre los géneros que presentan formas vicárias, ya a nivel específico, a la vez en los ecosistemas chaqueños y en los ecosistemas mésicos de la selva litoral y sur-oriental, se indica ahora el género *Tropidurus*. Se señala tres de sus especies, entre 15° y 35° de latitud Sur, dos de las cuales - *Tropidurus spinulosus* y *T. melanopleurus*- son aparentemente exclusivas de la región chaqueña, y una tercera nueva forma pertenece al todavía imperfectamente conocido grupo neotropical *torquatus-hispidus*. Esta nueva forma representa probablemente una fase de especiación reciente y se relaciona, como especie vicaria, a las poblaciones del mencionado grupo distribuidas al este del Paraná, en habitats mesófilos.