

NOTICIAS

SOBRE ALGUNOS CETÁCEOS FÓSILES Y ACTUALES

DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA

Conservados en el Museo de La Plata,

POR

FRANCISCO P. MORENO

NOTICIAS

SOBRE ALGUNOS CETÁCEOS FÓSILES Y ACTUALES

DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA

Conservados en el Museo de La Plata.

POR

FRANCISCO P. MORENO

En el tomo III de la *Description physique de la Republique Argentine* (Buenos Aires 1879) el Dr. German Burmeister, cuyo reciente fallecimiento deploramos, ha dado la siguiente nómina de los Cetáceos que habitan las costas de la República y cuyos restos se conservan en el Museo Nacional de Buenos Aires.

Pontoporia Blainvillii Gray. *Delphinus microps* Gray. *Delphinus eceruleo-albus* Gray. *Tursio cymodoce* Gray. *Tursio obscurus* Gray. *Orca magellanica* Burm. *Pseudorca Grayi* Burm. *Phocaena spinipinnis* Burm. *Ziphius australis* Burm. *Physcter australis* Mac Leay. *Balaenoptera bonaerensis* Burm. *Balaenoptera patachonica* Burm. *Balaenoptera intermedia* Burm. *Balaena australis* Van Ben.

El Museo de La Plata no solo cuenta con restos de las especies nombradas sino que posee los de otras, que creo deber dar á conocer para que los cetólogos sepan qué materiales hay á su disposicion en este establecimiento para estender el conocimiento de los animales que de este orden tan interesante habitan esta parte del hemisferio austral.

Muy pocas investigaciones se han hecho en el litoral argentino con el objeto de estudiar los cetáceos que lo frecuentan y es para mi indudable que la lista que dá el Dr. Burmeister, aun agregándole las especies que mencionaré en estas noticias, ha de aumentar considerablemente una vez que se practiquen otras.

El mar arroja continuamente despojos de estos mamíferos. Los terrenos terciarios del Paraná, del Chubut y de Santa Cruz,

han suministrado interesantes vestigios de sus antiguas playas: las formaciones post-pampeanas que ocupan notables extensiones de costas, desde el delta del Paraná y toda la costa de la Provincia de Buenos Aires, hasta el extremo del continente, abundan en restos de estos animales y el Museo de La Plata cuenta ya con un material importante á este respecto. En cuanto á la época actual, basta recorrer las playas argentinas para conocer la abundancia de elementos que ellas ofrecen á los cetólogos, desde las grandes *Balaenopteras* que alcanzan un largo de mas de 25 metros, hasta las pequeñas y vivarachas *Pontoporias*.

Con un poco de buena voluntad de parte de los que visitan estas costas, las colecciones de cetáceos del Museo Nacional y del de La Plata, progresarian mucho. Con recojer los restos que se encuentran diseminados en las costas, anotando los puntos, la fecha, las condiciones en que los descubren, esto, cuando no se decidan á cazar los que generalmente se acercan y permanecen alrededor de los buques, obtendrian estos establecimientos los materiales que necesitan. Hay en la costa varios puntos que los antiguos pescadores llamaban « cementerios de ballenas » y mas de una vez he oido citar hallazgos que hubieran sido de gran importancia para nuestros museos, pero desgraciadamente estos están librados á sus propios elementos, muy reducidos por cierto, no habiendo llegado hasta el extremo austral de América el buen deseo que nuestros hermanos del Norte manifiestan por el progreso de estas instituciones, enviándoles todos los objetos que obtienen ó proporcionándoles recursos para que ellas los recojan.

La publicacion de estas noticias no seguirá orden sistemático alguno. Aparecerán cuando dispongamos de tiempo para examinar, en cada caso, los materiales que hemos reunido y contendrán datos sueltos que servirán más tarde para estudios más detenidos. Tambien su aparicion dependerá del tiempo en que se terminen los dibujos ilustraciones de las piezas de que se trate en ellas.

I

LAGENORHYNCHUS FLOWERI MORENO

A mediados de 1874 el Gobierno Argentino envió á la costa patagónica el Bergantin-goleta «Rosales», en el que tuvimos la suerte de embarcarnos para continuar las investigaciones sobre la parte austral de la República Argentina, iniciadas en el año anterior.

Despues de permanecer algun tiempo en el Rio Negro, el «Rosales» fondeaba á principios de Octubre en la bahía del rio Santa-Cruz. Al enfrentar á Monte-Entrance, una tropa de hermosos delfines, de color blanco y manchados de negro en la cabeza, lomo y cola, rodeó el buque escoltándolo hasta el fondeadero. Durante los días que allí permanecimos, no cesaron de acompañarnos de dia y de noche, haciéndonos escuchar su monótono soplido al levantarse sobre la superficie y hundirse bajo ella con lentitud inalterable. Si de dia era bello espectáculo verlos en sus evoluciones, rompiendo el verde del mar con sus blanquísimos costados y negrísimo y reluciente lomo, no lo era menos el que á la noche nos proporcionaban con los raudales de luz que dejaban en la estela fosforescente. Las tentativas, desgraciadamente para nosotros inútiles, de arponarlos, no los ahuyentaban, y cuando en bote excursionábamos en la correntosa bahía, cruzaban continuamente nuestro rumbo ó acompañaban la embareacion, aproximándose á ella tanto como lo permitían los remos. A veces, cuando se izaba la vela y se levaba remo, se allegaban tanto que casi podía posarse la mano sobre sus lomos, tan lentos eran los movimientos de estos mansos y hermosos cetáceos. Siempre á pares, muy cerca unos de otros, como atados á carros invisibles, primero nos mostraban su cabeza apenas sobresaliendo de las ondas, y luego el lomo arqueado, levantándolo tanto que se veian dos tercios de la altura del animal. En ningun caso les vimos alterar su marcha, acelerarla, ni mostrar la cola en bruscos movimientos. Producían en su camino una suave línea ondulada con intervalos bastantes largos entre la emersion é immersion. Sus movimientos eran tan suaves que al elevarse sobre la superficie producían apenas el ruido de la aspiracion, parecido al escape en

una pequeña máquina de vapor. Los vimos en ocasiones por centenares, cuando la mar estaba tranquila, y pudimos tomar nota de sus formas y colores, tan pausada era su marcha, pero por mas gestiones que hicimos no pudimos obtener ningun ejemplar, y fuimos tan desgraciados en esto, que apesar de haber recorrido las dos márgenes de la bahía, no encontramos ningun resto que pudiera referirse á su especie.

De regreso á Buenos Aires, buscamos en las obras de los navegantes y naturalistas que habían visitado esa bahía y otros puntos de la costa austral, indicaciones que correspondieran á estos animales, pero todo fué inútil. Entre los muchos delfines señalados en el Atlántico austral, ninguno correspondía á los datos tomados. La «Beagle», mandada por Fitz-Roy, á cuyo bordo iba Darwin, que permaneció durante algun tiempo en esa bahía, no obtuvo ninguno de ellos, y parece que el gran naturalista no les vió, pues no hubiera dejado de mencionarlos á haberlos observado como nosotros. Solo encontramos en sus colecciones el *Delphinus Fitzroyi* de la bahía San José, blanquizeo y negruzco, pero en el que la disposicion de estos colores es distinta.

En Diciembre de 1876 volvimos á Santa-Cruz, abordo de la goleta de este nombre, de propiedad de su capitan, nuestro amigo Luis Piedrabuena. En esta ocasion fuimos mas felices. Piedrabuena, viejo lobo de mar, acostumbrado á la pesca de cetáceos desde su infancia, no tardó en satisfacer nuestros deseos, arponando uno de los blancos delfines, pero esta caza tuvo lugar la víspera del regreso de la «Santa-Cruz» para Buenos - Aires, y como debíamos quedar en aquellos parajes para la exploracion del rio que ascendieron Fitz-Roy y Darwin, apenas tuvimos tiempo de tomar algunas medidas, preparar la piel y el esqueleto y confiarlo á quien debía transportarlo á Buenos Aires con el resto de las colecciones. Durante el viaje de regreso Piedrabuena arponó otro delfin frente al Chubut, pero si llegaron á nuestro museo particular la mayor parte de esas colecciones, no sucedió lo mismo con los cráneos y la piel de los delfines. Un marinero delicado de olfato los arrojó al mar, salvándose solo las espinas dorsales y las costillas de ambos; y, cómo conocer á cuál de las especies pertenecían esos restos decapitados y sin miembros?

Piedrabuena trató de reparar la pérdida en varios viajes, pero sin resultado.

En 1884 adquirió el Museo de La Plata las piezas que el señor Tonini del Furia había reunido en la Tierra del Fuego y en Santa-Cruz. Entre ellas venian dos pieles y dos cráneos

de cetáceos: uno de estos pertenecía á la piel de un ejemplar macho, el segundo era incompleto, encontrado suelto en la orilla; la segunda piel era de un ejemplar hembra muy joven.

Por fin podíamos conocer el cráneo de este interesante animal, teniendo, por suerte, el dibujo del cuerpo de una hembra, y el cráneo y la piel de un macho.

Desde esa época, muchos buques nacionales y extranjeros han visitado esa bahía teniendo á su bordo naturalistas, pero no han podido obtener ningun ejemplar de estos cetáceos. Los empleados de este Museo, que desde 1886 visitan anualmente ese punto, no han sido mas felices.

Nuestro sabio maestro y amigo, el doctor Burmeister, á quien mucho interesaba esta especie, y quien debía describirla en momentos que le sorprendió la muerte, nos decía que la consideraba completamente desconocida para la Zoología.

Los estudios cetológicos practicados en los últimos años, tienden á disminuir el número de tipos específicos. Hoy se reunen en una misma especie animales que antes se consideraban distintos genéricamente, basándose en diferencias que ahora se sabe son individuales, ó simplemente porque se les había encontrado en parajes muy distantes unos de los otros, en uno y otro hemisferio, al Norte y al Sud del Ecuador. Han desaparecido de los catálogos infinidad de géneros y especies, comprobada unas veces su completa similitud con otras, y en otras, porque las diferencias no son tan notables que puedan bastar para que se consideren como especies distintas á los animales que las presentan, siendo necesaria mayor documentación para resolver si hay lugar ó no á la diferenciación específica.

No disponemos en este establecimiento de elementos de consulta suficientes para poder asegurar que el cetáceo que describo es nuevo para la ciencia, ó ha sido ya señalado; pero no habiéndolo encontrado mencionado en las obras principales que tratan de cetología, y contando con la opinion del doctor Burmeister, quien la consideraba especie nueva, la nombro *Lagenorhynchus Floweri*, en honor del sabio director del Museo Británico de Historia Natural, cuyos estudios sobre cetología se cuentan entre los mas importantes efectuados hasta la fecha.

Caractéres exteriores

En la lámina 1 hemos representado tres vistas diferentes del individuo hembra arponado en Santa-Cruz por Piedrabuena, y el

ejemplar joven traído por el señor Tonini. El macho traído de ese punto por dicho señor, tiene los mismos colores, dispuestos de la misma manera. Estos dibujos y las siguientes medidas del primer ejemplar, hacen innecesaria la descripción en detalle del exterior de este cetáceo.

El ejemplar del señor Tonini se halla en mal estado de conservación, y no permite ser medido por haberse deformado la pieza, pero comparando algunas de las medidas tomadas en él con las del ejemplar de Piedrabuena, hemos encontrado completa armonía en sus partes. Mide solo un centímetro más de largo.

Hemos agregado el dibujo del ejemplar joven, traído por el señor Tonini, en el que se presentan las mismas manchas que en los adultos. Este individuo, que es hembra, mide 77 centímetros de largo.

DIMENSIONES

Largo total siguiendo la curva dorsal.....	1 ^m 380
» » en línea recta.....	1 ^m 290
Distancia desde la extremidad del rostro hasta el ojo.....	0 ^m 145
Distancia desde la extremidad del rostro hasta la base de la aleta dorsal.....	0 ^m 660
Distancia de la extremidad del rostro hasta la aleta pectoral.....	0 ^m 320
Distancia transversal entre el extremo de las aletas pectorales.....	0 ^m 480
Circunferencia del cuerpo delante de las mismas.	0 ^m 670
Ancho de la aleta caudal entre sus extremos..	0 ^m 340

El color de este delfín es igual en los tres ejemplares que he examinado; no hay la menor diferencia en la forma y distribución de las manchas, igualdad que permite asegurar que se trata de un delfín distinto del *Delphinus Fitzroyi* Waterh, aun cuando de éste solo se conozca la piel y la parte anterior del rostro y de la mandíbula inferior.

En los puntos donde del negro se pasa al blanco, se presentan pequeñas manchas en forma de lunares parduzcos. Los ojos, que son pequeños, eran de color castaño con iris verdoso; el paladar era blanco con manchas negras.

Cráneo

D I M E N S I O N E S	N 1	Nº 2
Mayor largo del cráneo.....	0.280	
Largo del rostro tomado entre la punta de los premaxilares y el centro de una línea tirada entre las escotaduras anteorbitales.....	0.139	
Distancia entre el centro de la línea arriba mencionada y el borde inferior del agujero occipital.	0.147	0.149
Mayor diámetro antero-posterior de la cavidad cerebral comprendido entre las fosas nasales y el borde inferior del agujero occipital.....	0.111	0.114
Diámetro transversal del cráneo entre las dos fosas temporales.....	0.138	0.134
El mismo diámetro entre los apófisis zigomáticos del temporal.....	0.140	
Altura del cráneo entre la gotera faringéana y la bóveda.....		0.093
Ancho del rostro en el punto de inserción de los primeros dientes.....	0.041	0.063
Mayor distancia vertical entre los pterigoides é intermaxilares.....	0.088	
Altura del agujero occipital.....	0.032	0.034
Ancho » » »	0.032	0.034
Mayor distancia entre los bordes exteriores de los cóndilos	0.073	0.073

Las diferencias de las medidas de los dos cráneos, dependen de que el número 1 pertenece á un individuo de mayor edad que el número 2.

El número 1 tiene 27 dientes de cada lado, pero este número ha sido mayor, probablemente pasaría de 30, estando este ejemplar mutilado en esa parte, pues el número 2 muestra que los dientes ocuparon mayor espacio hácia el apófisis anteorbital. El núm. 2 no conserva ningun diente.

William H. Flower, en su muy importante trabajo sobre los *Delphinidae* (1) dá los caracteres de los *Lagenorhynchus*, los que

(1) Proceedings of the Zoological Society of London 1883 p. 463.

concuerdan perfectamente con los restos del delfin que examinamos aquí tanto del cráneo como del esqueleto; además, las dos columnas dorsales que trajo Piedrabuena, presentan ambas gran número de vértebras, los apófisis espinosos y transversales de las vértebras muy largos y delgados y cuerpo de las vértebras cortas.

Hemos comparado estos dos cráneos con las láminas de la obra del Dr. Gray. «Synopsis of the species of Whales and Dolphins in the British Museum» (1868). que se refieren á las cuatro especies que admite Flower. *Lagenorhynchus albirostris* Gray. *L. acutus* Gray. *L. electra* Gray. *L. clanculus* Gray. No nos es posible decir nada sobre si *Delphinus cruciger* y *D. albigena* Quoy y Gaimard y *D. bivittatus* Lesson y Garnot, son iguales ó nó á *L. Floweri* porque estos animales no fueron nunca examinados desde cerca por quienes les dieron nombre, habiéndoles solo visto nadando en el mar á distancia. En cuanto á *Delphinus Fitzroyi* Waterh, si bien parece que se trata de un *Lagenorhynchus* está fuera de duda que no es el mismo que *L. Burmeisteri* Mor. El cráneo de este, en su forma general es mas largo, proporcionalmente, que cualquiera de los cuatro ya nombrados, descriptos por Gray; el rostro es mas angosto; la escotadura anteorbital apenas se nota, lo que no sucede con los otros, formando casi ángulo recto la rejion superior y esterna del maxilar y malar. El borde exterior del maxilar es casi recto en su mitad anterior y no mas ócnos encorvado como en los otros tipos, principalmente en *L. albirostris* y *L. electra*. Las cavidades nasales son mas alargadas que en cualquiera de las otras especies. La parte mas elevada del cráneo la forma el punto de union del occipital con el interparietal, estando los huesos nasales en un plan mas inferior, sobresaliendo muy poco de una línea tirada desde la punta del rostro hasta la cresta occipital.

En el cráneo número 1, hay asimetría notable en los maxilares ó intermaxilares; ambos huesos en el lado derecho son mas anchos y mas grandes. Esta asimetría apenas se nota en los maxilares del número 2, en el que la escotadura anteorbital izquierda es mas pronunciada, pero ha sido tambien sensible en los intermaxilares.

Para darse cuenta de la forma del paladar de *L. Burmeisteri*, hay que examinar los dos cráneos, que se completan uno al otro. En el número 1, si bien existen los pterigoideos, (algo destruido uno de ellos) la sutura que separa los palatinos de los maxilares ha desaparecido. En el número 2, mas jóven, faltan los pterigoideos, pero se ve perfectamente la sutura palato-maxilar.

Solo conocemos, por la figura que dá Flower, el paladar de *Lagenorhynchus acutus* Gray, y este es muy diferente del de *L. Burmeisteri*. En el ejemplar número 1, los pterigoideos se unen solo en el tercio mediano; la union de los palatinos con estos tiene la forma de cuña triangular; el tercio superior es divergente, dejando tambien entre ellos un espacio triangular entre los dos huesos. Solo se conserva completo el pterigoideo del lado izquierdo del cráneo, el que presenta un filo pronunciado que separa las dos láminas, mostrando la inferior una gran escotadura, mayor que en *L. acutus*.

El mayor largo del pterigoideo en el número 1 es de 0.046; su ancho no se puede fijar por haber desaparecido la sutura pterigo-palatina esterna. El largo de la sutura inter-palatina es de 0.020. Y este ancho puede considerarse como el mediano de estos huesos, pues si los maxilares penetran como cuña en el punto donde se unen los palatinos, estos hacen lo mismo con los pterigoideos. El ancho de la cara anterior de los dos palatinos juntos es de 0.038 en los dos cráneos.

La mandíbula inferior dibujada junto con el cráneo número 1, no pertenece á este, pero procede del mismo punto donde fué recogido. He notado esto, despues de terminado el dibujo que conservo porque creo que esta mandíbula pertenece á un *L. Burmeisteri*, pues en la bahía Santa Cruz no he observado otros delphinos de ese tamaño ni tengo noticia de que hayan sido vistos por otras personas. Ha pertenecido á un individuo mas adulto, de cráneo algo mas estrecho. Mide 0.220 de largo, su sinfisis es de 0.020, el ancho entre cóndilos es de 0.115 y medida entre el borde esterno del cóndilo su altura perpendicular en el coronoideo es de 0.053 Tiene 29 dientes en cada lado; estos son encorvados en su tercio superior hácia adentro é implantados algo oblicuamente en sus dos tercios anteriores hácia atrás, correspondiendo á la mandíbula superior, que los tiene de la misma forma y tamaño é implantados tambien oblicuamente en sus dos tercios anteriores, hácia adelante. El diámetro de uno de estos dientes del centro es de 0.0025, y su elevacion sobre el maxilar 0.0065.

L. burmeisteri = *L. loweni*?

EXPLICACION DE LAS LÁMINAS


LÁMINA VIII.

- Fig. 1. *Lagenorhynchus Floweri* Mor.—Cráneo n^o 1, visto de costado.
» 1^a — El mismo visto de arriba.
» 1^b — El mismo visto de abajo.
» 1^c — El mismo visto de atrás.
» 2 — Cráneo n^o 2 visto de arriba.
» 2^a — El mismo visto de abajo.

LÁMINA IX.

Las figuras núm. 1 a. b. c., representan, según dibujo de Francisco P. Moreno, el *Lagenorhynchus Floweri* Mor., hembra, cazado en la bahía del Río Santa-Cruz en Diciembre de 1876 por el capitán don Luis Piedrabuena.


La figura 2 representa el ejemplar joven adquirido del señor Tonini.



G. BAUER del

TALLERES DEL MUSEO

LAGENORHYNCHUS FLOWERI — MORENO



G. BAUER del

TALLERES DEL MUSEO.

LAGENORHYNCHUS FLOWERI — MORENO.