

SARNA DEMODÉCTICA: SU TRATAMIENTO CON NEGUOVON

Francisco O. Boccia

RESUMEN: Se describen los resultados obtenidos con la aplicación de Neguvón, en forma subcutánea, en la sarna demodéctica canina. De una solución al 10 % se administran 0,50 CC. por kg. de peso, Serie de 5 a 10 inyecciones, con un intervalo entre cada aplicación de 72 horas. Los resultados son francamente positivos en la forma escamosa y si bien en algunos animales que padecían la forma pustulosa las lesiones regresaban, en otros, en un porcentaje mayor, los resultados fueron negativos. **Analecta Veterinaria 1 (3); 105-109, 1969**

TREATMENT OF DEMODECTIC MANGE WITH NEGUOVON

SUMMARY: The use of "Neguvon" (0,0 dimethyl - 1 hydroxiethyl -2,2,2, thricitloroethyl phosphonate -Bayer) subcutaneously for the treatment of demodectic mange is described. The drug was administered in a 10 % solution, at the rate of 0,5 mil/kg. body weight, for a total of 5 - 10 treatments at intervals of 72 hours. Positive results were obtained in dogs with squamous demodectic mange. The drug produce only a regression in cases of pustular mange. **Analecta Veterinaria 1 (3); 105-109, 1969**