

PLUSIEURS NOUVEAUX COLÉOPTÈRES

DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE

PAR MAURICE PIC

Dromanthus inlateralis n. sp.

Subparallelus, nitidus, griseo-pubescens, nigro-metallicus, capite antice, thorace (in medio disco nigro notato), antennis ad basin et abdomine lateraliter testaceis; epipleuris elytrorum antice testaceis.

Subparallèle, peu large, brillant, médiocrement pubescent de gris avec quelques poils redressés clairs, imperceptiblement ponctué sur l'avant-corps qui est en partie noir, en partie testacé, irrégulièrement et subruguleusement ponctués sur les élytres qui sont entièrement foncés avec seulement les épipleures légèrement testacés antérieurement. Tête noire en arrière, testacée en avant à partir du milieu des yeux; antennes courtes, dentées sur leur milieu, noires avec les premiers articles testacés en dessous; prothorax court et large, testacé avec une macule médiane discalé foncée qui n'atteint pas les bords; élytres d'un noir métallique, un peu plus larges que le prothorax, presque parallèles, pas très longs, obliquement terminés au sommet; pygidium dépassant un peu les élytres; pattes foncées.

Long. 4 mm.

San Luis. Communiqué par M. C. Bruch.

Je sépare provisoirement de cette espèce à titre de variété, et sous le nom de *var. discoidalis*, un exemplaire dont le disque des élytres est en partie testacé, le rebord élytral nettement testacé antérieurement, et qui diffère, en outre, de *inlateralis* par la tête entièrement foncée sauf les parties buccales.

Long. 4,5 mm.

Province de Córdoba. Communiqué par M. C. Bruch.

Voisin de *lateralis* Pic, en diffère, en outre de la coloration, par la forme plus robuste et le pygidium saillant.

Silis Bruchi n. sp.

♂ *Satis latus, postice subdilatatus, nitidus, griseo pubescens, pro parte testaceus (thorace, scutello pedibusque; tarsi obscuris) pro parte niger, aliquot rufescens (capite, elytris antennisque); thorace brevis, in disco impresso, lateraliter antice tuberculato, postice appendiculato spinoso.*

Assez large, un peu élargi en arrière, brillant, pubescent de gris, noir, cette coloration devenant en partie roussâtre chez les exemplaires un peu immatures avec le prothorax, l'écusson et les pattes testacés, tarsi obscurs. Tête foncée courte, impressionnée entre les yeux; antennes assez grêles, plus ou moins foncées; prothorax testacé, court, impressionné sur le disque, muni sur les côtés antérieurement d'un tubercule dentiforme large et postérieurement d'un appendice long, sinué, spiniforme à l'extrémité; écusson testacé; élytres foncés, distinctement plus larges que le prothorax, pas très longs, un peu élargis en arrière, expliqués latéralement, assez fortement ponctués sur leur milieu et en arrière, presque lisses antérieurement; dessous du corps plus ou moins foncé; pattes testacées avec les tarsi obscurs.

Long. 6 mm.

Gob.-Misiones (C. Bruch). Aussi in collection Pic.

Voisin de *inaequalis* Pic, mais, en outre de la structure différente du prothorax, en diffère par la forme moins robuste, les élytres non marqués de clair sur les côtés, etc.

Anthicus parvus n. sp.

Minutus, satis elongatus, nitidus, griseo pubescens et pilis pallidis hirsutus, rufo-testaceus, capite plus minusve brunnescente, elytris obscuris; capite postice subtruncato; thorace satis elongato, antice dilatato; elytris satis angustatis.

Petit, assez allongé, brillant, médiocrement pubescent de gris et hérissé de quelques poils clairs, roux testacé, la tête étant plus ou moins brunâtre, avec les élytres obscurs. Tête grosse, subtronquée postérieu-

rement, assez fortement et éparsément ponctuée; antennes assez courtes, épaissies à l'extrémité avec le dernier article plus long que le précédent; prothorax ponctué comme la tête, un peu plus long que large, élargi en avant et subarrondi sur cette partie; élytres un peu plus larges que le prothorax, à épaules marquées, courtement rétrécis postérieurement, à ponctuation espacée, bien plus forte antérieurement; pattes assez robustes.

Long. près de 2 mm.

Province de Buenos Aires (C. Bruch.) Aussi in collection Pic.

Ressemble beaucoup à notre espèce paléarctique *Stenidius femoralis* Desbr., mais s'en distingue à première vue par les épaules marquées. Peut se placer près de *holoxanthus* Frm. qui a une coloration générale testacée pâle.

Spermophagus caryoboriformis n. sp.

Satis, angustatus et elongatus, subnitidus, sat dense griseo pubescens, nigro-piceus aut rufescens, antennis pedibusque pro parte rufescentibus; elytris distincte striatis; thorace satis angustato.

Assez étroit et allongé, un peu brillant, assez densément pubescent de gris, noir de poix, parfois roussâtre (ex. immatures), antennes et pattes en partie roussâtres. Tête assez longue, carénée entre les yeux, ceux-ci grands; antennes plus ou moins roussâtres longues, dentées à partir du 4° article; prothorax transversal, plus étroit que les élytres, presque droit sur les côtés, irrégulièrement et assez fortement ponctué, orné antérieurement à l'état frais de petites macules discales pubescentes jaunâtres; écusson long et étroit; élytres plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, courtement rétrécis à l'extrémité, fortement striés; pygidium entièrement roux ou obscurci et plus clair sur son pourtour, sans macule foncée ni macules pubescentes distinctes.

Long. 7,9 mm.

Province Córdoba, San Luis (C. Bruch): Chaco de Santiago (coll. Pic).

Par sa forme cette espèce ressemble à certains *Caryoborus* d'où son nom; par sa forme allongée elle rappelle *longissimus* Pic, mais s'en distingue, à première vue, par le prothorax distinctement plus étroit que les élytres, les stries élytrales plus profondes, etc.