


**Lista de los peces de la provincia de Corrientes**



**Diego O. Nadalin, Lucila C. Protopino y Hugo L. López**

**Indizada en la base de datos ASFA C.S.A.**  
**2017**

**LISTA DE LOS PECES  
DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES**

**Diego O. Nadalin, Lucila C. Protogino y Hugo L. López**

División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, FCNyM, UNLP  
Paseo del Bosque s/n, 1900-La Plata, Buenos Aires, Argentina

*...los censos de la fauna de un país o región cualquiera, constituyen una suerte de codificación de la Naturaleza, como paso previo e indispensable para un ensayo racional de aprovechamiento de las riquezas naturales y de su adecuada conservación. Desde fines del siglo XVIII se ha dicho, y lo han repetido en nuestro medio, Cosme Argerich, Alberto Palcos y otros estudiosos y científicos, que un Código de la Naturaleza es indispensable para la libertad de una nación. [R. A. Ringuelet & R. H. Arámburu. Enumeración sistemática de los vertebrados de la Provincia de Buenos Aires. La Plata, MAA, Publ. 119, 1957].*

**Julio 2017**

## Introducción

Esta serie tiene como finalidad dar a conocer las especies presentes en los diferentes estados provinciales de la Argentina, con el objetivo de contribuir a precisar el conocimiento ictiofaunístico regional dentro de los marcos biogeográficos e hídricos correspondientes. Por otra parte, estas listas son pertinentes, a la hora de intentar dar dimensión a la riqueza de cada territorio provincial tratado.

Tomando como base los trabajos de López *et al.*, (2003); Reis *et al.*, (2003); Liotta (2006) y Ferraris (2007) hemos actualizado el elenco ictiofaunístico en cada territorio provincial, siguiendo en parte la macrosistemática de Mirande & Koerber (2015).

En este nuevo número, tratamos la provincia de Corrientes la que se encuentra situada al noreste de nuestro territorio, limitada por las provincias de Entre Ríos, Misiones, Chaco y Santa Fe.

Entre los antecedentes que se ocuparon de la ictiofauna de esta provincia encontramos aquellos trabajos cuyo tratamiento fue considerado dentro de la ictiofauna de la Mesopotamia, tal como el de López *et al.*, 2005. En otro orden, las contribuciones de Casciotta *et al.*, en los años 2003 y 2005 y de Iwaszkiw *et al.*, 2010 han sido enfocados en determinados ambientes de su territorio.

En nuestra metodología no se realizan, con excepción de la localidad tipo y del nombre vulgar, comentarios ni observaciones sobre las especies señaladas ya que estos se encuentran en la bibliografía adjunta. En el caso de los nombres vulgares la abreviatura (G) corresponde a la lengua Guaraní y (P) al Portugués. Se incluyen dos tablas que contienen información sobre especies introducidas (Tabla I) y de aquellas de presencia dudosa o que requieren confirmación en el territorio provincial (Tabla II). En este último caso se cita el trabajo que las menciona por primera vez.

### Biogeografía Continental

Región Neotropical: Subregiones Guayano-brasileña, Dominio Subtropical, Distrito Mesopotámico (Ringuelet, 1961);  
Región Neotropical: Subregión Brasileña, Dominio Paranense, Provincia Parano-Platense (Ringuelet, 1975);  
Región Neotropical: Subregión Brasileña, Provincia Parano-Platense (Arratia *et al.*, 1983);  
Región Neotropical: Subregión Chaqueña (Morrone, 2001);  
Región Neotropical: Provincia de los Grandes Ríos (López *et al.*, 2008).

### Cuencas Hídricas

Del Río de la Plata (Mazza, 1961);  
Cuenca propia del río Paraná hasta Confluencia, cuenca del río Santa Lucía, cuenca del río Corrientes, cuenca del río Aguapey, cuenca de arroyos menores de Corrientes afluentes del río Uruguay, cuenca del río Miriñay, cuenca del río Guayquiraró, cuenca propia del río Uruguay en Argentina, cuenca del río Mocoretá, cuenca propia del río Paraná medio (Liotta, 2006).

Clase           **ELASMOBRANCHII**  
Orden           **MYLIOBATIFORMES**  
Familia         **POTAMOTRYGONIDAE**

*Potamotrygon* Garman, 1877

***P. brachyura*** (Günther, 1880)

Loc. Tipo: Buenos Aires.

N. v.: raja; yabebí, yavevih (G).

***P. falkneri*** Castex y Maciel, 1963

Loc. Tipo: Puerto de la ciudad de Santa Fe, río Paraná, Argentina.

N. v.: raya, raya de río; yavevih (G).

***P. hystrix*** (Müller & Henle, 1841)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: chucho pintado, raya, raya brava, raya negra; yabebí, yavebuí, yavevih (G).

***P. motoro*** (Müller & Henle, 1841)

Loc. Tipo: Río Guaporé, Estado de Mato Grosso, Brasil.

N. v.: boró, chucho de río, raya fina, raya grande, raya, raya común, raya pintada de las piedras; vivevih, rala-maca, yabebí, yavebuí, yavevih-guazú (G); arraia, raia (P).

Clase           **ACTINOPTERYGII**  
Orden           **CLUPEIFORMES**  
Familia         **CLUPEIDAE**

*Platanichthys* Whitehead, 1968

***P. platana*** (Regan, 1917)

Loc. Tipo: Río de la Plata.

N. v.: mandufia.

Familia           **ENGRAULIDAE**

*Lycengraulis* Günther, 1868

*L. grossidens* (Agassiz, 1829)

Loc. Tipo: Río de Janeiro, Brasil.

N. v.: anchoa de río, sardina.

Familia           **PRISTIGASTERIDAE**

*Pellona* Valenciennes, 1847

*P. flavipinnis* (Valenciennes, 1837)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: anchoa de río, lacha, lacha pelada, mandufia de río, saraca, sardina de río; sardinhão (P).

Orden            **CHARACIFORMES**

Familia          **HEMIODONTIDAE**

*Hemiodus* Müller, 1813

*H. orthonops* Eigenmann & Kennedy, 1903

Loc. Tipo: Arroyo Trementina, Paraguay.

N. v.: sardina de río.

Familia          **PARODONTIDAE**

*Apareiodon* Eigenmann, 1916

*A. affinis* (Steindachner, 1879)

Loc. Tipo: La Plata (probablemente por región del Plata), Buenos Aires.

N. v.: virolito; pirá palito (G); canivete, duro-duro (P).

*Parodon* Valenciennes, 1849

*P. carrikeri* Fowler, 1940

Loc. Tipo: Río Lipeo, Salta, Argentina.

Familia          **CURIMATIDAE**

*Curimatella* Eigenmann & Eigenmann, 1889

*C. dorsalis* (Eigenmann & Eigenmann, 1889)

Loc. Tipo: Río Solimbes en Coari, Amazonas, Brasil.

N. v.: blanquillo, boguita, sabalito.

*Cyphocharax* Fowler, 1906

*C. platanus* (Günther, 1880)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina.

N. v.: huevada, sabalito plateado; curimbatasinho (P).

*C. saladensis* (Meinken, 1933)

Loc. Tipo: Tributario del río Salado en Santa Fe, Argentina.

N. v.: sabalito.

*C. spilotus* (Vari, 1987)

Loc. Tipo: Río Santa María en puente sobre la ruta BR 293 entre Don Pedrito y Livramento, Río Grande do Sul, Brasil.

N. v.: sabalito.

**C. voga** (Hensel, 1870)

Loc. Tipo: Río dos Sinos, en São Leopoldo, Brasil.

N. v.: huevada, sabalito, sábalo roñoso; curimbatasinho, papa-terra (P).

***Potamorhina*** Cope, 1878

**P. squamoralevis** (Braga y Azpelicueta, 1983)

Loc. Tipo: Río Paraná en Rosario, Santa Fe, Argentina.

N. v.: blanquillo, yulilla; branquingha, branquiña (P).

***Psectrogaster*** Eigenmann & Eigenmann, 1889

**P. curviventris** Eigenmann & Kennedy, 1903

Loc. Tipo: Asunción, río Paraguay, Paraguay.

N. v.: llorona; blanquillo (P).

***Steindachnerina*** Fowler, 1906

**S. brevipinna** (Eigenmann & Eigenmann, 1889)

Loc. Tipo: Rosario, sistema del Río de la Plata, Santa Fe, Argentina.

N. v.: blanquillo, huevada, sabalito; carimbatá (G.); curimbatasinho, saguirú (P).

**S. conspersa** (Holmberg, 1891)

Loc. Tipo: Río Paraguay, Formosa, Argentina.

Familia **PROCHILODONTIDAE**

***Prochilodus*** Agassiz, 1829

**P. lineatus** (Valenciennes, 1837)

Loc. Tipo: Río de la Plata, en Buenos Aires, Brasil.

N. v.: sábalo.

Familia **ANOSTOMIDAE**

***Abramites*** Fowler, 1906

**A. hypselonotus** (Günther, 1868)

Loc. Tipo: Xeberos, Amazonas Superior, Perú.

N. v.: jikii.

***Leporellus*** Lütken, 1874

**L. pictus** (Kner, 1859)

Loc. Tipo: Irisanga (Orissanga), Estado de San Pablo, Brasil.

N. v.: boga, boguita rayada.

***Leporinus*** Agassiz, 1829

**L. acutidens** (Valenciennes, 1837)

Loc. Tipo: Sudamérica.

N. v.: boga; pirá-pihtá (G); araçau, aracau branco, piava (P).

**L. lacustris** Amaral Campos, 1945

Loc. Tipo: Pirassununga, Estado de San Pablo, Brasil.

N. v.: boga.

**L. striatus** Kner, 1858

Loc. Tipo: Irisanga y Caiçara, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: boga estriada, boga pintada, boga rayada, trompa roja; canivete, piava, riscadinho (P).

*Megaleporinus* Ramirez, Birindelli & Galetti, 2017

*M. obtusidens* (Valenciennes, 1837)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: boga, bogón; piava, piaba, piapara, piará-uçu, piau (P).

*Pseudanos* Winterbottom, 1980

*P. trimaculatus* (Kner, 1858)

Loc. Tipo: Brasil.

*Schizodon* Agassiz, 1829

*S. borellii* (Boulenger, 1900)

Loc. Tipo: Carandazinho, cercano a Corumbá, río Paraguay, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: boga, boga lisa, boga fina, lisa de agua dulce, voga; aracú pintado, aracú pintado piau, chimburé, piaba, taguará (P).

*S. nasutus* Kner, 1858

Loc. Tipo: Irisanga, San Pablo, Brasil.

N. v.: boga.

*S. platae* (Garman, 1890)

Loc. Tipo: Rosario, sistema del Plata, Argentina.

N. v.: boga.

Familia **ERYTHRINIDAE**

*Hoplerythrinus* Gill, 1895

*H. unitaeniatus* (Spix & Agassiz, 1829)

Loc. Tipo: Río San Francisco, Brasil.

N. v.: jejú; jerú (P).

*Hoplias* Gill, 1903

*H. malabaricus* (Bloch, 1794)

Loc. Tipo: Sudamérica, probablemente Surinam.

N. v.: dientudo, perra loca, perro mocho, pescado negro, tararira, tarucha; pirá-ñaró, taré hui (G); jerú-perro, lobó, rubafo, sovela, tarango, traira (P).

*H. mbigua* Azpelicueta, Benítez, Aichino & Mendez, 2015

Loc. Tipo: río Paraná en Nemesio Parma, provincia de Misiones, Argentina, 27°21'23.04"S, 56°01'1.92"W.

N. v.: tararira.

Familia **LEBIASINIDAE**

*Pyrrhulina* Cuvier & Valenciennes, 1846

*P. australis* Eigenmann & Kennedy, 1903

Loc. Tipo: Arroyo Trementina, Paraguay.

N. v.: pirrulina.

Familia **GASTEROPELECIDAE**

*Engraulisoma* Castro, 1981

*E. taeniatum* Castro, 1981

Loc. Tipo: Río Cuiabá, Municipio de Poconé, Mato Grosso, Brasil.

***Thoracocharax*** Fowler, 1906

***T. stellatus*** (Kner, 1858)

Loc. Tipo: Río Cuiabá, Brasil.

N. v.: chirola, pechito, pechudito, pesetita; papudinho (P).

Familia **SERRASALMIDAE**

***Metynnis*** Cope, 1878

***M. mola*** Eigenmann & Kennedy, 1903

Loc. Tipo: Arroyo Trementina, Paraguay.

N. v.: pacú; pacu-peva (P).

***M. otuquensis*** Ahl, 1923

Loc. Tipo: Bahía Negra, río Otuquis, Bolivia o Paraguay.

N. v.: pacú; pacu-peva (P).

***Myleus*** Müller & Troschel, 1844

***M. tiete*** (Eigenmann & Norris, 1900)

Loc. Tipo: Piracicaba, São Paulo, Brasil.

N. v.: pacucito.

***Mylossoma*** Eigenmann & Kennedy, 1903

***M. duriventre*** (Cuvier, 1818)

Loc. Tipo: Brasil.

N. v.: brillantina, medallón, pacú reloj, pacucito, piraña pacusa; pacuí, piráí, mbiráí (G); tambaqui (P).

***Piaractus*** Eigenmann, 1903

***P. mesopotamicus*** (Holmberg, 1887)

Loc. Tipo: Río Paraná, Uruguay.

N. v.: pacu; pakú (G); baya, caranha, pez chato, mandua, pacu-caranha (P).

***Pygocentrus*** Müller & Troschel, 1844

***P. nattereri*** Kner, 1858

Loc. Tipo: Cuiabá y Mato Grosso, Brasil.

N. v.: palometa, palometa mora, palometa pacusa, palometa de río, piraña; pirá-añá (G); coicoa, piranha, piranha vermelha, piraya (P).

***Serrasalmus*** Lacépède, 1803

***S. maculatus*** Kner, 1858

Loc. tipo: Rio Guaporé, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: palometa, palometa amarilla, palometa brava, palometa brillante, palometa mora, palometa negra, palomita, piraña; pirá-í (G); catirina, peixe-prato, peixe relógio, pirambé, pirambeba, piranha doce, piranha mathada, piranha peque, piranga (P).

***S. marginatus*** Valenciennes, 1837

Loc. Tipo: Río Paraná, Brasil.

N. v.: palometa, palometa amarilla, piraña; catirina, pirambeba, piranha prateada, sachicanga (P).



Familia **CHARACIDAE**

***Acestrorhynchus*** Eigenmann, 1903

***A. pantaneiro*** Menezes, 1992

Loc. Tipo: Rio Cuiabá, Volta Grande, Município de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso, Brasil.

N. v.: dientudo, dientudo dorado, dientudo paraguayo; pirá yobua (G); dientudo dourado, peixe-cachorro (P).

***Aphyocharax*** (Günther, 1868)

***A. anisitsi*** Eigenmann & Kennedy, 1903

Loc. Tipo: Asunción, Paraguay.

N. v.: mojarrita; pykú (G); pequirá (P).

***A. dentatus*** Eigenmann & Kennedy, 1903

Loc. Tipo: Laguna del río Paraguay, Asunción, Paraguay.

N. v.: mojarrita; pykú (G); pequirá (P).

***A. nattereri*** (Steindachner, 1882)

Loc. Tipo: Villa Bella, Río Amazonas, Brasil.

***A. rathbuni*** Eigenmann, 1907

Loc. Tipo: Arroyo Chagalalina, cuenca del Paraguay.

***Prionobrama*** Fowler, 1913

***P. paraguayensis*** (Eigenmann, 1914)

Loc. Tipo: Corumbá, Río Paraguay, Brasil.

***Brycon*** Müller & Troschel, 1845

***B. hilarii*** (Valenciennes 1850)

Loc. Tipo: Rio São Francisco, Brasil (probablemente sea un error, seguramente sea de la cuenca del río Paraguay).

***B. orbignyanus*** (Valenciennes, 1850)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: salmón, salmón de río, salmón criollo, salmonete, salmón del Paraná; pirá-pitá (G); pirápitanga, pirácanjuba (P).

***Triportheus*** Cope, 1871

***T. nematurus*** (Kner, 1858)

Loc. Tipo: Cuaibá, Estado de Mato Grosso, Brasil.

N. v.: dientudo, golondrina; chapé; machete; pirá-güirá (G).

***Charax*** Scopoli, 1777

***C. leticiae*** Lucena, 1987

Loc. Tipo: Posto de Trocará, Igarapé Urubu, Río Tocantins, Pará, Brasil.

N. v.: dientudo.

***C. stenopterus*** (Cope, 1894)

Loc. Tipo: Río Jacuhy superior, Estado de Río Grande do Sul, Brasil.

N. v.: dientudo transparente.

***Cynopotamus*** Valenciennes, 1849

***C. argenteus*** (Valenciennes, 1836)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: dientudo jorobado, dientudo, gata, mojarra perro, perro blanco; pirá-yaguá (G); saicanga (P).

**C. kincaidi** (Schultz, 1950)

Loc. Tipo: Paraguay.

N. v.: dentado; dientado.

**Galeocharax** Fowler, 1910

**G. humeralis** (Valenciennes, 1834)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: dentado, dientado, mojarra perro; peixe-cadela, saicanga (P).

**Phenacogaster** Eigenmann, 1907

**P. tegatus** (Eigenmann, 1911)

Loc. Tipo: Río Jauru, cuenca del Río Paraguay superior, Brasil.

**Roeboides** Günther, 1864

**R. affinis** (Günther, 1868)

Loc. Tipo: Río Huallaga, sistema del Amazonas, Perú.

N. v.: dentado, dientado.

**R. descavadensis** Fowler, 1932

Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: dentado, dientado.

**R. microlepis** (Reinhardt, 1851)

Loc. Tipo: Río Paraguay, Brasil.

N. v.: dentado, dientado.

**Cheirodon** Girard, 1854

**C. ibicuiensis** Eigenmann, 1915

Loc. Tipo: Cacequí, Río Ibicuí, Rio Grande do Sul, Brasil.

**C. interruptus** (Jenyns, 1842)

Loc. Tipo: Laguna del Diario, 34°54'S, 55°00'W, en Maldonado, Uruguay.

**Heterocheirodon** Malabarba, 1998

**H. yatai** (Casciotta, Miquelarena & Protogino, 1992)

Loc. Tipo: Arroyo El Palmar, Paraje La Glorieta, Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos, Argentina.

**Macropsobrycon** Eigenmann, 1915

**M. uruguayanae** Eigenmann, 1915

Loc. Tipo: Cacequí, Brasil.

**Odontostilbe** Cope, 1870

**O. microcephala** Eigenmann, 1907

Loc. Tipo: Río Pilcomayo, sistema del Plata, Bolivia.

N. v.: mojarra, mojarrin, mojarrita; pikú (G); pequirá (P).

**O. paraguayensis** Eigenmann & Kennedy, 1903

Loc. Tipo: Asunción, Paraguay.

**O. pequirá** (Steindachner, 1882)

Loc. Tipo: Villa Bella y Obidos, Río Amazonas, Brasil.

N. v.: mojarra, mojarrita; pequirá (P).

***Serrapinnus*** Malabarba, 1998

***S. calliurus*** (Boulenger, 1900)

Loc. Tipo: Corandasiño, Brasil; San Lorenzo, provincia de Jujuy, Argentina.

N. v.: mojarra curvada.

***S. kriegi*** (Schindler, 1937)

Loc. Tipo: Centurión, noreste de Paraguay, Paraguay.

***Clupeacharax*** Pearson, 1924

***C. anchoveoides*** Pearson, 1924

Loc. Tipo: Cachuela Esperanza, sistema del Río Amazonas, Bolivia.

***Rhaphiodon*** Agassiz, 1829

***R. vulpinus*** Spix & Agassiz, 1829

Loc. Tipo: Ríos de Brasil.

N. v.: chafalote, dentado, machete, pez espada, pez machete; pirá-yaguá (G); chambira-challua, dourado-cachorro, sardinão, soirú-pintada (P).

***Piabucus*** Oken, 1817

***P. melanostoma*** Holmberg, 1891

Loc. Tipo: Formosa (Chaco), Argentina; Asunción, Paraguay.

***Salminus*** Agassiz, 1829

***S. brasiliensis*** (Cuvier, 1816)

Loc. Tipo: Brasil.

N. v.: dorado, tigre de río; pirayú (G); dourado, saipé (P).

***Gymnocorymbus*** Eigenmann, 1908

***G. ternetzi*** (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Rio Paraguay, 16°46'S, 57°44'W, Brasil.

N. v.: monjita.

***Poptella*** Eigenmann, 1908

***P. paraguayensis*** (Eigenmann, 1907)

Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: mojarra; saia branca (P).

***Bryconamericus*** Eigenmann, 1907

***B. exodon*** Eigenmann, 1907

Loc. Tipo: Puerto Max, Paraguay.

N. v.: mojarra, mojarrita.

***B. iheringii*** (Boulenger, 1887)

Loc. Tipo: São Lorenzo, Río Grande do Sul, Brasil.

N. v.: mojarra, mojarrita; lambarí (P).

***Ctenobrycon*** Eigenmann, 1908

***C. alleni*** (Eigenmann & McAtee, 1907)

Loc. Tipo: Corumbá, río Otuquis, Asunción, Paraguay.

***Piabarchus*** Myers, 1928

***P. stramineus*** (Eigenmann, 1908)

Loc. Tipo: Piracicaba; Río Uruguay; Brasil.

N. v.: mojarra; mojarrita; lambarí, piquira (P).

***Diapoma*** Cope, 1894

***D. terofali*** (Géry, 1964)

Loc. Tipo: Canal El Cazador, Río Luján, tributario del Río de la Plata, 34°18'00"S, 58°46'00"W, Buenos Aires, Argentina.

***Pseudocorynopoma*** Perugia, 1891

***P. doriae*** Perugia, 1891

Loc. Tipo: Río de la Plata.  
N. v.: mojarra de velo.

***Tetragonopterus*** Cuvier, 1817

***T. argenteus*** Cuvier, 1816

Loc. Tipo: Tipos desconocidos.  
N. v.: chanquete, mojarrita, palometa, relojito; patacas (P).

***Astyanax*** Baird & Girard, 1854

***A. abramis*** (Jenyns, 1842)

Loc. Tipo: Río Paraná, hasta Rosario, Argentina.  
N. v.: mojarra, mojarra pacusa, mojarra matrera, mojarrita; acará-pixuma, lambarí (P).

***A. correntinus*** (Holmberg, 1891)

Loc. Tipo: Río Paraná en Corrientes, Argentina.  
N. v.: mojarra.

***A. dissensus*** Lucena & Thofehrn, 2013

Loc. Tipo: Arroyo Candiota, Candiota, aguas abajo de la central termoeléctrica, drenaje del río Jaguarão, 31°34'36"S, 53°40'22"W, Rio Grande do Sul, Brasil.  
N. v.: mojarra.

***A. eigenmanniorum*** (Cope, 1894)

Loc. Tipo: Río Grande do Sul, Brasil.  
N. v.: chato, mojarra.

***A. erythropterus*** (Holmberg, 1891)

Loc. Tipo: Río de la Plata en Buenos Aires, Río Paraná en Paraná, Argentina.  
N. v.: mojarra.

***A. lacustris*** (Lütken, 1875)

Loc. Lagoa Santa, 19°38'S, 43°53'W, Brasil.

***A. lineatus*** (Perugia, 1891)

Loc. Tipo: Río Paraguay, Villa María, Mato Grosso, Brasil.  
N. v.: mojarra; piki, piky (G); lambarí (P).

***A. pynandi*** Casciotta, Almirón, Bechara, Roux & Ruiz Diaz, 2003

Loc. Tipo: Lobo-Cuá, 28°32' S, 57°12' W, Laguna Iberá, Esteros del Iberá, provincia de Corrientes, Argentina.

***A. rutilus*** (Jenyns, 1842)

Loc. Tipo: Río Paraná, Sudamérica.  
N. v.: mojarra.

***Markiana*** Eigenmann, 1903

***M. nigripinnis*** (Perugia, 1891)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Sudamérica.  
N. v.: ipau.

***Psellogrammus* Eigenmann, 1908**

***P. kennedyi*** (Eigenmann, 1903)

Loc. Tipo: Campo Grande, Paraguay.

N. v.: mojarrita.

***Oligosarcus* Günther, 1864**

***O. jenynsii*** (Günther, 1864)

Loc. Tipo: Laguna de Maldonado, Uruguay.

N. v.: dentado, dientado.

***O. longirostris*** Menezes & Géry, 1983

Loc. Tipo: Río Iguazú, cuenca del Paraná en Porto Lupion, Estado de Paraná, Brasil.

N. v.: dientado.

***O. oligolepis*** (Steindachner, 1867)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina.

N. v.: blanquillo, dentado, dentado pintado, dientado, dientado común; bocudo, saicanga, sardela, tambicú (P).

***Hemigrammus* Gill, 1858**

***H. manherti*** Uj & Géry, 1989

Loc. Tipo: Bañado cercano a Panchito López, 4 Km de Yabebyry, Departamento Misiones, Paraguay.

***H. mattei*** Eigenmann, 1918

Loc. Tipo: Argentina.

***H. tridens*** Eigenmann, 1907

Loc. Tipo: Arroyo Pypucu, cuenca del Río Paraguay, Paraguay.

***H. ulreyi*** (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Brasil.

***Hyphessobrycon* Durbin, 1908**

***H. anisitsi*** (Eigenmann, 1907)

Loc. Tipo: Villa Rica, Paraguay.

N. v.: mojarra

***H. auca*** Almirón, Casciotta, Bechara & Ruiz Diaz, 2004

Loc. Tipo: Estanque en San Juan Poriahú, Esteros de Iberá, provincia de Corrientes, Argentina, 27°41'53"S, 57°12'17"W.

***H. bifasciatus*** Ellis, 1911

Loc. Tipo: Rio Parahyba en Campos, Brazil

***H. elachys*** Weitzman, 1985

Loc. Tipo: Sistema del río Aguaray-guazú, 3 km al nordeste de Lima, Departamento San Pedro, Paraguay, 23°55'S, 56°29'W.

N. v.: mojarra

***H. eques*** (Steindachner, 1882)

Loc. Tipo: Villa Bella y Obidos, Río Amazonas, Brasil.

***H. igneus*** Miquelarena, Menni, López y Casciotta, 1981

Loc. Tipo: Laguna frente a la Escuela N° 12, camino Bella Vista-San Roque, provincia de Corrientes, Argentina.

***H. isiri*** Almirón, Casciotta & Körber, 2006

Loc. Tipo: Arroyo Ubajay, 31°48.94'S, 58°12.41'W, cuenca del río Uruguay, provincia de Entre Ríos, Argentina.

***H. luetkenii*** (Boulenger, 1887)

Loc. Tipo: San Lorenzo, Río Grande do Sul, Brasil.

***H. meridionalis*** Ringuelet, Miquelarena y Menni, 1978

Loc. Tipo: cantera sobre ruta provincial N°15, 70 m al sur del canal Delgado, a 30 m del camino en dirección al Río de la Plata, Los Talas, provincia de Buenos Aires, Argentina.

***H. reticulatus*** Ellis, 1911

Loc. Tipo: Río Parahyba, en Campos, Brasil.

***H. wajat*** Almirón & Casciotta, 1999

Loc. Tipo: Laguna Brava, 27°33'S, 58°44'W, provincia de Corrientes, Argentina.

#### ***Moenkhausia*** Eigenmann, 1903

***M. dichroua*** (Kner, 1858)

Loc. Tipo: Brasil.

N. v.: mojarra, mojarrita; pikí, pikíh (G).

***M. intermedia*** Eigenmann, 1908

Loc. Tipo: Tabatinga, Amazonas, Brasil.

N. v.: mojarra, mojarrita; pikí, pikíh (G).

***M. sanctaefilomenae*** (Steindachner, 1907)

Loc. Tipo: Laguna en Santa Filomena, en Río Parnahyba, Brasil.

N. v.: mojarra; pikí, pikíh (G).

Familia **CRENUCHIDAE**

#### ***Characidium*** Reinhardt, 1866

***C. rachovii*** Regan, 1913

Loc. Tipo: Probablemente Vila da Quinta, Municipio de Rio Grande, Brasil, 32°05'S, 52°17'W.

N. v.: mojarrita, tritolo.

Orden **SILURIFORMES**

Familia **DORADIDAE**

#### ***Anadoras*** Eigenmann, 1925

***A. insculptus*** (Miranda Ribeiro, 1912)

Loc. Tipo: Manaus, Brasil.

N. v.: armado.

***A. weddellii*** (Castelnau, 1855)

Loc. Tipo: Chiquitos, Bolivia.

N. v.: armado, carataí, yagivá.

#### ***Ossancora*** Sabaj Pérez & Birindelli, 2011

***O. eigenmanni*** (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: armado.

#### ***Oxydoras*** Kner, 1855

***O. kneri*** Bleeker, 1862

Loc. Tipo: Cuiabá, Brasil.

N. v.: armado, armado blanco, armado chanco; itawá-pochíh, ytaguá-pochic (G); abotoado, armão, botoado, focinho-de-porco (P).

***Platydoras*** Bleeker, 1863

***P. armatulus*** (Valenciennes, 1840)

Loc. Tipo: río Paraná, Sudamérica.

N. v.: armado.

***Pterodoras*** Bleeker, 1863

***P. granulatus*** (Valenciennes, 1821)

Loc. Tipo: América del Sur.

N. v.: armado, armado amarillo, armado común; abotoado, armão, mandi-capeta, botoao-barriga-de-folha (P).

***Rhinodoras*** Bleeker, 1862

***R. dorbignyi*** (Kner, 1855)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Sudamérica.

N. v.: armadito, armado, armado amarillo, armado blanco, marieta; abotoado, armão, mandi-capeta (P).

***Trachydoras*** Eigenmann, 1925

***T. paraguayensis*** (Eigenmann & Ward, 1907)

Loc. Tipo: Corumbá, Paraguay.

N. v.: armadito, armado; armadinho (P).

Familia **AUCHENIPTERIDAE**

***Ageneiosus*** Lacépède, 1803

***A. inermis*** (Linnaeus, 1766)

Loc. Tipo: Surinam.

N. v.: mandube cabezón; mandubá, manduvé-í, mandubí, mandové, solalinde (G); mandí-leitero, palmito (P).

***A. militaris*** Valenciennes, 1835

Loc. Tipo: Río de la Plata, Sudamérica.

N. v.: mandové rosado, mandovéi, manduvé, manduvei, manduví (G); mandí-leitero, mandubí fino, palmito (P).

***Auchenipterus*** Valenciennes, 1840

***A. nigripinnis*** (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Paraguay.

N. v.: bagre, hocicón; buzo, palmito, surumanha (P).

***A. osteomystax*** (Miranda Ribeiro, 1918)

Loc. Tipo: Rio Vermelo, Santa Rita das Anitas, Estado de Goiás, Brasil.

N. v.: buzo, hocicón; pirá bicicleta (G); jorumanha (P).

***Trachelyopterus*** Valenciennes, 1840

***T. galeatus*** (Linnaeus, 1766)

Loc. Tipo: Sudamérica.

N. v.: anujá, bagre apretador, bagre rojizo, torito; mbihyá (G); Maria preta, cangatí, jduzinho (P).

***T. lucenai*** Bertoletti, Pezzi da Silva & Pereira, 1995

Loc. Tipo: Rio Jacuí en saco do Quilombo, unos 29°58'S, 51°15'W, ilha das Flores, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

***Tatia*** Miranda Ribeiro, 1911

***T. neivai*** (Ihering, 1930)

Loc. Tipo: Rio Piracicaba, Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil.

Familia **PIMELODIDAE**

***Bergiaria*** Eigenmann & Norris, 1901

***B. platana*** (Steindachner, 1908)

Loc. Tipo: La Plata, Argentina.

N. v.: bagre picudo.

***B. westermanni*** (Lütken, 1874)

Loc. Tipo: Rio das Velhas, Estado de Minas Gerais, Brasil.

N. v.: bagre, bagre chancho, bagre trompudo, mandí; yarundiá (G); papa-iscaacu (P).

***Hemisorubim*** Bleeker, 1863

***H. platyrhynchus*** (Valenciennes, 1840)

Loc. Tipo: Brasil.

N. v.: tres puntos; mandoré, mandové (G); gerupoca, jaripoca (P).

***Hypophthalmus*** Spix, 1829

***H. edentatus*** Spix & Agassiz, 1829

Loc. Tipo: Ríos del Brasil ecuatorial.

N. v.: bagre rosado, barba chata; manduvé (G); manduví rosado, mapará (P).

***H. oreomaculatus*** Nani y Fuster de Plaza, 1947

Loc. Tipo: Puerto Gaboto, río Paraná, Santa Fe, Argentina.

N. v.: bagre rosado, manduví rosado.

***Iheringichthys*** Evermann & Norris, 1900

***I. labrosus*** (Lütken, 1874)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina.

N. v.: bagre trompudo.

***Luciopimelodus*** Eigenmann, 1888

***L. patí*** (Valenciennes, 1835)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: patí; patí canal, piracatinga, morre-morre (P).

***Megalonema*** Eigenmann, 1912

***M. argentinum*** (MacDonagh, 1938)

Loc. Tipo: Río Paraná en Posadas, provincia de Misiones, Argentina.

N. v.: patí de aletas negras.

***M. platanum*** (Günther, 1880)

Loc. Tipo: Río Paraná, tributario del Río de la Plata.

N. v.: bagre blanco, bagre plateado, cabezón, mal anuncio, patí labrado, porteño, patí bastardo; patí (G).

***Parapimelodus*** La Monte, 1932

***P. valenciennis*** (Lütken, 1874)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina.

N. v.: bagarito, bagre misionero, bagre picudo, bagre porteño, porteño; mandí-i (G); mandí (P).

***Pimelodus*** Lacépède, 1803

***P. absconditus*** Azpelicueta, 1995

Loc. Tipo: San Javier, río Uruguay, provincia de Misiones, Argentina.

N. v.: bagre.



***P. albicans*** (Valenciennes, 1840)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: bagre, bagre blanco, indio, moncholo, moncholo blanco, porteñito; mandí-guasú (G); bagre branco, mandí, mandí-morotí, mandí-branco, trompudo (P).

***P. argenteus*** Perugia, 1891

Loc. Tipo: Río de la Plata; Río Paraná, Argentina.

N. v.: bagre.

***P. maculatus*** Lacépède, 1803

Loc. Tipo: Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina.

N. v.: amarillo, bagre amarillo, bagre manchado, bagre misionero, bagre overo, bagre pintado; mandí amarello, mandí pintao, mandí saigú, mandí tinga (P).

***P. mysteriosus*** Azpelicueta, 1998

Loc. Tipo: Arroyo Anselmo, Candelaria, provincia de Misiones, Argentina.

***P. ornatus*** Kner, 1858

Loc. Tipo: Surinam; Río Negro y Cuiabá, Brasil.

N. v.: bagre, bagre fajado; mandi-saihyú, mandí-guaçú (G); cabeçudo, mandí pinima (P).

#### ***Pseudoplatystoma*** Bleeker, 1862

***P. coruscans*** (Spix & Agassiz, 1829)

Loc. Tipo: Río San Francisco, Tres Marias y Pirapora, 18°13'S, 45°15'W, Minas Gerais, Brasil.

N. v.: cachorro (juvenil), mangrullo, surubí, surubí común o manchado, sorubí pintado, surubim; caconete, caparaoy, loango, pintado, piracajara, piraquera (P).

***P. reticulatum*** Eigenmann & Eigenmann, 1889

Loc. Tipo: Río Negro, Amazonas, Brasil.

N. v.: cachorro (juvenil), surubí atigrado, surubí; pirá-pará (G); pirambucú, piracambucú, sorubim rayado (P).

#### ***Sorubim*** Agassiz, 1829

***S. lima*** (Bloch & Schneider, 1801)

Loc. Tipo: Río Maranhã, Brasil.

N. v.: cucharita, cucharón, lija, lisa, patí zapatilla, pico de pato; mandové, manduvé, manduví, manduví cucharon (G); bico de pato, colhereiro, donzela, jurú pecem (P).

#### ***Steindachneridion*** Eigenmann & Eigenmann, 1919

***S. scriptum*** (Miranda Ribeiro, 1918)

Loc. Tipo: Itaquí, Río Grande do Sul, Brasil.

N. v.: bagre, bagre cabezón, mocholo, surubí.

#### ***Zungaro*** Bleeker, 1863

***Z. jahu*** (Ihering, 1898)

Loc. Tipo: Río Tietê, São Paulo, Brasil.

N. v.: manguruyu.

Familia **PSEUDOPIMELODIDAE**

#### ***Microglanis*** Eigenmann, 1912

***M. cottoides*** (Boulenger, 1891)

Loc. Tipo: Río Camaquã (Camacã), Río Grande do Sul, Brasil.

N. v.: bagre.

Familia **HEPTAPTERIDAE**

***Imparfinis*** Eigenmann & Norris, 1900

***I. mishky*** Almirón, Casciotta, Bechara, Ruiz Díaz, Bruno, D'Ambrosio, Solimano & Soneira, 2007

Loc. Tipo: Esteros de Ibera, río Corriente, Capitá Miní, 28°53'15.3"S, 58°22'02.7"W, cuenca del Río Paraná, provincia de Corrientes, Argentina.

***Phenacorhamdia*** Dahl, 1961

***P. tenebrosa*** (Schubart, 1964)

Loc. Tipo: Rio Mogi Guaçu, Brasil.

***Pimelodella*** Eigenmann & Eigenmann, 1888

***P. gracilis*** (Valenciennes, 1835)

Loc. Tipo: Río Paraná en Corrientes, Argentina.

N. v.: bagre, bagre cantor, bagre gris, bagre raquíptico, burrito; dundu, mandí-chorao, mandí-roncador (P).

***P. laticeps*** Eigenmann, 1917

Loc. Tipo: Sapucay, Paraguay.

N. v.: bagre cantor, bagre gris.

***P. taenioptera*** Miranda Ribeiro, 1914

Loc. Tipo: Rio Sepotuba, Tapirapoan, Estado de Mato Grosso, Brasil.

***Rhamdia*** Bleeker, 1858

***R. quelen*** (Quoy & Gaimard, 1824)

Loc. Tipo: Entre Caño Pastos y Hamburgo, tributario del Río Samiria, Departamento Loreto, Perú.

N. v.: bagre, bagre de arroyo, bagre lagunero, bagre negro, bagre sapo, jundia, moncholo lagunero.

Familia **CETOPSIDAE**

***Cetopsis*** Agassiz, 1829

***C. gobioides*** Kner, 1858

Loc. Tipo: Irisanga, Brasil.

N. v.: bagre, bagrecito, tiburoncito.

Familia **ASPREDINIDAE**

***Bunocephalus*** Kner, 1855

***B. doriae*** Boulenger, 1902

Loc. Tipo: Villa Rica, Paraguay; Posadas, Río Paraná, Argentina.

N. v.: guitarrita; morceguinho (P).

***Pseudobunocephalus*** Friel, 2008

***P. rugosus*** (Eigenmann & Kennedy, 1903)

Loc. Tipo: Laguna cercana al arroyo Chagalalina, Paraguay.

N. v.: guitarrita.

***Xyliphius*** Eigenmann, 1912

***X. barbatus*** Alonso de Arámburu y Arámburu, 1962

Loc. Tipo: Río Paraná en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina.

N. v.: guitarrita.

Familia **TRICHOMYCTERIDAE**

*Homodiaetus* Eigenmann & Ward, 1907

*H. anisitsi* Eigenmann & Ward, 1907

Loc. Tipo: Riacho en Villa Rica, Río Paraguay, Paraguay.

*Ochmacanthus* Eigenmann, 1912

*O. batrachostoma* (Miranda Ribeiro, 1912)

Loc. Tipo: Río Paraguay en São Luis de Cáceres, Corumbá, Estado de Mato Grosso, Brasil.

*Pseudostegophilus* Eigenmann & Eigenmann, 1889

*P. maculatus* (Steindachner, 1879)

Loc. Tipo: La Plata (probablemente por región del Plata), provincia de Buenos Aires, Argentina.

N. v.: camarón.

*Ituglanis* (Costa & Bockmann, 1993)

*I. eichhorniarum* (Miranda Ribeiro, 1912)

Loc. Tipo: Cáceres, Río Paraguay, Estado de Mato Grosso, Brasil.

*Scleronema* Eigenmann, 1917

*S. operculatum* Eigenmann, 1917

Loc. Tipo: Cacequy, Brasil.

*Trichomycterus* Valenciennes, 1846

*T. johnsoni* (Fowler, 1932)

Loc. Tipo: Descalvados, Estado de Mato Grosso, Brasil.

*Paravandellia* Miranda Ribeiro, 1912

*P. oxyptera* Miranda Ribeiro, 1912

Loc. Tipo: Cáceres, Río Paraguay, Estado de Mato Grosso, Brasil.

N. v.: chupa sangre; pirá-candú (G).

Familia **CALLICHTHYIDAE**

*Callichthys* Scopoli, 1777

*C. callichthys* (Linnaeus, 1758)

Loc. Tipo: Ríos de América.

N. v.: amarillito, cascarudo, peyón, soldado, vieja; camboatá, pirá tatú (G); cascudo, tamoatá (P).

*Hoplosternum* Gill, 1858

*H. littorale* (Hancock, 1828)

Loc. Tipo: Demerara, Guyana.

N. v.: cascarudo, peyón; gilipo, tardeí (G); tamboatam, curite, cascudo (P).

*Leptoplosternum* Reis, 1997

*L. pectorale* (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Monte Sociedad, Departamento Chaco, Paraguay.

N. v.: cascarudo.

*Corydoras* Lacépède, 1803

*C. aeneus* (Gill, 1858)

Loc. Tipo: Trinidad, Antillas Occidentales.

N. v.: tachuela; pirá-itá (G).

**C. hastatus** Eigenmann & Eigenmann, 1888

Loc. Tipo: Villa Bella (= Parintins, 2°38'S, 56°45'W), Amazonas, Brasil.

N. v.: amarillito, mandí-pimienta, sarro, tachuela, dwarf; pirá-itá (G).

**C. paleatus** (Jenyns, 1842)

Loc. Tipo: América del Sur, localidad exacta incierta.

N. v.: amarillito, barriga de fuego, basurero, limpia fondos, quitasueño, tachuela; chavití, pirá-itá (G).

**C. undulatus** Regan, 1912

Loc. Tipo: La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Familia **LORICARIIDAE**

**Hypoptopoma** Günther, 1868

**H. inexpectatum** (Holmberg, 1893)

Loc. Tipo: Río Paraguay, cerca de la ciudad de Formosa, provincia de Formosa, Argentina.

N. v.: vieja de agua, vieja.

**Otocinclus** Cope, 1871

**O. arnoldi** Regan, 1909

Loc. Tipo: "La Plata" (Río de la Plata?), Sudamérica.

N. v.: vieja de agua, viejita.

**O. vestitus** Cope, 1872

Loc. Tipo: tributario del Río Ambyiacu (Ampiyacu) cerca de Pebas, unos 03°40'S, 71°45'W, Departamento Loreto, Perú.

**O. vittatus** Regan, 1904

Loc. Tipo: Descalvados, Sistema del Río Paraguay, Estado de Mato Grosso, Brasil.

N. v.: vieja de agua.

**Hisonotus** Eigenmann & Eigenmann, 1889

**H. maculipinnis** (Regan, 1912)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Sudamérica.

**H. nigricauda** (Boulenger, 1891)

Loc. Tipo: Río Grande do Sul, Brasil.

N. v.: limpiavidrios.

**Hemiancistrus** Bleeker, 1862

**H. fuliginosus** Cardoso & Malabarba, 1999

Loc. Tipo: Río Jacutinga, camino Seara-Concórdia (BR283), Concórdia, Estado de Santa Catarina, Brasil.

**Ancistrus** Kner, 1854

**A. cirrhosus** (Valenciennes, 1836)

Loc. Tipo: Corrientes.

**Megalancistrus** Isbrucker, 1980

**M. parananus** (Peters, 1881)

Loc. Tipo: Río Paraná en La Paz, provincia de Entre Ríos, Argentina.

N. v.: vieja, vieja espinosa; cascudo, cascudo abacaxi (P).

**Hypostomus** Lacépède, 1803

**H. alatus** Castelnau, 1855

Loc. Tipo: Río Sabara, Estado de Minas Gerais, Brasil.

N. v.: vieja, cascarudo; acarí, cascudo (P).

***H. arecuta*** Cardoso, Almirón, Casciotta, Aichino, Lizarralde & Montoya-Burgos, 2012  
Loc. Tipo: Río Paraná en Puerto Yahapé, 27°29'54.5"S, 56°42'47.00"W, Ituzaingó, provincia de Corrientes, Argentina.

***H. borellii*** (Boulenger, 1897)  
Loc. Tipo: Misión de San Francisco, Río Pilcomayo, Bolivia.  
N. v.: vieja.

***H. boulengeri*** (Eigenmann & Kennedy, 1903)  
Loc. Tipo: Mato Grosso, Brasil o Asunción, Paraguay.

***H. cochliodon*** Kner, 1854  
Loc. Tipo: Río Cuiabá, Brasil.  
N. v.: vieja; cascudo, coroncho, panaque (P).

***H. commersoni*** Valenciennes, 1836  
Loc. Tipo: Río de la Plata, Montevideo, Uruguay.  
N. v.: limpiavidrio, vieja, vieja de agua, vieja de río, vieja negra; pirá-tatú, yarú-itacúa (G); acarí, cascudo (P).

***H. laplatae*** (Eigenmann, 1907)  
Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.  
N. v.: vieja.

***H. latifrons*** Weber, 1996  
Loc. Tipo: Río Aguaray-guazú, cuenca del Río Paraguay, sistemas del Río Paraná, 24°22'50"S, 58°00'W, Paraguay.  
N. v.: vieja

***H. luteomaculatus*** (Devincenzi, 1942)  
Loc. Tipo: Río Uruguay en Paysandú, Uruguay.  
N. v.: vieja, vieja de agua; cascudo (P).

***H. microstomus*** Weber, 1987  
Loc. Tipo: Río Alto Paraná, sistema del río Paraná, Departamento Itapúa, 15 km al sureste de Encarnación, Campichuelo, 27°26'S, 55°45'W, Paraguay.  
N. v.: vieja de agua.

***H. piratatu*** Weber, 1986  
Loc. Tipo: Brazo intermitente del río Tebicuary, sistema del río Paraná, Sapucái, Paraguay.

***H. regani*** (Ihering, 1905)  
Loc. Tipo: Río Piracicaba, San Pablo, Brasil.  
N. v.: vieja; cascudo (P).

***H. ternetzi*** (Boulenger, 1895)  
Loc. Tipo: Paraguay.

***H. uruguayensis*** Reis, Weber & Malabarba, 1990  
Loc. Tipo: Río Uruguay en "Rancho da Amizade", São Borja, Rio Grande do Sul, Brasil.  
N. v.: vieja.

#### ***Pterygoplichthys*** Gill, 1858

***P. ambrosettii*** (Holmberg, 1893)  
Loc. Tipo: Río Paraguay, en frente de Formosa.  
N. v.: vieja.

#### ***Rhinelepis*** Spix, 1829

***R. strigosa*** Valenciennes, 1840  
Loc. Tipo: Río Paraná en la provincia de Corrientes, Argentina.  
N. v.: vieja.

***Farlowella*** Eigenmann & Eigenmann, 1889

***F. amazonum*** (Günther, 1864)

Loc. Tipo: Río Amazonas en Santarém, Estado de Pará, Brasil.

***F. hahni*** Meinken, 1937

Loc. Tipo: Río Paraná, unos 2 km al Este de Ayolas, 27°24'S, 56°46'W, Departamento Misiones, Paraguay.

N. v.: vieja, vieja de agua.

***Sturisoma*** Swainson, 1838

***S. robustum*** (Regan, 1904)

Loc. Tipo: Río Paraguay.

***Brochiloricaria*** Isbrucker & Nijssen, 1979

***B. chauliodon*** Isbrucker, 1979

Loc. Tipo: Isla El Dorado, Paraná Guazú, 60 Km al noreste de Villa Ballester, provincia de Entre Ríos, Argentina.

***Loricaria*** Linné, 1758

***L. simillima*** Regan, 1904

Loc. Tipo: Canelos, Ecuador.

N. v.: vieja.

***L. luciae*** Thomas, Rodriguez, Carvallaro, Froehlich & Macedo Corrêa E Castro, 2013

Loc. Tipo: Río Paraná en parque privado (Club San Martín), cerca de Perichon, norte de la ruta 12, noreste de Corrientes, 27°25'6.94"S, 58°45'27.47"W, Argentina.

***Loricariichthys*** Bleeker, 1862

***L. anus*** (Valenciennes, 1835)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina.

N. v.: guitarra, vieja, vieja de agua.

***L. labialis*** (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Paraguay.

N. v.: mainmingué, vieja, vieja de agua.

***L. melanocheilus*** Reis & Pereira, 2000

Loc. Tipo: Boca del río Ijuí-Mirim, tributario del río Ijuí, Pirapó, cuenca del río Uruguay, 28°03'S 55°11'W, Rio Grande do Sul, Brasil.

N. v.: vieja, vieja de agua.

***L. platymetopon*** Isbrucker & Nijssen, 1979

Loc. Tipo: Lago de Ypacarai, San Bernardino, 25°16'S, 57°16'W, Sistema del Río Paraguay, Paraguay.

N. v.: vieja.

***Paraloricaria*** Isbrucker, 1979

***P. agastor*** Isbrucker, 1979

Loc. Tipo: Paraguay, (localidad imprecisa).

***P. vetula*** (Valenciennes, 1835)

Loc. Tipo: Vecindad de Buenos Aires, Argentina.

N. v.: vieja, vieja con barba, vieja de agua, vieja de cola, vieja de látigo.

***Pseudohemiodon*** Bleeker, 1862

***P. laticeps*** (Regan, 1904)

Loc. Tipo: Paraguay.

N. v.: vieja de cola.

*Ricola* Isbrucker & Nijssen, 1978

***R. macrops*** (Regan, 1904)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina/Uruguay.

N. v.: vieja de agua, vieja de cola.

*Rineloricaria* Bleeker, 1862

***R. lanceolata*** (Günther, 1868)

Loc. Tipo: Xeberos, Río Amazonas superior, Perú.

***R. lima*** (Kner, 1853)

Loc. Tipo: Brasil.

N. v.: vieja de agua.

***R. parva*** (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: vieja, vieja de agua.

*Spatuloricaria* Schultz, 1944

***S. evansii*** (Boulenger, 1892)

Loc. Tipo: Jangada, Estado de Mato Grosso, Brasil.

N. v.: vieja, vieja de agua.

***S. nudiventris*** (Valenciennes, 1840)

Loc. Tipo: Río São Francisco, Brasil.

Orden **GYMNOTIFORMES**

Familia **STERNOPYGIDAE**

*Eigenmannia* Jordan & Evermann, 1896

***E. trilineata*** López y Castello, 1966

Loc. Tipo: Río de la Plata, cerca de Nuñez, Buenos Aires, Argentina.

N. v.: señorita.

***E. virescens*** (Valenciennes, 1842)

Loc. Tipo: América del Sur.

N. v.: banderita, caña, cuchilla, cuchillo, chepola, chucho pepino, macheta, morenita, pez espada, ratón, ratona, señorita; pirá-kihsé (G); charuto, peixe espada da lagoa, peixe espada, pestanha, sarapú, tuvira, tuvira branca (P).

*Sternopygus* Müller & Troschel, 1849

***S. macrurus*** (Bloch & Schneider, 1801)

Loc. Tipo: Brasil.

N. v.: cuchilla.

Familia **APTERONOTIDAE**

*Apteronotus* Lacépède, 1800

***A. albifrons*** (Linné, 1766)

Loc. Tipo: Surinam

N. v.: cheroga, morena negra.

***A. brasiliensis*** (Reinhardt, 1852)

Loc. Tipo: Río das Velhas, Brasil.

N. v.: morena, morena negra; pirá-mboi (G); boca rachada, sarapó (P).

***A. ellisi*** (Alonso de Arámburu, 1957)

Loc. Tipo: Río bajo Paraná, San Pedro, Buenos Aires, Argentina.

Familia **RHAMPHICHTHYIDAE**

*Rhamphichthys* Müller & Troschel, 1849

*R. hahni* (Meinken, 1937)

Loc. Tipo: Cuenca del Paraná, cerca de Corrientes, Argentina.

*Gymnorhamphichthys* Ellis, 1903

*G. britskii* Carvalho, Ramos & Albert, 2011

Loc. Tipo: Córrego Embaúba, tributario del Río Cuiabá, 14°55'S, 56°27'W, Rosário Oeste, Mato Grosso, Brasil.

Familia **HYPOPOMIDAE**

*Brachyhypopomus* Mago-Leccia, 1994

*B. bombilla* Loureiro & Silva, 2006

Loc. Tipo: Arroyo Cuarto Palmas, sistema Los Patos-Merín, Ruta 15 km 268, 33°23'43"S, 53°51'53"W, Departamento Rocha, Uruguay.

*B. gauderio* Giora & Malabarba, 2009

Loc. Tipo: Canal de conexión entre Lagoa do Casamento y Lagoa dos Gateados, 30°28'S, 50°40'W, Palmares do Sul, Estado Rio Grande do Sul, Brasil.

Familia **GYMNOTIDAE**

*Gymnotus* Linné, 1758

*G. inaequilabiatus* (Valenciennes, 1839)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina.

N. v.: anguila, morena, pirá mboi (G); sarapó, anguiya (P).

*G. omarorum* Richer-de-Forges, Crampton & Albert, 2009

Loc. Tipo: cuenca del Río Cisne, Laguna del Sauce, 34°50.328'S, 55°06.869'W, Departamento Maldonado, Uruguay.

N. v.: anguila, morena, pirá mboi (G); sarapó, anguiya (P).

*G. pantanal* Fernandes, Albert, Daniel-Silva, Lopes, Crampton & Almeida-Toledo, 2005

Loc. Tipo: Cerca de Miranda, 20°11'78"S, 56°30'13"W, Rio Miranda, Estado Mato Grosso do Sul, Brasil.

N. v.: anguila, morena, pirá mboi (G); sarapó, anguiya (P).

*G. sylvius* Albert & Fernandes-Matioli, 1999

Loc. Tipo: Rio Ribeira de Iguapé, cerca de Miracatu, 24°32'50"S, 47°26'13"W, Estado de São Paulo, Brasil.

N. v.: anguila, morena, pirá mboi (G); sarapó, anguiya (P).

Orden **ATHERINIFORMES**

Familia **ATHERINOPSIDAE**

*Odontesthes* Evermann & Kendall, 1906

*O. bonariensis* (Valenciennes, 1835)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Montevideo, Uruguay.

N. v.: baboso, flecha de plata, matungo, pejerrey.

*O. perugiae* Evermann & Kendall, 1906

Loc. Tipo: Argentina.

N. v.: juncalero, pejerrey pigmeo, pejerrey de verano.



Orden           **CYPRINODONTIFORMES**  
Familia       **RIVULIDAE**

*Austrolebias* Costa, 1998

*A. bellottii* (Steindachner, 1881)

Loc. Tipo: La Plata, Argentina.

N. v.: doradito, pavito.

*A. nigripinnis* (Regan, 1912)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina.

N. v.: cinolebia.

*Pterolebias* Garman, 1895

*P. longipinnis* Garman, 1895

Loc. Tipo: Santarém, cuenca del Río Amazonas, Pará, Brasil.

*Melanorivulus* Costa, 2006

*M. punctatus* (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Colonia Risso, Paraguay.

Familia       **POECILIIDAE**

*Cnesterodon* Garman, 1895

*C. decemmaculatus* (Jenyns, 1842)

Loc. Tipo: Laguna del Diario, 34°54'S, 55°00'W, en Maldonado, Uruguay.

N. v.: madrecita, orillero.

*C. raddai* Meyer & Etzel 2001

Loc. Tipo: Pantano cerca de Resistencia, cuenca del Río Paraná, Provincia de Formosa, Argentina.

*Phalloceros* (Eigenmann, 1907)

*P. caudimaculatus* (Hensel, 1868)

Loc. Tipo: Costa da Serra, São Leopoldo, Brasil.

N. v.: madrecita, madrecita de una mancha; piki (G); barrigudinho, guarú-guarú (P).

*Phallotorynus* (Henn, 1916)

*P. victoriae* Oliveros, 1983

Loc. Tipo: Isla Los Mellados, cuenca del Paraná Medio, Santa Fe, Argentina.

N. v.: madrecita.

Familia       **ANABLEPIDAE**

*Jenynsia* Günther, 1866

*J. multidentata* (Jenyns, 1842)

Loc. Tipo: Montevideo, Uruguay.

N. v.: madrecita, mojarra, orillero.

Orden           **BELONIFORMES**

Familia       **BELONIDAE**

*Potamorrhaphis* Günther, 1866

*P. eigenmanni* Miranda Ribeiro, 1915

Loc. Tipo: Cáceres, río Jaurú en Porto Esperidão, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: pez aguja; pirá-pukú, pirá-timbucú, timbukú (G).

*Pseudotylosurus* Fernández Yepes, 1948

*P. angusticeps* (Günther, 1866)

Loc. Tipo: Costas del Ecuador.

N. v.: aguja de río, pez aguja; pirá-timbucú (G).

Orden **SYNBRANCHIFORMES**

Familia **SYNBRANCHIDAE**

*Synbranchus* Bloch, 1795

*S. marmoratus* Bloch, 1795

Loc. Tipo: Surinam.

N. v.: anguila, anguila criolla; mbusú, pirá-mboi (G).

Orden **PERCIFORME**

Familia **SCIAENIDAE**

*Pachyurus* Agassiz, 1831

*P. bonariensis* Steindachner, 1879

Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina.

N. v.: burriqueta, corvina, corvina de río.

*Plagioscion* Gill, 1861

*P. ternetzi* Boulenger, 1895

Loc. Tipo: Remanso, Río Grande, Paraguay.

N. v.: corvina, corvina de río.

Familia **CICHLIDAE**

*Chaetobranchopsis* Steindachner, 1875

*C. australis* Eigemann & Ward, 1907

Loc. Tipo: Bahía Negra, Paraguay.

N. v.: acara prata, cará (P).

*Bujurquina* Kullander, 1986

*B. vittata* (Heckel, 1840)

Loc. Tipo: Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: acará, chanchita; pirá-mbocayá (G).

*Cichlasoma* Swainson, 1839

*C. dimerus* (Heckel, 1840)

Loc. Tipo: Río Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil.

N. v.: acará, cará (P).

*Laetacara* Kullander, 1986.

*L. dorsigera* (Heckel, 1840)

Loc. Tipo: Villa María, Río Paraguay, América del Sur.

N. v.: acará, acará bobo, cará, cara bobo (P).

*Apistogramma* Regan, 1913

*A. borellii* (Regan, 1906)

Loc. Tipo: Carandasiño, Estado de Mato Grosso, Brasil.

N. v.: acará, cará (P).

***A. commbrae*** (Regan, 1906)

Loc. Tipo: Carandasiño, Mato Grosso, Brasil y Colonia Risso, Alto Paraguay.

N. v.: acará, cará (P).

***A. trifasciata*** (Eigenmann & Kennedy, 1903)

Loc. Tipo: Arroyo Chagalalina, Paraguay.

***Crenicichla*** Heckel, 1840

***C. jupiaensis*** Britski & Luengo, 1968

Loc. Tipo: Río Paraná, Salto de Urubupungá, entre los Estados de Mato Grosso y São Paulo, Brasil.

***C. lepidota*** Heckel, 1840

Loc. Tipo: Río Guaporé, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: boca amarga, cabeza amarga, cuatro ojos, juanita; pirá-kyguá (G); giensa-verde (P).

***C. niederleinii*** (Holmberg, 1891)

Loc. Tipo: Río Pequirí, Misiones, Argentina.

N. v.: juanita, pequirí, piquí.

***C. semifasciata*** (Heckel, 1840)

Loc. Tipo: Río Paraguay cerca de Caiçara, Mato Grosso, Brasil.

***C. taikyra*** Casciotta, Almirón, Aichino, Gómez, Piálek & Řičan, 2013

Loc. Tipo: río Paraná en Candelaria, 27°21'43.0"S, 55°51'54.7"W, Provincia de Misiones, Argentina.

***C. vittata*** Heckel, 1840

Loc. Tipo: Río Curiabá, sistema del Río Paraguay, Paraguay.

N. v.: boca amarga, cabeza amarga, juanita.

***Gymnogeophagus*** Ribeiro, 1918

***G. australis*** (Eigenmann, 1907)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: acará, chanchita, palometa.

***G. balzanii*** (Perugia, 1891)

Loc. Tipo: Villa María, Río Paraguay, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: cará (P).

***G. meridionalis*** Reis & Malabarba, 1988

Loc. Tipo: Cabeceras del río Negro a la altura de la ruta BR-153, Bagé, Río Grande do Sul, Brasil.

***Australoheros*** Řičan & Kullander, 2006

***A. facetus*** (Jenyns, 1842)

Loc. Tipo: Laguna del Diario, 34°54'S, 55°00'W, en Maldonado, Uruguay.

N. v.: castañeta, chanchita, chanchito, palometa, palometa negra, peine.

Orden **PLEURONECTIFORMES**

Familia **ACHIRIDAE**

***Catathyridium*** Chabanaud, 1928

***C. jenynsii*** (Günther, 1862)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina.

N. v.: lenguado, lenguado de río; pirá-kihgwá (G).

Orden **LEPIDOSIRENIFORMES**  
Familia **LEPIDOSIRENIDAE**

*Lepidosiren* Fitzinger, 1837

*L. paradoxa* Fitzinger, 1837

Loc. Tipo: Amazonas, Paraguay y cuenca del bajo Río Paraná: Argentina, Bolivia, Colombia, Guayana Francesa, Paraguay, Perú y Venezuela.

N. v.: lepidosirena, loloch; pirá-cururú, piramboia.

Tabla I - Especies introducidas

<b>Especie</b>	<b>Propósito de la introducción</b>
<i>Oreochromis niloticus</i>	Fue introducida por primera vez en la década del 70 en la provincia de Misiones. En la década del 80 al 90 se introdujo en las provincias de Corrientes y Formosa. (Wicki y Gromenida, 1997).

Tabla II - Especies de presencia dudosa o que requieren confirmación

<b>Especie</b>	<b>Especie mencionada por</b>
<i>Characidium</i> cf. <i>zebra</i>	Casciotta <i>et al.</i> , 2003; López <i>et al.</i> , 2005
<i>Brachyhyppomus pinnicaudatus</i>	Iwaszkiw <i>et al.</i> , 2010.

## BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA

- ANÓNIMO. 2008. Atlas Total Clarín de la República Argentina: Corrientes–1ª edición–Buenos Aires, *Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.*, v. 23, 119 pp.
- AZPELICUETA, M. DE LA M. AND S. KOERBER. 2017. *Hemigrammus tridens* Eigenmann (Characiformes, Characidae): first records of a small tetra from the Paraná River basin. *Revue Suisse de Zoologie* v. 124 (no 1): 67-71.
- BAIGÚN, C. R. M. & R. QUIRÓS. 1985. Introducción de peces exóticos en la República Argentina. *INIDEP*, 90 pp.
- BALDO, J. L.; J. G. HARO; M. A. BISTONI Y G. MARINO. 1993/1994. Primer relevamiento de la ictiofauna de los Esteros de Santa Lucía en el proyectado Parque Nacional Mburucuyá (Corrientes, Argentina). *Revista de Ictiología* 2/3: 9-12.
- BERTACO, V. A.; J. FERRER, F. R. CARVALHO & L. R. MALABARBA. 2016. Inventory of the freshwater fishes from a densely collected area in South America, a case study of the current knowledge of Neotropical fish diversity. *Zootaxa* 4138 (3): 401–440 pp.
- CASCIOTTA, J.; A. ALMIRÓN Y J. BECHARA. 2003. *Los peces de la Laguna Iberá*. Ediciones Al Margen, La Plata, 203 pp.
- CASCIOTTA, J.; A. ALMIRÓN Y J. BECHARA. 2005. *Peces del Laguna Iberá. Habiata y Diversidad*. Ediciones Grafikar, La Plata, 244 pp.
- CHEBEZ, J. C.; H. L. LÓPEZ & J. ATHOR. 2009. Peces de agua dulce amenazados en Argentina. *En: Chebez, J. C. Otros que se van Fauna Amenazada*, págs. 32-54. Editorial Albatros, Buenos Aires, 552 pp.
- ESCHMEYER, W. N.; R. FRICKE & R. VAN DER LAAN (EDS). Catalog of fishes: genera, species. (<http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/SpeciesByFamily.a> sp). Electronic version accessed May 2017.
- FERRARIS, C. J. JR. 2007. Checklist of catfishes, recent and fossil (Osteichthyes: Siluriformes), and catalogue of siluriform primary types. *Zootaxa*, 1418: 1-628.
- GIOVANNETTI, V., M. TOLEDO-PIZA & N. A. MENEZES. 2017. Taxonomic revision of *Galeocharax* (Characiformes: Characidae: Characinae). *Neotropical Ichthyology*, v. 15 (no. 1): [1-32].
- GHEDETTI, M. J. & S. H. WEITZMAN. 1996. A new species of *Jenynsia* (Cyprinodontiformes: Anablepidae) from Brazil with comments on the composition and taxonomy of the genus. *Occasional Papers of the Museum of Natural History University of Kansas*, 179: 1-25.
- IWASZKIW, J. M., F. FIRPO LACOSTE Y A. JACOBO. 2010. Relevamiento de la ictiofauna de la laguna Camba Cué, isla Apipé Grande, Corrientes, Argentina. *Rev. Museo Argentino Cienc. Nat.*, n.s., 12(1): 81-90, Buenos Aires, ISSN 1514-5158.
- KOERBER, S. 2012. List of freshwater fishes from Argentina-Update 14. *Ichthyological Contributions of Peces Criollos* 26: 1-11 available as pdf-file at [www.pecescriollos.de](http://www.pecescriollos.de) since 01.Oct.2012.
- KOERBER, S., T. O. LITZ & J. M. MIRANDE 2016. CLOFFAR-update 2-Supplement to Checklist of the freshwater fishes of Argentina. *Ichthyological Contributions of Peces Criollos*, 43: 1-6. available as pdf-file at [www.pecescriollos.de](http://www.pecescriollos.de) since 12.may.2016
- KOERBER, S., T. O. LITZ & J. M. MIRANDE. 2017. CLOFFAR-update 3-supplement to Checklist of the freshwater fishes of Argentina. *Ichthyological Contributions of PecesCriollos* 47: 1-9 available as pdf-file at [www.pecescriollos.de](http://www.pecescriollos.de) since 03.Jan.2017

- LIMA, F. C. T. 2017. A revision of the cis-andean species of the genus *Brycon* Müller & Troschel (Characiformes: Characidae). *Zootaxa* 4222 (no. 1): 1-189.
- LIOTTA, J. 2006. Distribución geográfica de los peces de aguas continentales de la República Argentina. *ProBiota, FCNyM, UNLP*, Serie Documentos N° 3, 701 pp.
- LÓPEZ, H. L., R. C. MENNI, M. DONATO & A. M. MIQUELARENA. 2008. Biogeographical revision of Argentina (Andean and Neotropical Regions): an analysis using freshwater fishes. *Journal of Biogeography*, 35: 1564-1579.
- LÓPEZ, H. L., A. M. MIQUELARENA & R. C. MENNI. 2003. Lista comentada de los peces continentales de la Argentina. *ProBiota, FCNyM, UNLP*, Serie Técnica-Didáctica N° 5, La Plata, Argentina: 1-85.
- LÓPEZ, H. L., A. M. MIQUELARENA & J. PONTE GÓMEZ. 2005. Biodiversidad y Distribución de la Ictiofauna Mesopotámica: 311-354. En: *Temas de la Biodiversidad del Litoral fluvial argentino II*. F. G. Aceñolaza (Coordinador). INSUGEO, Miscelánea, 14. 550 pp.
- LÓPEZ, H. L., C. C. MORGAN & M. J. MONTENEGRO. 2002. Ichthyological Ecoregions of Argentina. *Pro Biota, Serie Documentos* N° 1, FCNYM-UNLP ISSN 1666-731X.
- MAZZA, G. 1961. *Recursos hídricos superficiales. Evaluación de los Recursos Naturales de la Argentina* (primera etapa). CFI, Buenos Aires, 4 (1): 1-459.
- MENNI, R. C. 2004. *Peces y ambientes en la Argentina continental*. Monografías del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires, Argentina, 5: 1-316. ISSN 1515-7652.
- MIRANDE, J. M. & S. KOERBER. 2015. Checklist of the freshwater fishes of Argentina (CLOFFAR). *Ichthyological Contributions of Peces Criollos*, 36: 1-68.
- MORRONE, J. J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. *Manuales y Tesis, Sociedad Entomológica Aragonesa (SEA)*, 3, Zaragoza, España, 148 pp.
- POYSEGGUR, H. 1910. Expedición al Iberá. *An. Soc. Cient. Argentina*. 78: 241-258; 79: 35-64 / 135-164.
- POZZI, A. 1945. Sistemática y Distribución de los Peces de Agua Dulce de la República Argentina. *GAEA*, 7: 239-292.
- RAMIREZ, J. L., J. L. O. BIRINDELLI & P. M. GALETTI, JR. 2017. A new genus of Anostomidae (Ostariophysi: Characiformes): Diversity, phylogeny and biogeography based on cytogenetic, molecular and morphological data. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, v. 107: 308-323.
- REIS, R. E., S. O. KULLANDER & C. R. FERRARIS (Editors). 2003. *Check List of the Freshwater Fishes of South and Central America*, CLOFFSCA. EDIPUCRS, Porto Alegre, Brasil, 729 pp. ISBN 85-7430-361-5.
- RINGUELET, R. A. 1961. Rasgos fundamentales de la zoogeografía de la Argentina. *Physis*, Buenos Aires, Argentina, 22 (63): 151-170.
- RINGUELET, R. A. 1975. Zoogeografía y ecología de los peces de aguas continentales de la Argentina y consideraciones sobre las áreas ictiológicas de América del Sur. *Ecosur*, 2 (3): 1-122.
- RINGUELET, R. A.; R. H. ARÁMBURU Y A. A. ARÁMBURU. 1967. *Los peces argentinos de agua dulce*. Comisión de Investigaciones Científicas, Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. 559 pp.
- TERÁN, G. E., F. ALONSO, I. GARCÍA, P. CALVIÑO & J. M. MIRANDE. 2016. Occurrence of *Astyanax dissensus* Lucena & Thofehn, 2013 (Teleostei: Characidae) in Argentina. *Check List* 12 (1/1828): 1-3


WICKI, G. A. Y N. GROMENIDA. 1997. *Estudio de desarrollo y producción de tilapia*. Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura, SAGYP, Buenos Aires, 29pp.

<http://ictiologiaargentina.blogspot.com>

<http://www.fishbase.org/search.php>

<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49863>

### IMAGEN DE CIERRE



Aime Bonpland, por *carloскарtoons*

NADALIN, D. O.; PROTOGINO, L. C. & H. L. LÓPEZ. 2017. Peces de la provincia de Corrientes. *ProBiota*, FCNyM, UNLP, La Plata, Argentina, *Serie Técnica y Didáctica* 37: 1-30. ISSN 1515-9329.

### **ProBiota**

*(Programa para el estudio y uso sustentable de la biota austral)*

Museo de La Plata

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP

Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Argentina

### **Directores**

**Dr. Hugo L. López**

[hlopez@fcnym.unlp.edu.ar](mailto:hlopez@fcnym.unlp.edu.ar)

**Dr. Jorge V. Crisci**

[crisci@fcnym.unlp.edu.ar](mailto:crisci@fcnym.unlp.edu.ar)

<http://ictiologiaargentina.blogspot.com.ar/>

<http://raulringuelet.blogspot.com.ar/>

<http://aquacomm.fcla.edu>

<http://sedici.unlp.edu.ar/>

Indizada en la base de datos ASFA C.S.A.