
NOVEDADES ZOOGEOGRAFICAS

**MELANOPHRYNISCUS
STELZNERI FULVOGUTTATUS
(ANURA: BUFONIDAE).
PRIMERA CITA PARA LA
PROVINCIA DE SANTIAGO
DEL ESTERO, ARGENTINA**

NÉSTOR G. BASSO y JORGE D. WILLIAMS
Departamento Científico Zoología Vertebrados,
Museo de la Plata, Paseo del Bosque s/n,
(1900) La Plata, Argentina.

Melanophryniscus stelzneri fulvoguttatus
(Mertens, 1937). República Argentina, pro-
vincia de Santiago del Estero, Monte Que-
mado, 25° 48'S, 62° 52'W. Nueve ejempla-
res adultos (seis machos y tres hembras).
MACN 35421-35429.

Comentarios

Durante un estudio taxonómico de las
especies de *Melanophryniscus* del grupo *stelzneri*
se constató la existencia de nueve
ejemplares de *M. s. fulvoguttatus* provenien-

tes de la provincia de Santiago del Estero
depositados en el Museo Argentino de
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia".
Esta especie era conocida hasta el presen-
te para el Paraguay y las provincias argen-
tinas de Formosa, Chaco y Corrientes.

La longitud hocico-cloaca promedio de
los ejemplares estudiados es de 25,51 mm
(hembras: 26,67 mm; machos: 24,93 mm).

En un trabajo reciente, referido a la an-
fibiofauna del Uruguay, Klappenbach y Lan-
gone (1992) proponen elevar a nivel espe-
cífico las subespecies de *Melanophryniscus
stelzneri* (Weyenbergh, 1875). Preferimos,
por el momento, conservar la forma de
Mertens a nivel subespecífico hasta tanto
se finalice la revisión taxonómica de las es-
pecies del grupo *stelzneri*, actualmente en
desarrollo.

Literatura citada

KLAPPENBACH, M. A. & J. A. LAN-
GONE, 1992. Lista sistemática y sinonimi-
ca de los anfibios del Uruguay con comen-
tarios y notas sobre su distribución. *Ana-
les del Museo Nacional de Historia Natural
de Montevideo* 2ª Serie 8: 163-222.

**LIOLAEMUS DONOSOBARROSI:
AMPLIACIÓN DE SU
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Y PRIMERA CITA
PARA LA PROVINCIA DE
NEUQUÉN**

LUCIANO JAVIER ÁVILA
CONICET - Departamento de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Río Cuarto.
Estafeta Postal 9 (5800) Río Cuarto.

Liolaemus donosobarrosi (Cei 1974). Rep.
Argentina, prov. Neuquén, dto. Zapala, Ce-
rro Bandera (22 km. O. Cutral Có- 38° 56'
S - 69° 13' O). En la vera sur de la Ruta
Nacional Nro. 22, a 1.000 m al E. del Ya-
cimimiento Petrolífero Cerro Bandera, en am-
biente tipo "Monte" con suelo predominan-
temente arenoso.

ZV-UNRC 3614-1617. Dos machos adul-
tos. Colector: L. Ávila. 23 de marzo de
1995.

ZV-UNRC 3694. Una hembra adulta. Co-

lector: L. Ávila. 2 de diciembre de 1995.

ZV-UNRC = Zoología Vertebrados-Universidad Nacional de Río Cuarto.

Comentarios

Liolaemus donosobarrosi es un lagarto psammófilo el cual era conocido hasta el momento para dos localidades: médanos salitrosos de Matancilla, dto. Malargüe, prov. Mendoza (localidad tipo, CeI 1974) y Cipolleti, dto. Gral. Roca, prov. Río Negro (CeI 1979, 1986). Con esta nueva cita se extiende su distribución unos 150 km. al oeste y es la primera cita para la provincia de Neuquén.

Literatura citada

- CEI, J.M. 1974. Two new species of *Ctenoblepharis* (Reptilia, Iguanidae) from the arid environments of the central Argentina (Mendoza province). *J. herpetol.* 8: 71-75.
- CEI, J.M. 1979. A reassessment of the genus *Ctenoblepharis* (Reptilia, Sauria, Iguanidae) with a description of a new subspecies of *Liolaemus multimaculatus* from Western Argentina. *J. herpetol.* 13(3): 297-302.
- CEI, J.M. 1986. Reptiles del centro, centro-oeste y sur de la Argentina. Herpetofauna de zonas áridas y semiáridas. Mon. IV. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino, 527 pp.

AMPLIACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE *HYLA SANBORNI* SCHMIDT, 1944 (ANURA: HYLIDAE) PRIMERA CITA PARA LA PROVINCIA DE MISIONES

ROBERTO E. STETSON,
PATRICIA BENÍTEZ Y NELSON PIVIDORI
Proyecto de Relevamiento Herpetológico de la
Facultad de Ciencias Exactas Químicas y
Naturales de la Universidad Nacional de
Misiones. Félix de Azara 174, CP 3300
Posadas, Misiones.

Hyla sanborni SCHMIDT, 1944. Rep. Argentina, provincia de Misiones, Depto capital, Posadas (27° 23' S, 55° 53' W) CH-MUNaM 075 agosto de 1987; 098 y 099 abril de 1988, 246 octubre de 1992, 401 y 402 septiembre de 1995 colector: R. E. Stetson; 428 al 436 marzo de 1996 colector: R. E. Stetson y colaboradores.

Comentarios

El hallazgo de *Hyla sanborni* en la Ciudad de Posadas surge como consecuencia del estudio que se viene realizando desde el año 1986, con el objeto de conocer las especies que hoy comparten los espacios urbanos con el hombre.

Los resultados obtenidos hasta la fecha han permitido confirmar que un número importante de especies se adaptan a las modificaciones introducidas por el hombre. Se ha contribuido a engrosar el número de especies para la provincia de Misiones, *Bufo pygmaeus*, Myers y Carvalho, 1952; *Leptodactylus chaquensis* CeI, 1950; *Hyla raniceps* (Cope, 1862), (Stetson, 1994).

Los ejemplares todos machos, fueron capturados cantando en dos áreas periféricas al centro de la ciudad, una de las cuales es el Balneario Municipal.

La distribución anterior de la especie comprendía las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe (CeI, 1980; Klappenbach y Langone 1992; Langone y Basso 1987 Gallardo, 1987; Gallardo y Olmedo 1992).