

**CLELIA RUSTICA (COLUBRIDAE)  
EN EL SUR DEL NEUQUÉN,  
ARGENTINA.**

MIGUEL I. CHRISTIE.

Sociedad Naturalista Andino Patagónica,  
Villegas 369, 3°B, 8400 Bariloche, R.N.

*Clelia rustica*: Argentina, Pcia. del Neuquén: 1) Dep. Lacar, 4 Km NE de Paso Miranda, Ruta Nacional 237 vieja, 625 msnm. 40° 35' S., 70° 49' W. 13/4/1983. (MACN n° 36.784, MIC 610); 2) Dep. Collon Cura, costa E. Puente La Rinconada, empalme R. Nac. 40-234, 690 msnm. 40° 00' S., 70° 50' W. 28/2/1992. (MACN n° 36.785, MIC 1141). MACN = Museo Argentino de Ciencias Naturales, MIC = catálogo del autor.

**Comentarios**

Datos y Medidas (MIC 610, 1141): sexo:?, macho; peso: 43, 54 gr.; largo total: 560, 610 mm; largo hocico-ano: 500, 510 mm. Por cien de cola/LT: 10.7, 16.4 %; escamas ventrales: 200, 185; subcaudales: 40, 51. Asigno los ejemplares a *C. rustica* por el bajo n° de subcaudales y la cola corta (Scrocchi & Viñas, 1990).

Las citas más cercanas para *C. rustica* son de las provincias de Córdoba y Buenos Aires (Williams y Francini, 1991), y en Patagonia para Río Negro (San Antonio Oeste) y Chubut (Península Valdés), ambas en la costa Atlántica (Ceí, 1993). El presente registro extiende la distribución al sud del Neuquén, representando una nueva especie para esta provincia.

El 1° ejemplar fue hallado vivo, cruzando la ruta a las 24:00 hs.; el 2° muerto sobre la ruta, a las 2:30. Ambos en áreas dominadas por estepa patagónica arbustiva, con elementos del monte, en la planicie aluvial de los

ríos. Su presencia en los valles Limay y Collón Curá coincide con la de otros vertebrados típicos del monte y la región pampeana que ingresan por ellos hasta las estribaciones de los Andes del noroeste patagónico: herpetofauna como *Liophis sagittifer* (Ceí, 1986), *Philodryas patagoniensis* y *Bufo arenarum* (obs. pers.); aves como *Knipolegus aterrimus*, *Molothrus badius* y *Pseudocoloapterix flaviventris* (obs. pers., Contreras, 1977); mamíferos como *Thylamys pusilla*, *Calomys musculus* y *Akodon iniscatus* (Pearson, 1995). Entre los 40° y 41° S el límite altitudinal para este conjunto oscila entre los 600 y 700 msnm. La jarilla (*Larrea* sp., obs. pers.) se extendía por el valle del Limay hasta la confluencia con el Collón Curá, hoy inundada por el dique Alicura. Probablemente el hábito nocturno contribuye a la escasez de datos para la región.

**Literatura citada**

- CEI, J.M. 1986. Reptiles del centro, centro-este y sur de la Argentina. *Mus. Reg. Sc. Nat. Torino*. Monografía IV. 527 pp.
- CEI, J.M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina. *Mus. Reg. Sc. Nat. Torino*. Monografía XIV. 949 pp.
- CONTRERAS, J. 1977. La avifauna del Valle del Río Collón Curá, Provincia de Neuquén. *IDIA*, Suplemento 34:250-270.
- PEARSON, O.P. 1995. Annotated keys for identifying small mammals living in or near Nahuel Huapi National Park or Lanín National Park, southern Argentina. *Mastozool. Neotropical* 2 (2): 99-148.
- SCROCCHI, G. J. & M. VIÑAS, 1990. El género *Clelia* (Serpentes, Colubridae) en la República Argentina: revisión y comentarios. *Bol. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino* 8 (2): 487-499.
- WILLIAMS, J. D. y F. FRANCINI, 1991. A checklist of the Argentina snakes. *Bol. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino* 9 (1): 55-90.