

## NOTA

**STENOCERCUS DOELLOJURADOI**  
(IGUANIDAE, TROPIDURINAE): UNA  
NUEVA ESPECIE PARA LA  
PROVINCIA DE SAN JUAN,  
ARGENTINA

LASPIUR, ALEJANDRO  
ACOSTA, JUAN CARLOS

Departamento de Biología e Instituto y Museo de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan. Av. España 400 (N), (5400) San Juan, Argentina.

laspiursaurus@gmail.com

jacosta@uolsinectis.com.ar

*Stenocercus doellojuradoi*  
(Freiberg, 1944)

LOCALIDAD: República Argentina, Provincia de San Juan, Depto. Valle Fértil, 3 km al norte de la localidad de Las Tumanas sobre la Ruta Provincial 510 (30°52' S, 67°20' W).

COLECTOR: Alejandro Laspiur.

FECHA: 25 /02/ 2006.

MATERIAL DE REFERENCIA: Instituto y Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de San Juan: IMCN-UNSJ 3000. Un ejemplar macho (LHC: 54 mm.).

COMENTARIOS: Al ejemplar capturado se lo encontró asociado a densa vegetación xerófila conformando un cerco vivo o ramada natural, constituida principalmente por *Clematis montevidensis* y *Grabowskia obtusa*. Su distribución conocida comprende a las provincias de La Rioja (Terra typica), centro de Catamarca, Santiago del Estero, noroeste de Córdoba y norte de San Luis, una distribución de indudable fisonomía chaqueña (Ceí, 1986). Valle Fértil, pertenece

ce al sistema de Sierras Pampeanas (Cabrera, 1994), y se ubica en el grupo climático BSwka (climas de estepa, con precipitaciones en verano) de la clasificación climática de Köppen (Poblete y Minetti, 1999). Estos aspectos hacen particular a Valle Fértil, y sus condiciones en conjunto, constituyen una excepción a la aridez generalizada en el territorio sanjuanino. Esta desigualdad regional hace corresponder a Valle Fértil con los elementos fisiográficos presentes en las localidades anteriormente mencionadas. Es por ello que en esta nota se cita por primera vez, con ejemplar de referencia, la presencia de un nuevo género y especie de saurio para el este de San Juan indicando indirectamente con él la presencia ecotonal de la eco-región Chaco Árido para el este de la provincia. Esta especie fue hallada en sintopía con *Teius teyou* y *Liolaemus chacoensis*.

**Agradecimientos.**— Agradecemos a María Lucero y a su familia por la hospitalidad brindada en el transcurso de la campaña.

## BIBLIOGRAFÍA

- CABRERA, A. L. 1994. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería, Tomo II, Regiones Fitogeográficas Argentinas, Editorial ACME S.A.C.I., 30 pp. 30.
- CEI, J. M. 1986. Reptiles del Centro, Centro-Oeste y Sur de la Argentina. Herpetofauna de Zonas Áridas y Semiáridas. Museo Regionale di Scienze Naturali Torino. Monografie IV, 527 pp. 275-277.
- POBLETE, A. & J. MINETTI. 1999. Configuración espacial del clima de San Juan. CD Síntesis del cuaternario de la Provincia de San Juan IN- GEO, UNSJ, San Juan, Argentina.