

4

**EXTRACCIÓN DE DIENTES RETENIDOS CON AGREGADO DE HEMOSTÁTICO LOCAL (Jóvenes universitarios)**

Autores: P. Di Franco; Azpeitia, M.; Bogo P.; Ricciardi A.. V.; Cacciola, S.; Prada, G.

FOLP. (UNLP).50 e/1 y 115

Introducción: En la consulta odontológica se observan con frecuencia dolores referidos al yodo y maxilar inferior con acompañamiento en algunos casos de tumoraciones en el sector ángulo mandibular y apiñamientos dentarios en el sector anterior. El tratamiento es generalmente quirúrgico. El postoperatorio del paciente difiere de acuerdo al trauma operatorio y al tratamiento de la brecha quirúrgica. Objetivos: comparar el edema postoperatorio, la cicatrización y el dolor postoperatorio con y sin dermis porcina leofilizada (DPL). Material y método: población (Individuos de más de 25 años de edad, ambos sexos, residentes en la R.A., de raza blanca y de cualquier nacionalidad. Muestra (Pacientes concurrentes a la F.O.L.P., Cátedra de Cirugía A, U.N.L.P. que presentaron terceros inferiores retenidos (100 individuos). Los estudios por imágenes que se realizaron fueron técnicas panorámicas y periapicales como corto con incidencia normal del rayo radiografías digitales, T.A.C. y radiovisiógrafo, según el caso clínico fueron estudiados en forma más exhaustiva(historia clínica y de ser necesario estudios de laboratorio) se los trato según el caso clínico a 50 se les colocó dermis porcina t a 50 nada (coágulo), se evaluó en el postoperatorio dolor(- sin dolor, + molestias, ++ mucho dolor), edema (- sin edema, + ligero, ++ importante) Resultados: Sin dermis 52 mujeres y 48 hombres, con dermis 56 mujeres y 44 hombres, dolor sin dermis: 8%, molestias 84%, mucho dolor 8%, con dermis sin dolor 28%, molestias 72%; edema sin dermis sin edema 12%, ligero 78% importante 10%, con dermis sin edema 44%, ligero 56% Conclusiones: la colocación de dermis porcina leofilizada disminuyó el dolor y edema en los pacientes la regeneración ósea.