INTRODUCCIÓN

La familia de las Compuestas (Asteraceae) es la más numerosa de todas las fanerógamas con aproximadamente de 23000 especies y más de 1500 géneros ampliamente distribuidos en todos los continentes excepto en la Antártida. En la República Argentina es la familia más abundante con 222 géneros nativos y 1490 especies, en tanto que en la provincia de Buenos Aires, las compuestas representan la sexta parte de la flora de plantas vasculares con 113 géneros y 356 especies de las cuales unas 55 son adventicias y el resto indígenas.

Las Compuestas están caracterizadas por una inflorescencia denominada capítulo (formada por flores sésiles sobre un receptáculo común, rodeadas por un involucro de brácteas o filarios), y por presentar frutos llamados aquenios, que en la mayor parte de los casos están coronados por estructuras escamosas o pilosas que reciben el nombre de papus y que participan en la dispersión. Además desde el punto de vista químico, son vegetales con inulina y muchas de sus especies producen látex.

Muchas de las especies de esta familia son utilizadas por el hombre como plantas alimenticias (***Lactuca sativa***, ***Cichorium intybus***, ***Helianthus annuus***, etc.) o medicinales (***Baccharis crispa***, ***Matricaria recutita***, etc.). Algunas especies son tóxicas para el ganado (***Senecio* spp.**, ***Baccharis coridifolia***), en tanto otras tienen valor ornamental (***Calendula officinalis***, ***Dahlia pinnata***, etc.). Otras son utilizadas como repelentes de insectos (***Chrysanthemum cinerariifolium***) o son perjudiciales (***Carduus* spp.**) por ser malezas invasoras en los campos y competir con las plantas cultivadas.

FORMATO

Los taxa fueron ordenados alfabéticamente y en el caso de los géneros, han sido acompañados por la tribu a la que pertenece. Para cada uno de ellos se cita el nombre válido (en negrita), seguido de la sigla del autor o autores. Se citan también los sinónimos (en letra itálica), incluyendo el basónimo en el caso de las combinaciones, y los nombres vulgares de acuerdo con las referencias bibliográficas para la Argentina y los países limítrofes.

Referencias bibliográficas. Están acotadas únicamente a publicaciones donde puede encontrase información ampliada sobre los taxa en cuestión, y que incluye descripciones, datos sobre su distribución geográfica y otras observaciones.

Diagnosis. Se consignan exclusivamente los aspectos morfológicos más importantes en cada taxa que, además, son complementados con las ilustraciones.

Status. Se aportan datos sobre las especies adventicias, nativas o endémicas restringiéndose éstas sólo a aquellas representadas exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Los endemismos argentinos representados también en otras provincias son tratados como especies nativas, en tanto que aquellas consideradas como malezas son destacadas en este acápite.

Categoría. Se considera el estado conservacionista de los taxa según Delucchi y Correa (1992), utilizando los acrónimos propuestos por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), para las categorías de extinta (**EX**); vulnerable (**V**); rara (**R**), insuficientemente conocida (**K**) y sin tratamiento (**NT**).

Ecología: Los datos consignados bajo este ítem fueron tomados directamente de las etiquetas de los ejemplares de referencia consultados o recopilados de fuentes bibliográficas.

Distritos biogeográficos. Se siguió la clasificación de Cabrera (1976) considerándose la provincia Paranaense (**PNE**), la provincia del Espinal con sus distritos del Caldén (**PEC**) y del Talar (**PET**), la provincia Pampeana con los distritos Occidental (**PPO**), Oriental (**PPR**) y Austral (**PPA**), y la provincia del Monte (**PMT**).

Partidos. La distribución geográfica en la provincia de Buenos Aires se indica en cada taxa para la totalidad de los partidos en que está representado según las colectas de los ejemplares consultados y datos bibliográficos, para lo cual se siguió la siguiente nomenclatura:

AAL (Adolfo Alsina)
AGC (Adolfo Gonzales Chaves)
ALB (Alberti)
ATB (Almirante Brown)
AVE (Avellaneda)
AYA (Ayacucho)
AZU (Azul)
BAL (Balcarce)
BAR (Baradero)
BBL (Bahía Blanca)
BER (Berisso)
BMT (Bartolomé Mitre)
BNJ (Benito Juárez)
BOL (Bolívar)
BRA (Bragado)
BZT (Berazategui)
CAM (Campana)
CAÑ (Cañuelas)
CAR (Carmen de Areco)
CAS (Castelli)
CBR (Coronel Brandsen)
CCR (Carlos Casares)
CDR (Coronel Dorrego)
CLR (Coronel L. Rosales)
COL (Colón)
CPR (Coronel Pringles)
CSM (Capitán Sarmiento)
CST (Partido de la Costa)
CSZ (Coronel Suárez)
CTJ (Carlos Tejedor)
CHA (Chacabuco)
CHI (Chivilcoy)
CHM (Chascomús)
DAI (Daireaux)
DOL (Dolores)
EEV (Esteban Echeverría)
ENS (Ensenada)
ESC (Escobar)
EXC (Exaltación de la Cruz)
EZE (Ezeiza)
FAM (Florentino Ameghino)
FVL (Florencio Varela)
GAL (General Alvarado)
GAR (General Arenales)
GAV (General Alvear)
GBG (General Belgrano)
GGD (General Guido)
GJM (General Juan Madariaga)
GLH (General Las Heras)
GLM (General La Madrid)
GLV (General Lavalle)
GPA (General Paz)
GPI (General Pinto)
GPU (General Pueyrredón)
GRZ (General Rodríguez)
GSM (General San Martín)
GUA (Guaminí)
GVI (General Viamonte)
GVL (General Villegas)
HUR (Hurlingham)
HYR (Hipólito Yrigoyen)
IMG (Isla Martín García)
ITU (Ituzaingó)
JCP (José C. Paz)
JUN (Junín)
LAN (Lanús)
LAP (Laprida)
LBR (Lobería)
LFL (Las Flores)
LIN (Lincoln)
LMT (La Matanza)
LNA (Leandro N. Alem)
LOB (Lobos)
LPT (La Plata)
LUJ (Luján)
LZA (Lomas de Zamora)
MAG (Magdalena)
MAI (Maipú)
MAR (Malvinas Argentinas)
MCH (Mar Chiquita)
MER (Mercedes)
MHR (Monte Hermoso)
MIR (Miramar)
MON (Monte)
MOR (Moreno)
MPZ (Marcos Paz)
MRL (Merlo)
MRN (Morón)
NAV (Navarro)
NEC (Necochea)
NJL (Nueve de Julio)
OLA (Olavarría)
PAT (Patagones)
PEH (Pehuajó)
PEL (Pellegrini)
PER (Pergamino)
PIL (Pila)
PIN (Punta Indio)
PLR (Pilar)
PMR (Pinamar)
PUA (Puán)
QUI (Quilmes)
RAM (Ramallo)
RAU (Rauch)
RIV (Rivadavia)
ROJ (Rojas)
RPZ (Roque Pérez)
SAA (Saavedra)
SAD (Saladillo)
SAG (San Andrés de Giles)
SAL (Salto)
SAQ (Salliqueló)
SAR (San Antonio de Areco)
SCY (San Cayetano)
SFR (San Fernando)
SID (San Isidro)
SMG (San Miguel)
SNC (San Nicolás)
SPD (San Pedro)
SUI (Suipacha)
SVT (San Vicente)
TAN (Tandil)
TAP (Tapalqué)
TAY (Tres Arroyos)
TFB (Tres de Febrero)
TIG (Tigre)
TLM (Tres Lomas)
TLQ (Trenque Lauquen)
TOR (Tordillo)
TRQ (Tornquist)
VGS (Villa Gesell)
VIL (Villarino)
VLP (Vicente López)
VMA (Veinticinco de Mayo)
ZAR (Zárate).

Bajo la sigla **DEL** se consignan aquellos casos de plantas que crecen en la región del Delta del Paraná cuyos sitios de colecta no pudieron ser asignados a los partidos que conforman su división política.



Provincias limítrofes. Se citan las provincias limítrofes en que se distribuyen los taxa según los siguientes acrónimos: **SFE** (Santa Fe); **PAM** (La Pampa); **ERI** (Entre Ríos); **CDB** (Córdoba) y **RNG** (Río Negro). Bajo este ítem se considera también, por razones prácticas, la Capital Federal (**DF**).

Uso. Se citan aquellos usos conocidos para cada uno de los taxa según las referencias bibliográficas encontradas en la literatura especializada (Zardini, 1984a,b; FontQuer, 1993; Marzocca, 1997).

Ejemplar examinado. Se cita como referencia, un ejemplar herborizado perteneciente a la provincia de Buenos Aires, destacando el colector y número, así como las siglas de la institución donde está depositado según Holmgren *et al.* (1990). En aquellos casos en que no fue posible revisar un ejemplar, el mismo se indica con un asterisco (*) correspondiendo en ese caso la cita, a un espécimen indicado por el autor en las referencias.

Ilustraciones. Las ilustraciones de las especies fueron extraídas en su mayor parte de: Cabrera, A.L. Compositae, Flora de la provincia de Buenos Aires 6(3), 1963; Cabrera, A.L., Compositae, en M.N. Correa, Flora Patagónica 7:1-451, 1971; Cabrera, A.L., Compositae, en A. Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), 6:106-554, 1974; Cabrera, A.L., Compositae, Flora de la provincia de Jujuy 10:1-726, 1978; Freire, S. E., Compositae. En R. Spichiger & Ramella (eds.). Flora del Paraguay 27: 9-100, 1998. En aquellos casos en que las especies no tenían ilustraciones en las citadas floras, las mismas fueron realizadas por los autores del presente trabajo.

Acanthospermum Schrank., Heliantheae

1. ***Acanthospermum australe*** (Loefl.) Kuntze
N. Vulgar: Natiu, Tapecué, Tapecuí, Yerba de la oveja
Sin.: Acanthospermum brasilianum Schrank, *Acanthospermum hirsutum* DC., *Acanthospermum xanthioides* (Kunth) DC., *Centrospermum xanthioides* Kunth, *Melampodium australe* Loefl., *Orcya adhaerens* Vell.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hierba anual; hojas rómbico-ovadas; capítulos solitarios; aquenios con cerdas ganchudas rígidas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En terrenos arenosos
Distrito: PNE.
Partido: BAR, BER, ENS, IMG, SPD.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 2005* (LP).

2. ***Acanthospermum hispidum*** DC.
N. Vulgar: Guajerilla, Rodajillo
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hierba anual; hojas elípticas a ovadas; capítulos solitarios; aquenios con cerdas ganchudas y dos espinas largas en el ápice
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En suelos secos, arenosos, al borde de caminos
Distrito: No existen referencias
Partido: Sólo representado en DF.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Molfino 595* (LP).

Achillea L., Anthemideae

3. ***Achillea millefolium*** L.
N. Vulgar: Mil hojas, Yerba de los carpinteros
Sin.: *Achillea lanulosa* Nutt., *Achillea sudetica* Opiz.
Ref.: Cabrera, 1971; Moore, 1983; Bremer & Humphries, 1993; Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas 2-3 pinnatisectas; capítulos en corimbos; flores del margen liguladas, blancas, las del disco tubulosas; papus ausente
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En jardines, borde de caminos, cultivos
Distrito: PET, PPA, PPR.
Partido: COL, CSM, GAL, GPU, JUN, MAG, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, RNG, SFE.
Uso: Alimenticia; Forrajera; Medicinal; Ornamental; Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 851* (LP).

Achyrocline DC., Inuleae

4. ***Achyrocline alata*** (Kunth) DC.
N. Vulgar: Yatei-kaá
Sin.: *Achyrocline alata* (Kunth) DC. var. *vautheriana* (DC.) Baker, *Achyrocline argentina* O. Hoffm., *Achyrocline flavescens* Griseb., *Achyrocline pterocaula* DC., *Achyrocline vautheriana* DC., *Gnaphalium alatum* Kunth
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978; Giangualani, 1976.
Diagnosis: Subarbusto canescente; tallos alados; hojas lineares a linear-lanceoladas, concoloras; flores amarillas 6-11
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En la ribera platense
Distrito: PNE.
Partido: SFR.
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 24739* (LP).

5. ***Achyrocline satureioides*** (Lam.) DC.
N. Vulgar: Alquitrán, Marcela, Marcela del campo, Marcela hembra, Marcelita, Virá-guazú
Sin.: *Achyrocline vargasiana* DC., *Gnaphalium satureioides* Lam.
Ref.: Giangualani, 1976; Cabrera, 1963, 1971, 1974.
Diagnosis: Subarbusto canescente; hojas lineares a linear-lanceoladas, discoloras; flores amarillas 5-12
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En dunas, vertientes, faldas y cumbres de las sierras hasta los 1160 m.s.m. y al borde de caminos
Distrito: PEC, PET, PPA.
Partido: BAL, GJM, GLV, GPU, IMG, JUN, LBR, MHR, PAT, SAA, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 4915* (LP).

Acmella Rich. ex Pers., Heliantheae

6. ***Acmella bellidioides*** (Sm.) R.K. Jansen
Sin.: *Ceratocephalus arnicoides* (DC.) Kuntze, *Rudbeckia bellidioides* Sm., *Spilanthes arnicoides* DC., *Spilanthes arnicoides* DC. f. *setosa* Chodat, *Spilanthes arnicoides* DC. var. *intermedia* Chodat, *Spilanthes bellidioides* (Sm.) Cabrera, *Spilanthes blepharicarpa* DC., *Spilanthes doronicoides* DC., *Spilanthes grandis* DC., *Spilanthes grisea* (Chodat) A.H. Moore var. *intermedia* (Chodat) A.H. Moore, *Spilanthes grisea* (Chodat) A.H. Moore var. *micra* A.H. Moore, *Spilanthes grisea* (Chodat) A.H. Moore var. *setosa* (Chodat) A.H. Moore, *Spilanthes longifolia* DC., *Spilanthes sphaerocephala* DC.
Ref.: Jansen, 1985; Cabrera & Zardini, 1978; Sáenz 1996.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas ovadas a ovado-elípticas; capítulos pedunculados solitarios; aquenios ciliados; papus con dos aristas muy cortas
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En suelos aluviales
Distrito: PNE.
Partido: IMG.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Hurrell et al., 2541* (LP).



001

004

002

005



003



006

7. ***Acmella decumbens*** (Sm.) R.K. Jansen
N. Vulgar: Nim-nim
Sin.: *Ceratocephalus decumbens* (Sm.) Kuntze, *Ceratocephalus decumbens* (Sm.) Kuntze var. *macropoda* (DC.) Kuntze, *Rudbeckia decumbens* Sm., *Spilanthes americana* (L.f.) Hieron. var. *stolonifera* (DC.) A.H. Moore, *Spilanthes arnicoides* DC. var. *macropoda* (DC.) Baker, *Spilanthes decumbens* (Sm.) A.H. Moore, *Spilanthes decumbens* (Sm.) A.H. Moore var. *macropoda* (DC.) A.H. Moore, *Spilanthes helenioides* Hook. & Arn., *Spilanthes macropoda* DC., *Spilanthes stolonifera* DC.
Ref.: Jansen, 1985; Cabrera & Zardini,1978; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Hierba perenne, decumbente, radicante; hojas lanceoladas; capítulos pedunculados, solitarios; aquenios comprimidos, ciliados; papus con dos aristas ciliadas cortas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En todo tipo de suelos
Distrito: PNE, PPA.
Partido: GAL, GPU, IMG, LPT, SFR, TAN, ZAR.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 3411* (LP).

8. ***Acmella decumbens*** (Sm.) R.K. Jansen var. ***affinis*** (Hook. & Arn.) R.K. Jansen
N. Vulgar: Nil-nil, Nim-nim
Sin.: *Spilanthes affinis* Hook. & Arn., *Spilanthes americana* (L.f.) Hieron. var. *stolonifera* (DC.) A.H. Moore f. *ciliatifolia* A.H. Moore, *Spilanthes eurycarena* A.H. Moore, *Spilanthes micralloeophylla* A.H. Moore
Ref.: Jansen, 1985.
Diagnosis: Hierba erecta, raíces nunca naciendo en los nudos; capítulos grandes; aquenios ciliados en el margen; papus con dos aristas ciliadas cortas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos
Distrito: PPA.
Partido: BAL, MHR, TAN.
Prov. limítrofe: CDB, PAM.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 17161* (LP).

9. ***Acmella pusilla*** (Hook. & Arn.) R.K. Jansen
Sin.: *Spilanthes americana* (L.f.) Hieron. var. *stolonifera* (DC.) A.H. Moore f. *longiinternodiata* A.H. Moore, *Spilanthes pusilla* Hook. & Arn., *Spilanthes stolonifera* DC. var. *pusilla* (Hook. & Arn.) Baker
Ref.: Jansen, 1985; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne, rastrera; hojas lineares a lanceoladas; capítulos pedunculados, solitarios; aquenios glabros
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos
Distrito: PNE.
Partido: BER, ENS, IMG, SFR.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Tur 1156* (LP).

Acroptilon Cass., Cardueae

10. ***Acroptilon repens*** (L.) DC.
Sin.: *Centaurea picris* Pall. ex Willd., *Centaurea repens* L.
Ref.: Ibarra y La Porte, 1944; Parodi, 1956; Cabrera, 1963, 1971; Covas, 1965; Dostál, 1976a; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b.
Diagnosis: Hierba rizomatosa, tomentosa; hojas basales pinnatilobuladas, las apicales linear-lanceoladas, dentadas; capítulos solitarios aparojados; flores tubulosas, lilas; papus caduco
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados
Distrito: PEC, PMT.
Partido: PAT.
Prov. limítrofe: PAM, RNG.
Uso: Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera & Fabris 14872* (LP).

Adenostemma Forst., Eupatorieae

11. ***Adenostemma brasilianum*** (Pers.) Cass.
Sin.: *Adenostemma triangularis* DC., *Adenostemma viscosum* Auct., non J.R.Forst. & G.Forst., *Adesnotemma viscosum* J.R.Forst. & G.Forst. var. *brasilianum* (Pers.) Benth., *Adenostemma viscosum* J.R.Forst. & G.Forst. var. *triangulare* (DC.) Benth., *Verbescina brasiliana* Pers.
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954.
Diagnosis: Hierba anual, glabra o glandulosa; hojas triangulares; flores numerosas, blanco amarillentas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares húmedos y sombríos
Distrito: PET, PNE.
Partido: ENS, IMG.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 2148* (LP).

Ageratum L., Eupatorieae

12. ***Ageratum conyzoides*** L.
N. Vulgar: Chuva
Sin.: *Ageratum hirtum* Lam., *Ageratum hirsutum* Poir., *Carelia conyzoides* (L.) Kuntze
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1978.
Diagnosis: Hierba anual, hirsuta; hojas ovadas, crenadas; flores liláceas o blancas
Status: Nativa; Maleza
Categoría: NT.
Ecología: En suelos modificados
Distrito: PET.
Partido: BZT.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Valdivieso s.n. IV-1931* (LP).



007



010

008



011

009

012

Ambrosia L., Heliantheae

13. *Ambrosia elatior* L.

N. Vulgar: Ajenjo del campo, Altamisa, Altramisa, Artamisa
Sin.: *Ambrosia artemiaefolia* L., *Ambrosia chilensis* Hook. & Arn., *Ambrosia peruviana* Cabrera, hom. illeg.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hierba anual, pubescente; hojas basales pinnatisectas, las apicales lanceoladas; capítulos en racimos; pseudofrutos con rostro corto rodeado por cuatro puntas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En la ribera platense
Distrito: PNE.
Partido: BAR, SPD.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: Alucinógena; Medicinal
Ejemplar examinado: *Sáenz 1538* (LP, SI).

14. *Ambrosia scabra* Hook. & Arn.

Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne, escabrido-tuberculada; hojas pinnatisectas; capítulos en racimos; pseudofrutos rugosos, con rostro corto, sin puntas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos húmedos
Distrito: PNE.
Partido: BAR, ENS, SFR.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Fabris et al., 2493* (LP).

15. *Ambrosia tenuifolia* Spreng.

N. Vulgar: Ajenjo del campo, Altamisa, Altramisa, Artamisa, Artemisa, Saltamisa
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne, hirsuta; hojas pinnatisectas; capítulos en racimos; pseudofrutos con rostro y cinco puntas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En terrenos baldíos y ambientes modificados
Distrito: PEC, PET, PMT, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: Ampliamente distribuida
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 151* (LP).

Anthemis L., Anthemideae

16. *Anthemis cotula* L.

N. Vulgar: Bicho colorado, Manzanilla bastarda, Manzanilla cimarrona, Manzanilla de perro, Manzanilla de zorro, Manzanilla del campo, Manzanilla salvaje, Manzanillón, Sacha manzanilla
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978; Moore, 1983; Bremer & Humphries, 1993; Sáenz, 1996; Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba anual, aromática; hojas obovadas, 2-3 pinnatisectas; capítulos solitarios, pedunculados; flores del margen liguladas, blancas, las del disco tubulosas, amarillas; papus ausente
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes ruderales y asociadas a las vías férreas y caminos
Distrito: PEC, PET, PNE, PMT, PPA, PPO, PPR.
Partido: AVE, AZU, BAL, BBL, BOL, CHM, GJM, GLV, GPU, GVL, IMG, LIN, LPT, LUJ, LZA, MAG, MAI, MRN, OLA, PAT, PEL, PER, QUI, SAA, SAR, SFR, SPD, SVT, TAN, TRQ, VGS, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Alimenticia; Insecticida; Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 590* (LP).

Arctium L., Cardueae

17. *Arctium minus* (Hill) Bernh.

N. Vulgar: Bardana, Lampaso
Sin.: *Lappa glabra* Lam., *Lappa minor* Hill.
Ref.: Ruiz Leal & Roig, 1961; Cabrera, 1963, 1971, 1974; Webb et al., 1988; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b; Troiani & Steibel, 1999.
Diagnosis: Hierba bienal; hojas ovado-oblongas; capítulos en racimos; filarios ganchudos; flores violáceas, 5-dentadas; papus formado por cerdas cortas
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En terrenos baldíos y ambientes modificados
Distrito: PNE, PPA, PPR.
Partido: BBL, GPU, LPT, PER, SFR, SID, VMA.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 149* (LP).

Arctotheca Wendl., Arctoteae

18. *Arctotheca calendula* (L.) Levyns

Sin.: *Arctotis calendula* L., *Arctotis calendulacea* L., *Cryptostemma calendula* (L.) Druce, *Cryptostemma calendulaceum* (L.) R. Br.
Ref.: Cabrera, 1963; Webb *et al.*, 1988; Ariza Espinar & Delucchi, 1998a.
Diagnosis: Hierba anual, glanduloso pubescente; hojas lirado-pinnatisectas; capítulos solitarios, pedunculados; flores amarillas, dimorfas; aquenios lanosos; papus escamoso.
Status: Adventicia, accidental
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados
Distrito: PNE.
Partido: AVE.
Uso: Ornamental
Ejemplar examinado: *Cabrera 952* (LP).

013



016

014

017



015



018

Artemisia L., Anthemideae

19. *Artemisia absinthium* L.
N. Vulgar: Ajenco, Ajenjo,
Ref.: Cabrera, 1963, 1971; Moore, 1983; Bremer & Humphries, 1993; Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Subarbusto pubescente; hojas 2-3 pinnatisectas; capítulos en panículas estrechas; flores del margen tubulosas, las del disco tubuloso-acampanadas; papus ausente
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En parques y jardines
Distrito: PPA, PPR.
Partido: TAN.
Prov. limítrofe: DF.
Uso: Aromática; Condimento; Medicinal
Ejemplar examinado: *Job 1330* (LP).

20. *Artemisia annua* L.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Bremer & Humphries, 1993; Ariza Espinar, 1997; Troiani & Steibel, 1999.
Diagnosis: Hierba anual glabra o pubescente; hojas 3-pinnatisectas; capítulos en panojas; flores del margen tubuloso-filiformes, las del disco tubulosas; papus ausente
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En cultivos y ambientes modificados
Distrito: PNE, PPO, PPR.
Partido: CSM, LIN, LPT, PER, SVT.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM.
Uso: Aromática
Ejemplar examinado: *LPS 13106* (LP).

21. *Artemisia verlotiorum* Lamotte
N. Vulgar: Ajenjo silvestre, Pronto alivio, Sanalotodo, Yuyo de San Vicente
Ref.: Cabrera, 1963, 1971; Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Sufrútice; hojas lanceoladas, partidas hacia abajo; capítulos en racimos o panojas; flores del margen filiformes, las del disco tubulosas; papus ausente
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En cultivos y ambientes modificados
Distrito: PNE, PPA, PPR.
Partido: AVE, BER, BZT, CHA, ESC, GPU, GSM, LPT, MRN, PER, TFB.
Prov. limítrofe: CDB, DF, PAM, RNG, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 866* (LP).

Aspilia Thouars., Heliantheae

22. *Aspilia pascalioides* Griseb.
Sin.: *Wedelia pascalioides* (Griseb.) B.L. Turner
Ref.: Cabrera, 1974; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne, estrigoso pubescente; hojas lanceoladas; capítulos solitarios; papus formado por una coronita de escamas soldadas y ocasionalmente dos aristas cortas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En zonas costeras y bosques ribereños
Distrito: PNE.
Partido: BAR, ENS.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 1325* (LP).

23. *Aspilia silphioides* (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f.
Sin.: *Gymnopsis helianthoides* DC., *Leighia silphioides* Hook. & Arn., *Wedelia silphioides* (Hook. & Arn.) B.L. Turner
Ref.: Cabrera, 1974; Cabrera & Zardini, 1978; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Sufrútice híspido; hojas ovadas; capítulos solitarios o hasta en número de tres; papus formado por una coronita de escamas soldadas y dos aristas cortas.
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En zonas costeras y bosque ribereños
Distrito: PET, PNE.
Partido: BAR, ENS, IMG, MAG, SFR, SID, SPD, ZAR.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Sáenz 1540* (LP, SI).

Aster L., Astereae

24. *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron.
N. Vulgar: Mata negra
Sin.: *Aster divaricatus* Baker, hom. illeg., *Aster exilis* Ell. var. *australis* A. Gray, *Aster linifolius* Griseb. hom. illeg., *Aster moelleri* (Phil.) Reiche, *Aster subtropicus* Morong, *Baccharis asteroides* Colla, *Conyza squamata* Spreng., *Conyza berteroana* Phil., *Conyzanthus squamatus* (Spreng.) Tamamsch., *Erigeron depilis* Phil., *Erigeron semiamplexicaule* Meyen, *Symphyotrichum graminifolium* (Spreng.) G. L. Nesom, *Tripolium conspicuum* J.Remy, *Tripolium moelleri* Phil., *Tripolium oliganthum* Phil., *Tripolium subulatum* Nees var. *brasilianum* DC.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978; Nesom, 1994b.
Diagnosis: Hierba erecta, glabra; hojas obovadas, angostas; capítulos pequeños, en panojas; aquenios cortamente pubescentes
Status: Nativa; Maleza
Categoría: NT.
Ecología: En praderas ribereñas y estepas arenosas
Distrito: PET, PMT, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: BBL, CAS, CHM, CLR, CSZ, ENS, GLV, GPU, IMG, LBR, LPT, MHR, MRL, PAT, PEL, SFR, SNC, TAN, TOR, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 6984* (LP).



019

022



020

023

021



024

25. *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron. var. ***graminifolius*** (Spreng.) Hieron.
Sin.: *Aster divaricatus* Baker var. *graminifolius* (Spreng.) Baker, *Conyza graminifolia* Spreng., *Symphyotrichum graminifolium* (Spreng.) Nesom
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; G.L. Nesom, 1994b.
Diagnosis: Hierba glabra; hojas graminiformes; capítulos en panojas; aquenios subglabros
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En terrenos húmedos
Distrito: PET.
Partido: ENS.
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: Artesanías
Ejemplar examinado: *Cabrera 206* (LP).

BACCHARIDASTRUM CABRERA, ASTEREAE

26. *Baccharidastrum argutum* (Less.) Cabrera
Sin.: *Baccharis breviseta* DC., *Conyza arguta* Less.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974.
Diagnosis: Sufrútice; hojas lineares, sésiles; capítulos en cimas corimbiformes compuestas
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En selvas ribereñas
Distrito: PNE.
Partido: BER, ENS.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 858* (LP).

27. *Baccharidastrum triplinervium* (Less.) Cabrera
N. Vulgar: Yerba santa
Sin.: *Baccharis pseudoserrulata* I.L. Teodoro, *Baccharis serrulata* DC., hom. illeg., *Baccharis vulneraria* Baker, *Conyza triplinervia* Less.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974.
Diagnosis: Sufrútice; hojas ovadas, pecioladas; capítulos en cimas corimbiformes compuestas
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En selvas ribereñas
Distrito: PNE.
Partido: DEL, ENS.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 10642* (LP).

BACCHARIS L., ASTEREAE

28. *Baccharis albida* Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera, 1974.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas lineares, levemente discoloras; capítulos en cimas corimbiformes compuestas
Status: Nativa
Categoría: V.
Ecología: En pajonales
Distrito: PNE.
Partido: SNC.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Burkart 15643* (LP).

29. *Baccharis artemisioides* Hook. & Arn.
N. Vulgar: Mío-mío blanco, Pichana blanca, Romerillo, Romerillo blanco, Romerillo malo
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974; Ariza Espinar, 1973.
Diagnosis: Arbusto; hojas lineares, discoloras; capítulos en panículas foliosas amplias
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En estepas climax y pastizales serranos
Distrito: PEC, PPA, PPO, PPR.
Partido: BBL, CHA, CLR, CSZ, LBR, LIN, MHR, OLA, PAT, TAY, TRQ, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: ♀ : *Carette s.n.* (LP); ♂ : *Chicchi 27* (LP).

30. *Baccharis articulata* (Lam.) Pers.

N. Vulgar: Carqueija, Carqueja, Carqueja blanca, Carqueja crespa, Carquejilla
Sin.: *Conyza articulata* Lam., *Molina articulata* (Lam.) Less., *Pingraea articulata* (Lam.) F.H. Hellwig.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978; Ariza Espinar, 1973.
Diagnosis: Arbusto; tallos con dos alas angostas; hojas muy reducidas; capítulos en racimos de espigas de glomérulos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En estepas clímax y pastizales serranos
Distrito: PPA, PPR.
Partido: BAL, BZT, CSZ, GPU, IMG, LPT, PUA, SAA, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, SFE.
Uso: Medicinal; Forrajera
Ejemplar examinado: ♀ : *Fabris & Schwabe 4860* (LP); ♂ : *Cabrera 7242* (LP).



025

028

026



029



027



030

31. *Baccharis caprariifolia* DC.
Sin.: *Baccharis grisea* Baker, *Baccharis recurvata* Gardner
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Barroso, 1976.
Diagnosis: Arbusto; hojas obovado-oblongas; capítulos en espigas foliosas
Status: Nativa
Categoría: V.
Ecología: En pajonales
Distrito: PNE.
Partido: DEL.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Jozami 242* (LP); ♂ : *Scala s.n.* (LP).

32. *Baccharis cordobensis* Heering
Sin.: *Baccharis rotundifolia* Spreng. var. *stuckertii* Heering, *Baccharis sessiliflora* Vahl. var. *stuckertii* (Heering) Cabrera.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Ariza Espinar, 1973.
Diagnosis: Arbusto; hojas elípticas u obovadas; capítulos en falsos racimos de glomérulos foliosos
Status: Nativa
Categoría: EX.
Ecología: En suelos secos
Distrito: PPO, PPR.
Partido: CHA, TLQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Sin colector* (LPS 11486 en LP); ♂ : *LPS 11487* (LP).

33. *Baccharis coridifolia* DC.
N. Vulgar: Ajenjo del campo, Mío-mío, Nío, Ñío-ñío, Romerillo
Sin.: *Eupatorium montevidense* Spreng.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978; Ariza Espinar, 1973.
Diagnosis: Arbusto; hojas lineares; capítulos en panículas foliosas amplias
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En estepas clímax y pastizales serranos
Distrito: PPA, PPO, PPR.
Partido: BAL, BJZ, CHA, GPU, GUA, LBR, LIN, LPT, OLA, SAQ, SNC, TAN, TLQ, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, SFE.
Uso: Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: ♀ : *Cabrera 6974* (LP); ♂ : *Job 1810* (LP).

34. *Baccharis crispa* Spreng.
N. Vulgar: Carqueija, Carqueja, Carqueja crespa, Carquejilla
Sin.: *Baccharis cylindrica* (Less.) DC., *Baccharis genistelloides* Pers. var. *crispa* (Spreng.) Baker; *Baccharis genistelloides* Pers. var. *cylindrica* (Less.) Baker, *Baccharis perplexa* I.L. Teodoro & J.E. Vidal, *Molina crispa* (Spreng.) Less., *Molina cylindrica* Less., *Pingraea crispa* (Spreng.) F.H. Hellwig.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971; Ariza Espinar, 1973; Barroso, 1976.
Diagnosis: Arbusto; tallos con tres alas anchas y onduladas; hojas muy reducidas; capítulos en espigas de glomérulos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos secos
Distrito: PEC, PPA, PPO.
Partido: BBL, CLR, CSZ, MHR, PAT, SAA, TAY, TLQ, TRQ, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, RNG, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: ♀ : *Sin colector* (LPS 11494 en LP); ♂ : *Proyecto Ventania 93* (LP).

35. *Baccharis darwinii* Hook. & Arn.
Sin.: *Baccharis angulata* Griseb., *Baccharis angulata* Griseb. var. *andina* Hieron., *Baccharis grossedentata* Heering, *Baccharis ulicina* Hook. & Arn. var. *subintegrifolia* Kuntze, *Neomolina darwinii* (Hook. & Arn.) F.H. Hellwig
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974; Ariza Espinar, 1973.
Diagnosis: Sufrútice; hojas lineares; capítulos solitarios o en cimas corimbiformes simples
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos secos
Distrito: PMT, PPA.
Partido: MHR, PAT.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Cabrera & Fabris 14871* (LP); ♂ : *Spegazzini s.n.* (LPS11455 en LP).

36. *Baccharis divaricata* Hauman
Ref.: Cabrera, 1963, 1971.
Diagnosis: Arbusto; hojas muy reducidas; capítulos en panículas amplias
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En suelos arenosos
Distrito: PMT, PPA.
Partido: CLR, MHR, PAT.
Prov. limítrofe: RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Cabrera & Fabris 14908* (LP); ♂ : *Eskuche 01-20* (LP).



031



034



032



035



033



036

37. *Baccharis genistifolia* DC.
Ref.: Cabrera, 1963; Ariza Espinar, 1973.
Diagnosis: Sufrútice; hojas basales lineares, las apicales muy reducidas; capítulos en panículas de glomérulos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos secos o arenosos
Distrito: PET, PPA, PPO, PPR.
Partido: BAL, BJZ, CST, ESC, GAL, GJM, GLV, GPU, JUN, LBR, MHR, NEC, PMR, SAQ, TAN, TAY, VGS.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: ♀ : *Bottino 452* (LP); ♂ : *Cabrera 8535* (LP).

38. *Baccharis gilliesii* A. Gray
N. Vulgar: Mata trigo
Sin.: *Baccharis icma* Stuck. ex Heering, *Baccharis involucrata* (Phil.) O. Hoffm., *Baccharis nana* D. Don ex Baker, *Baccharis paucidentata* DC. var. *ß* Hook. & Arn., *Icma involucrata* Phil.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974; Ariza Espinar 1973.
Diagnosis: Sufrútice; hojas lineares; capítulos solitarios, sésiles
Status: Nativa; Maleza
Categoría: NT.
Ecología: En suelos secos o arenosos
Distrito: PEC, PMT, PPA, PPO.
Partido: AAL, BBL, CLR, PAT, TRQ, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Dawson 3232* (LP); ♂ : *Birabén & Birabén 338* (LP).

39. *Baccharis gnaphalioides* Spreng.
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Sufrútice rastrero o ascendente; hojas lineares, discoloras; capítulos en cimas corimbiformes simples o compuestas
Status: Nativa
Categoría: V.
Ecología: En pastizales serranos
Distrito: PPA.
Partido: BAL.
Provincia limítrofe: No existen referencias. Representada en Uruguay
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ y ♂ : *Krapovickas 3435* (LP).

40. *Baccharis juncea* (Lehm.) Desf.
Sin.: *Arrhenachne juncea* Cass., *Baccharis subulata* D. Don ex Hook. & Arn., *Stephananthus junceus* Lehm.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978; Ariza Espinar, 1973.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas lineares; capítulos solitarios o en cimas corimbiformes simples
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos, algo salobres
Distrito: PET, PPA, PPO, PPR.
Partido: BBL, CHM, CST, GAL, GJM, GLV, GPU, LBR, MHR, NEC, PIN, PMR, RIV.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Ringuelet 280* (LP); ♂ : *Ringuelet 274* (LP).

41. *Baccharis medullosa* DC.
N. Vulgar: Chilca, Suncho
Sin.: *Baccharis medullosa* DC. var. *latifolia* Hieron. ex Heering, *Baccharis prenanthoides* Baker p.p., *Baccharis serrulata* Baker p.p.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978; Ariza Espinar, 1973; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas ovadas; capítulos en cimas corimbiformes compuestas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos
Distrito: PET, PNE.
Partido: BER, DEL, IMG, LPT.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Cabrera 171* (LP); ♂ : *Cabrera 123* (LP).

42. *Baccharis melanopotamica* Speg.
Sin.: *Baccharis dusenii* O. Hoffm.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971; Ariza Espinar, 1973.
Diagnosis: Sufrútice; hojas angostamente elípticas u obovadas; capítulos solitarios o en cimas corimbiformes simples
Status: Nativa
Categoría: V.
Ecología: En suelos secos
Distrito: PEC, PMT.
Partido: PAT, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Spegazzini s.n.* (LPS 11457 en LP).



037



040



038

041

039



042

43. *Baccharis microcephala* (Less.) DC.
N. Vulgar: Carqueija, Carqueja
Sin.: *Baccharis microptera* Baker, *Molina microcephala* Less.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Barroso, 1976.
Diagnosis: Arbusto; tallos con tres alas angostas; hojas muy reducidas; capítulos en espigas de glomérulos
Status: Nativa
Categoría: K.
Ecología: En pajonales
Distrito: PNE.
Partido: DEL.
Prov. limítrofe: DF, ERI, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Parodi 8185** (PARODI).

44. *Baccharis notosergila* Griseb.
N. Vulgar: Carqueija, Carqueja
Sin.: *Baccharis curtifolia* S. Moore, *Baccharis genistifolia* DC. var. *ß* Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Ariza Espinar, 1973.
Diagnosis: Arbusto; hojas basales lineares, las apicales muy reducidas; capítulos en panículas amplias
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos secos o ligeramente húmedos
Distrito: PET, PNE, PPR.
Partido: CAM, CSM, ESC, IMG, LPT, MAG, SNC.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: Medicinal; Fabricación de escobas
Ejemplar examinado: ♀ : *Cabrera 769* (LP); ♂ : *Cabrera 7479* (LP).

45. *Baccharis penningtonii* Heering
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Arbusto; tallos con tres alas angostas; hojas muy reducidas; capítulos en racimos de espigas de glomérulos
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En pajonales
Distrito: PNE.
Partido: DEL, ENS, IMG, TIG.
Prov. limítrofe: DF, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Cabrera 1508* (LP); ♂ : *Burkart 2016* (LP).

46. *Baccharis phyteuma* Heering
Ref.: Cabrera, 1963, 1974.
Diagnosis: Sufrútice; hojas angostamente elípticas; capítulos en espigas de glomérulos
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En pajonales
Distrito: PNE.
Partido: DEL, SID, TIG.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Cabrera 4888* (LP); ♂ : *Sin colector* (LPS 16977 en LP).

47. *Baccharis phyteumoides* (Less.) DC.
Sin.: *Molina phyteumoides* Less.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974.
Diagnosis: Sufrútice; tallos con tres alas angostas; hojas estrechamente elípticas; capítulos en espigas de glomérulos
Status: Nativa
Categoría: V.
Ecología: En pajonales
Distrito: PNE.
Partido: CSM, ENS, TIG.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Gautier 5563* (LP).

48. *Baccharis pingraea* DC.
Sin.: *Baccharis angustifolia* Desf., hom. illeg., *Baccharis pingraea* DC. f. *latifolia* DC., *Baccharis serrulata* Pers. var. *pingraea* (DC.) Baker, *Baccharis subpingraea* Heering, *Conyza montevidensis* Spreng.; *Pingraea angustifolia* Cass.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978; Ariza Espinar, 1973.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas angostamente ovadas; capítulos en cimas corimbiformes compuestas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos
Distrito: PET, PNE, PPA, PPR.
Partido: AVE, BBL, BER, CAM, CAÑ, CHA, DEL, GAL, GJM, IMG, ITU, JUN, LPT, LZA, MAG, MRN, PIN, SNC.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: ♀ : *Ruiz Leal 15312* (LP); ♂ : *Pochettino 4* (LP).

043



044



045



046

047

048

49. *Baccharis pingraea* DC. f. ***angustissima*** DC.
Sin.: *Baccharis subpingraea* Heering f. *crassifolia* Heering
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Ariza Espinar, 1973.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas lineares; capítulos en cimas corimbiformes compuestas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos o arenosos
Distrito: PEC, PET, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: BBL, CAM, CLR, CST, DEL, GAL, GJM, GVL, LBR, LZA, MAG, MHR, PIN, SAD, SAQ, TAY, TOR, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Bridarolli 2721* (LP); ♂ : *Ringuelet 350* (LP).

50. *Baccharis punctulata* DC.
N. Vulgar: Chilca
Sin.: *Baccharis amygdalina* Griseb., *Baccharis melastomifolia* Hook. & Arn., *Baccharis oxyodonta* DC. var. *punctulata* (DC.) Baker, *Pingraea punctulata* (DC.) F.H. Hellwig
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978; Ariza Espinar 1973; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Arbusto; hojas elípticas u ovado-elípticas, discoloras; capítulos en panículas foliosas de cimas corimbiformes
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos
Distrito: PET, PNE, PPR.
Partido: DEL, ENS, IMG, LPT, LZA, QUI, SID.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Cabrera 10638* (LP); ♂ : *Cabrera 10646* (LP).

51. *Baccharis rufescens* Spreng.
Sin.: *Baccharis baldwinii* Hook. & Arn., *Baccharis denticulata* D. Don ex DC., *Baccharis fluminensis* Glaz. ex I.L. Teodoro, *Baccharis paucidentata* DC., *Baccharis rufescens* Spreng. var. *subrufescens* (Heering) Ariza, *Baccharis subrufescens* Heering
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, Ariza Espinar, 1973.
Diagnosis: Arbusto; hojas angostamente obovadas o lineares, con 1-4 pares de dientes en el margen; capítulos en falsos racimos de glomérulos foliosos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos secos o rocosos
Distrito: PEC, PPA, PPO.
Partido: CLR, CSZ, GAL, IMG, LBR, MHR, PAT, SAQ, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Tóxica
Ejemplar examinado: ♀ : *Job 1750* (LP); ♂ : *Cabrera 21847* (LP).

52. *Baccharis rufescens* Spreng. var. ***ventanicola*** Cabrera
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Arbusto; hojas angostamente lineares, con un par de dientes en el margen; capítulos en falsos racimos de glomérulos
Status: Endémica
Categoría: NT.
Ecología: En pastizales serranos
Distrito: PPA.
Partido: CSZ, SAA, TRQ.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Pertusi 313* (LP); ♂ : *Pertusi 316* (LP).

53. *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers.
N. Vulgar: Chilca, Chilca amarga, Chilca dulce, Chirca, Jarilla, Jarilla del río, Junco, Suncho, Vara dulce, Yuno
Sin.: *Baccharis alamanii* DC., *Baccharis caerulescens* DC., *Baccharis farinosa* Spreng., *Baccharis glutinosa* Pers., *Baccharis iresinoides* Kunth, *Baccharis lanceolata* Kunth, *Baccharis* lanceolata Kunth, emend. Heering, *Baccharis linifolia* DC., hom. illeg., *Baccharis longipes* Kunze ex DC., *Baccharis marginalis* DC., *Baccharis marginalis* DC. var. *longipes* (DC.) Heering ex Reiche, *Baccharis parviflora* (Ruiz & Pav.) Pers., *Baccharis purpurascens* Heering, *Baccharis viscosa* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Baccharis viscosa* (Ruiz & Pav.) Kuntze var. *nigricans* Kuntze, *Molina parviflora* Ruiz & Pav., *Molina salicifolia* Ruiz & Pav., *Molina striata* Ruiz & Pav., *Molina viscosa* Ruiz & Pav., *Pingraea salicifolia* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig, *Pingraea viscosa* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978; Ariza Espinar, 1973.
Diagnosis: Arbusto; hojas elípticas o casi lineares; capítulos en cimas corimbiformes compuestas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos o secos
Distrito: PEC, PNE, PPA, PPO.
Partido: BBL, ENS, IMG, LBR, LPT, MHR, PAT, SNC, TLQ, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Alimenticia; Ictiotóxica; Medicinal
Ejemplar examinado: ♀ : *Cabrera 9915* (LP); ♂ : *Cabrera 4328* (LP).

54. *Baccharis spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) J. Remy
N. Vulgar: Escoba, Pichana
Sin.: *Baccharis sarophora* Phil., *Heterothalamus spartioides* Hook. & Arn. ex DC., *Pseudobaccharis spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera, *Psila spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera
Ref.: Cabrera, 1963, 1971.
Diagnosis: Arbusto; hojas basales lineares, las apicales muy reducidas; capítulos en cimas corimbiformes simples
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos secos o arenosos
Distrito: PEC, PMT, PPA, PPO.
Partido: BBL, CLR, MHR, PAT, PEL, TAY, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, RNG.
Uso: Aromática; Insecticida; Fabricación de escobas
Ejemplar examinado: ♀ : *Eskuche 648-15* (LP); ♂ : *Job 1594* (LP).

049

052



050



053



051



054

55. *Baccharis spicata* (Lam.) Baill.
Sin.: *Baccharis attenuata* D. Don ex Hook. & Arn., *Baccharis platensis* Spreng., *Eupatorium spicatum* Lam.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Ariza Espinar, 1973.
Diagnosis: Sufrútice; hojas lineares; capítulos en espigas de glomérulos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En pajonales, estepas clímax y pastizales serranos
Distrito: PET, PNE, PPA, PPR.
Partido: BZT, CSM, ESC, GLV, IMG, LPT, LUJ, SNC, TAN, TFB.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Lanfranchi 511* (LP); ♂ : *Cabrera 765* (LP).

56. *Baccharis stenophylla* Ariza
Sin.: *Baccharis subpingraea* Heering f. *nana* Heering, *Baccharis subpingraea* Heering f. *pseudoulicina* Heering
Ref.: Ariza Espinar, 1973; Cabrera & Zardini, 1978; Troiani, 1985.
Diagnosis: Hierba perenne, baja, flexuosa; hojas lineares; capítulos en cimas corimbiformes compuestas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos húmedos y pastizales serranos
Distrito: PEC, PMT, PPA, PPR.
Partido: AVE, CHA, CLR, GPU, JUN, LBR, LPT, PAT, SAQ, TAY, TOR, TRQ, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀: *Villamil & Cazzaniga 5069* (LP); ♂ : *Cabrera 771* (LP).

57. *Baccharis tandilensis* Speg.
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Arbusto; hojas elípticas o angostamente obovadas; capítulos en racimos foliosos
Status: Endémica
Categoría: R.
Ecología: En pastizales serranos
Distrito: PPA.
Partido: BAL, GPU, TAN.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Boffa 341* (LP); ♂ : *Torres 1113* (LP).

58. *Baccharis tenella* Hook. & Arn.
Sin.: *Heterothalamus tenellus* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Pseudobaccharis tenella* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Psila tenella* (Hook. & Arn.) Cabrera
Ref.: Cabrera, 1963, 1971.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas lineares; capítulos solitarios, pedunculados
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En suelos secos
Distrito: PEC, PMT, PPA.
Partido: CLR, PAT, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Cabrera & Fabris 16503* (LP); ♂ : *Cabrera 4796* (LP).

59. *Baccharis triangularis* Hauman
Sin.: *Baccharis trimera* (Less.) DC. var. *viscosissima* Speg.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971; Ariza Espinar, 1973.
Diagnosis: Sufrútice; tallos con tres alas angostas; hojas muy reducidas; capítulos solitarios, sésiles
Status: Nativa
Categoría: V.
Ecología: En suelos secos o arenosos
Distrito: PEC, PPA.
Partido: PAT, TRQ, VIL.
Prov. limítrofe: PAM, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀: Villamil & Cazzaniga 5643 (LP); ♂: *Molfino & Clos 46261* (LP).

60. *Baccharis tridentata* Vahl
Sin.: *Baccharis affinis* (DC), *Baccharis subopposita* var. *affinis* (DC) Baker, *Baccharis tweediei* Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978; Ariza Espinar, 1973; Barroso, 1976.
Diagnosis: Arbusto; hojas obovadas u obovado-espatuladas; capítulos en cimas corimbiformes simples o compuestas
Status: Nativa
Categoría: V.
Ecología: En estepas climax y pastizales serranos
Distrito: PPA, PPR.
Partido: BAL, JUN, TAN.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: ♀ : *Pedersen 1070* (LP); ♂ : *Frangi 380* (LP).

055



058

056



059

057



060

61. *Baccharis trimera* (Less.) DC.
N. Vulgar: Carqueja
Sin.: *Baccharis genistelloides* Pers. var. *trimera* (Less.) Baker, *Molina trimera* Less.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978.
Diagnosis: Sufrútice; tallos con tres alas anchas; hojas muy reducidas; capítulos en espigas de glomérulos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En estepas clímax y pastizales serranos
Distrito: PEC, PPA, PPR.
Partido: BZT, CHA, IMG, LPT, MAG, PAT, TAY, TRQ.
Prov. limítrofe: ERI, PAM.
Uso: Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: ♀ : *Cabrera 1688* (LP); ♂ : *Cabrera 6337* (LP).

62. *Baccharis ulicina* Hook. & Arn.
N. Vulgar: Pichana de oveja, Yerba de la oveja
Sin.: *Baccharis pinnatifida* Klatt, *Baccharis strobeliana* Ces., *Baccharis ulicina* Hook. & Arn. var. *multifida* (Griseb.) Kuntze, *Neomolina ulicina* (Hook. & Arn.) F.H. Hellwig, *Vittadinia multifida* Griseb.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978; Ariza Espinar, 1973.
Diagnosis: Sufrútice; hojas pinnatisectas; capítulos en cimas corimbiformes simples o compuestas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos secos
Distrito: PEC, PMT, PPA, PPO.
Partido: AAL, BBL, CLR, CSZ, HYR, MHR, PAT, PUA, SAQ, SPD, TAY, TLQ, TRQ, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Tóxica
Ejemplar examinado: ♀ : *LPS 17065* (LP); ♂ : *Cabrera & Fabris 59* (LP).

Berroa Beauverd, Inuleae

63. *Berroa gnaphalioides* (Less.) Beauverd
Sin.: *Gnaphalium gnaphalioides* (Less.) Kuntze, *Lucilia argentea* Hook. & Arn., *Lucilia gnaphalioides* Less.
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba perenne, decumbente, pubescente; hojas espatuladas, conduplicadas, plateadas; flores blanco-crema
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En pedregales estériles y praderas altas y húmedas
Distrito: PPA, PPR.
Partido: AVE, BAL, CSZ, ESC, GLV, GPU, IMG, LBR, LPT, OLA, SAA, SVT, TRQ.
Prov. limítrofe: ERI, CDB.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Fabris 2625* (LP).

Bidens L., Heliantheae

64. *Bidens aurea* (Aiton) Sherff
Sin.: *Coreopsis aurea* Aiton
Ref.: Montes et al., 1993.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas lanceoladas; capítulos en cimas corimbiformes; papus de dos aristas con cilias retrorsas
Status: Naturalizada
Categoría: NT.
Ecología: En lugares pantanosos, a orillas de ríos
Distrito: PNE, PPA.
Partido: BAL, GPU, SID.
Prov. limítrofe: No existen referencias
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Montes & Cerano 983* (SI).

65. *Bidens laevis* (L.) Britton, Stern & Poggenb.
Sin.: *Bidens chrysanthemoides* Michx., *Bidens helianthoides* Kunth, *Helianthus laevis* L.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978; Cabrera & Zardini, 1978; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas lanceoladas; capítulos 2-4 largamente pedunculados; flores liguladas amarillas; papus de 2-4 aristas con cilias retrorsas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En las orillas de ríos y lugares pantanosos
Distrito: PET, PNE, PPA.
Partido: BAR, CAS, ENS, GAL, GJM, GPU, IMG, MAG, SFR, TAN.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Hurrell et al. 2880* (LP).

66. *Bidens pilosa* L.
N. Vulgar: Amor de viejo, Amor seco, Saetilla
Sin.: *Bidens californica* DC., *Bidens hirsuta* Nutt., *Bidens leucantha* Willd. f. *discoidea* Sch. Bip., *Bidens leucantha* Willd. var. *pilosa* (L.) Griseb., *Bidens montaubanii* Phil., *Bidens pilosa* L. var. *discoidea* Sch. Bip., *Bidens reflexa* Link
Ref.: Cabrera, 1963; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Hierba anual; hojas pinnatisectas; capítulos en cimas corimbiformes; flores isomorfas tubulosas o semi-liguladas; papus de 2-3 aristas con cilias retrorsas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En terrenos baldíos; ruderal
Distrito: PEC, PET, PMT, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: Ampliamente distribuida
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, SFE.
Uso: Alimenticia; Forrajera; Medicinal
Ejemplar examinado: *Sáenz 1425* (LP, SI).



061

064



062



065



063



066

67. *Bidens pilosa* L. var. ***minor*** (Blume) Sherff
Sin.: *Bidens hispida* Kunth, *Bidens leucantha* Willd. var. *sundaica* (Blume) Hassk., *Bidens pilosa* L. var. *brevifoliata* Hieron., *Bidens pilosa* L. var. *dubia* (Cass.) O.E. Schulz, *Bidens sundaica* Blume, *Bidens sundaica* Blume var. *minor* Blume
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne; flores dimorfas, las del margen liguladas, blancas o amarillentas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En terrenos baldíos; ruderal
Distrito: PEC, PET, PMT, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: Ampliamente distribuida
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 14282* (LP).

68. *Bidens subalternans* DC.
N. Vulgar: Amor seco, Amor viejo
Sin.: *Bidens platensis* Manganaro, *Bidens quadrangularis* DC.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hierba anual; hojas pinnatisecta ó 2-pinnatisectas con segmentos lanceolados; capítulos en cimas corimbiformes; papus de 4 aristas con cilias retrorsas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En terrenos baldíos; ruderal
Distrito: PEC, PET, PMT, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: Ampliamente distribuida
Prov. limítrofe: ERI, PAM, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Clos 2251* (LP).

69. *Bidens subalternans* DC. var. ***simulans*** Sherff
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hojas pinnatisectas con segmentos lineares a linear-lanceolados
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En terrenos baldíos; ruderal
Distrito: PEC, PET, PMT, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: Ampliamente distribuida
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Pedersen 8262* (SI).

Brachyclados D. Don, Mutisieae

70. *Brachyclados lycioides* D.Don
Sin.: *Baucis lavandulifolia* Phil., *Brachyclados involutus* Kuntze, *B. lycioides* D.Don var. *microcephala* Hieron., *B. macrocephalus* Kuntze
Ref.: Cabrera, 1971; Katinas, 1996a.
Diagnosis: Arbusto; hojas lineares, revolutas, glabras; filarios laxamente pubescentes en el haz
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En estepas arbustivas
Distrito: PEC, PMT.
Partido: BBL, PAT, VIL.
Prov. limítrofe: PAM, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera & Fabris 14865* (LP).

71. *Brachyclados megalanthus* Speg.
Sin.: *Brachyclados lycioides* D.Don var. *macrocephala* Hieron.
Ref.: Cabrera, 1971; Katinas 1996a.
Diagnosis: Hierba; hojas oblongo-lanceoladas, revolutas, blanco-tomentosas en el envés; filarios lanosos en el haz
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En barrancas
Distrito: PMT.
Partido: PAT.
Prov. limítrofe: RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera & Fabris 14881* (LP).

Calendula L., Calenduleae

72. *Calendula arvensis* L.
N. Vulgar: Yerba china
Ref.: Hicken, 1910; Hauman, 1925; Cabrera, 1963, 1971; Meikle, 1976; Delucchi & Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba anual glanduloso-pubescente; hojas basales oblongas u oblanceoladas; capítulos solitarios; flores amarillas; aquenios moderadamente incurvados
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En terrenos baldíos, bordes de caminos y vías férreas
Distrito: PMT, PPA.
Partido: GPU, PAT.
Prov. limítrofe: RNG.
Uso: Condimento; Medicinal; Ornamental; Tintórea
Ejemplar examinado: *Cabrera 4534* (LP).



067



070

068



071

069



072

73. *Calendula officinalis* L.
N. Vulgar: Caléndula, Virreina
Ref.: Hicken, 1910; Cabrera, 1971; Delucchi & Ariza Espinar, 1997; Troiani & Steibel, 1999.
Diagnosis: Hierba anual o bienal, glandulosa; hojas basales oblanceoladas; las apicales oblongas; capítulos solitarios; flores amarillas o anaranjadas; aquenios fuertemente incurvados
Status: Adventicia; Escapada de cultivo
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes ruderales y arvenses
Distrito: PPA, PPR.
Partido: BER, BZT, GAL, GPU, LPT, MIR, OLA.
Prov. limítrofe: PAM, RNG.
Uso: Condimento; Medicinal; Ornamental; Tintórea
Ejemplar examinado: *Hicken 582* (SI).

Calyptocarpus Less., Heliantheae

74. *Calyptocarpus biaristatus* (DC.) H. Rob.
Sin.: *Blainvillea biaristata* DC., *Oligogyne magapotamica* DC., *Oligogyne synedrelloides* Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1978; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Hierba anual; hojas ovadas; capítulos cimosos; aquenios comprimidos; papus con dos aristas gruesas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares húmedos y en la ribera platense
Distrito: PET, PNE.
Partido: BER, BZT, ENS, IMG, MAG.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Zuloaga 106* (LP).

Carduus L. Cardueae

75. *Carduus acanthoides* L.
N. Vulgar: Cardo, Cardo chileno, Cardo negro, Cardo platense
Ref.: Parodi, 1926; Cabrera, 1963; 1974; Del Aguila, 1964; Kazmi, 1964; Novara, 1993; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b.
Diagnosis: Hierba anual espinosa, glabrescente; tallos alados; hojas pinnatífidas; capítulos pocos; flores púrpuras; papus piloso
Status: Naturalizada
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados, terrenos baldíos, caminos, vías férreas
Distrito: PET, PNE, PPA, PPR.
Partido: BAL, BER, CAM, CHM, ENS, ESC, FVL, GPU, JUN, LPT, LZA, MON, PIN, PMR, ROJ, SAD, TAN, TIG.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, SFE.
Uso: Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 174* (LP).

76. *Carduus pycnocephalus* L.
N. Vulgar: Cardo, Cardo crespo
Ref.: Parodi, 1926; Cabrera, 1963, 1974; Webb *et al.*, 1988; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b.
Diagnosis: Hierba anual o bienal, espinosa; tallos alados; hojas lobadas, lanosas; capítulos pocos; flores tubulosa; papus piloso
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados, cultivos
Distrito: PET, PNE, PPA, PPR.
Partido: BAL, DOL, ESC, GJM, GPU, LUJ, PMR, QUI, TIG, TRQ.
Prov. limítrofe: DF, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Burkart 23859* (LP).

77. *Carduus tenuiflorus* Curtis
N. Vulgar: Cardillo, Cardo, Cardo crespo
Sin.: *Carduus pycnocephalus* L. var. *tenuiflorus* (Curtis) Fiori & Bég.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974; Cabrera y Zardini, 1978; Webb et al., 1988; Novara, 1993; Ariza Espinar & Delucchi (1998b).
Diagnosis: Hierba anual o bienal, espinosa; tallos alados; hojas lobadas, lanosas; capítulos numerosos; flores tubulosas; papus piloso
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados
Distrito: PET, PPA, PPR.
Partido: BAL, CAM, CHM, GAL, GPU, LAP, LPT, OLA, PER, TIG, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 105* (LP).

78. *Carduus thoermeri* Weinm.
N. Vulgar: Cardo
Sin.: *Carduus leiophyllus* Petrovic., *Carduus macrocephalus* Desf., *Carduus macrolepis* Peterm., *Carduus nutans* L. var. *macrocephalus* Auct. non (Desf.) Fiori & Bég. *Carduus nutans* L. Auct. non. ssp. *macrolepis* Auct. non (Peterm.) Kazmi
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978; Del Aguila, 1964; Kazmi, 1964; Amaral Franco, 1976a; Moore, 1983; Novara, 1993; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b.
Diagnosis: Hierba anual, espinosa, glabra; hojas lobadas; capítulos solitarios; filarios recurvados; flores púrpuras; papus piloso
Status: Naturalizada
Categoría: NT.
Ecología: En dunas, cultivos y campos de pastoreo
Distrito: PET, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: AGC, AVE, BAL, CSM, DAI, GPU, GVL, JUN, LOB, LPT, MHR, OLA, PEH, PEL, PER, RAM, SAL, TAN, TIG, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 128* (LP).



073

076



074



077



075



078

Carthamus L., Cardueae

79. *Carthamus lanatus* L.
N. Vulgar: Cardo chileno, Cardo cruz, Cardo del diablo, Cardo lanudo, Cartamo, Manca potrillo
Sin.: *Kentrophyllum lanatum* (L.) DC. & Duby.
Ref.: Ruiz Leal & Roig, 1961; Cabrera, 1963, 1971, 1974; Del Aguila, 1964; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b.
Diagnosis: Hierba anual, espinosa, pubescente; hojas semi-amplexicaules, pinnatisectas; capítulos solitarios; flores tubulosas amarillas; papus paleáceo
Status: Naturalizada
Categoría: NT.
Ecología: En campos, potreros y cultivos
Distrito: PET, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: BBL, BER, CAM, CHM, DAI, ESC, LMT, LPT, LZA, MAG, MAI, OLA, PER, SAR, TAN.
Prov. limítrofe: DF, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 102* (LP).

Centaurea L., Cardueae

80. *Centaurea calcitrapa* L.
N. Vulgar: Abre puño
Ref.: Parodi, 1956; Cabrera, 1963, 1971, 1974; Del Aguila, 1964; Dostál, 1976b; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b.
Diagnosis: Hierba anual o bienal, pubescente; hojas pinnatisectas; filarios con una larga espina apical y 2 basales más cortas; flores tubulosas purpúreas; papus ausente
Status: Naturalizada
Categoría: NT.
Ecología: En dunas, praderas, terrenos baldíos, potreros y caminos
Distrito: PET, PPA, PPR.
Partido: AZU, BAL, CHM, DOL, ESC, GPU, LPT, MHR, OLA, PIN, PMR, QUI, SAR, SPD, TAN, TIG, TOR, TRQ, VMA.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 124* (LP).

81. *Centaurea cyanus* L.
N. Vulgar: Azulejo
Ref.: Cabrera, 1963; Troiani & Steibel, 1999.
Diagnosis: Hierba anual o bienal, pubescente; hojas pinnatisectas; filarios con una larga espina apical y 2 basales más cortas; flores tubulosas purpúreas; papus ausente
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En jardines, en terrenos modificados
Distrito: No existen referencias
Partido: No existen referencias
Prov. limítrofe: ERI, DF, PAM.
Uso: Ornamental
Ejemplar examinado: *Burkart 6528* (LP).

82. *Centaurea diffusa* Lam.
Sin.: *Centaurea parviflora* Sibth & SM. hom. illeg.
Ref.: Cabrera y Fabris, 1958; Cabrera, 1963; Dostál, 1976b; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b.
Diagnosis: Hierba anual o bienal; hojas basales 2-pinnatífidas, las caulinares pinnatífidas; filarios laciniados con una corta espina apical; flores rosadas o blanco-cremosas; papus rudimentario
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En vías férreas, rutas, cultivos
Distrito: PPA, PPO, PPR.
Partido: BOL, CCR, DAI, HYR, OLA, PEH.
Prov. limítrofe: CDB, PAM.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Abbiatti 4073* (LP).

83. *Centaurea iberica* Trevir ex Spreng.
N. Vulgar: Abre puño gigante
Ref.: Parodi, 1956, Cabrera, 1963; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b.
Diagnosis: Hierba anual o bienal; hojas basales lirado-pinnatífidas; filarios con una larga espina apical y dos basales más cortas; flores púrpuras; papus formado por pajitas
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados, al borde de los caminos
Distrito: PPR.
Partido: MER, SUI.
Prov. limítrofe: DF, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Parodi 15411* (BAA).

84. *Centaurea jacea* L.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b.
Diagnosis: Hierba perenne, pubescente; hojas basales lanceolado-lobuladas, las apicales lanceoladas; filarios con un apéndice membranoso flabelado; flores violáceas; papus corto
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados, al borde de los caminos
Distrito: PPA, PPR.
Partido: CHM, LPT, TAN.
Prov. limítrofe: RNG.
Uso: Biodinámica
Ejemplar examinado: *Cabrera 7404* (LP).



079



082



080

083



081



084

85. *Centaurea melitensis* L.
N. Vulgar: Abre puño, Abre puño amarillo, Roseta, Zizaña
Ref.: Hicken, 1910; Parodi, 1956; Cabrera, 1963, 1971, 1974; Del Aguila, 1964; Novara, 1993; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b.
Diagnosis: Hierba anual, pubescente; hojas basales lirado-pinnatífidas; filarios con una espina apical y 2-3 dientes espinosos basales; flores tubulosas, amarillas; papus formado por pajitas
Status: Naturalizada
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes naturales, cultivos y rastrojos
Distrito: PEC, PET, PPA, PPO, PPR.
Partido: AGC, AZU, BAL, BZT, CHM, CSM, CSZ, GPU, JUN, LBR, LPT, MCH, OLA, PER, PIN, PUA, QUI, SFR, SID, SPD, TAN, TLQ, VIL, ZAR.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 534* (LP).

86. *Centaurea nigrescens* Willd.
Sin.: *Centaurea dubia* Suter. ssp. *vochinensis* (Bernh. ex Rchr.) Hayek ex Hegi, *Centaurea rotundifolia* (Bartl.) Hayek, *Centaurea vochinensis* Bernh. ex Rchb.
Ref.: Moore & Frankton, 1974; Dostál. 1976; Cabrera & Zardini, 1978; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b.
Diagnosis: Hierba perenne, pubescente; hojas lanceoladas; filarios con un apéndice apical membranáceo y laciniado; flores violáceas; papus ausente o formado por pajitas cortas
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En terrenos modificados, al borde de los caminos, cultivos
Distrito: PPA, PPR.
Partido: CHM, LPT, PER, TAN.
Prov. limítrofe: RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Parodi 8833* (BAA).

87. *Centaurea solstitialis* L.
N. Vulgar: Abre puño, Abre puño amarillo
Ref.: Hicken, 1910; Parodi, 1956; Cabrera, 1963, 1971, 1974; Del Aguila, 1964; Novara, 1993; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b.
Diagnosis: Hierba anual o bienal; tallos alados; hojas pinnatífidas; filarios terminados en una larga espina; flores amarillas; papus formado por cerdas
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En campos, caminos, barracas, cultivos
Distrito: PEC, PET, PPA, PPO, PPR.
Partido: AVE, BBL, CSM, DAI, ESC, GPI, GUA, LZA, MAI, MHR, MRN, PER, PIN, PMR, SAA, SAQ, SAR, SPD, TAN, TLQ, TOR, TRQ, VIL, ZAR.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Medicinal, Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 653* (LP).

88. *Centaurea tweediei* Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b.
Diagnosis: Hierba anual, glabra; hojas linear-lanceoladas; filarios laciniados; flores tubulosas purpúreas; papus formado por cerdas
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En suelos arenosos
Distrito: PNE.
Partido: SFR, TIG.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *LP 5778.*

Chamaemelum Miller, Anthemideae

89. *Chamaemelum mixtum* (L.) All.
N. Vulgar: Manzanilla
Sin.: *Anthemis mixta* L., *Ormenis mixta* (L.) Dumort.
Ref.: Cabrera 1963, 1974; Bremer & Humphries, 1993; Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba anual, pubescente; hojas 1-2 pinnatisectas; capítulos solitarios; flores del margen liguladas, blancas, las del disco tubulosas, amarillas; aquenios glabros
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En suelos arenosos
Distrito: PNE, PPR.
Partido: AVE, ENS, TRQ.
Prov. limítrofe: DF, ERI.
Uso: Alimenticia; Industrial (cosmética; licorería; sustituyente de la manzanilla)
Ejemplar examinado: *Cabrera 942* (LP).

Chaptalia Vent., Mutisieae

90. *Chaptalia arechavaletae* Arechav.
Ref.: Burkart, 1944; Katinas, 1996a.
Diagnosis: Hierba acaule; hojas enteras; escapos con numerosas brácteas en toda su longitud; aquenios pubescentes, rostro filiforme
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En barrancas y praderas graminosas
Distrito: PET, PNE, PPR.
Partido: BZT, ESC, IMG, LPT, MAG, SID, SVT, TIG.
Prov. limítrofe: DF, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 5369* (LP).



085



088



086



089



087



090

91. *Chaptalia exscapa* (Pers.) Baker
Sin.: *Chaptalia exscapa* (Pers.) Baker var. *typica* Burkart, hom. illeg., *Gerbera brevipes* Sch. Bip., *Leria exscapa* DC., *Loxodon brevipes* Cass., *Tussilago exscapa* Pers.
Ref.: Burkart, 1944; Katinas, 1996a.
Diagnosis: Hierba acaule; hojas enteras; escapos brevísimos; aquenios pubescentes, con un leve estrangulamiento subapical
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos y zonas serranas
Distrito: PPA, PPR.
Partido: AVE, CSM, ESC, GPU, LMT, LPT, MER, SVT, TAN, TRQ, VMA.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 323* (LP).

92. *Chaptalia ignota* Burkart
Ref.: Burkart, 1944; Katinas, 1996a.
Diagnosis: Hierba acaule; hojas enteras; escapos con algunas brácteas en la mitad superior; aquenios pubescentes, rostro filiforme
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En praderas, terrenos rocosos o arenosos
Distrito: PET, PPA.
Partido: SID, TAN, ZAR.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Fabris & Schwabe 4749* (LP).

93. *Chaptalia integerrima* (Vell.) Burkart
N. Vulgar: Lengua de vaca, Pelosilla, Yerba de San Juan
Sin.: *Chaptalia integrifolia* (Cass.) Baker hom. illeg., *Chaptalia microdonta* Greene, *Leria integrifolia* Cass., *Leria lutescens* Sch. Bip., hom. illeg., *Leria nutans* (L.) DC. var. *integrifolia* (Cass.) Less., *Tussilago integerrima* Vell.
Ref.: Burkart, 1944; Katinas, 1996a.
Diagnosis: Hierba acaule; hojas enteras; escapos sin brácteas; aquenios pubescentes, rostro filiforme
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En praderas graminosas y áreas serranas
Distrito: PPA, PPO.
Partido: CSZ, GPI, SAA, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Abbiatti 4350* (LP).

94. *Chaptalia nutans* (L.) Pol.
N. Vulgar: Arracachuela, Cerraja, Lechuguilla, Lengua de vaca, Peludilla, Pelusa, Raíz de lombriz
Sin.: *Chaptalia ebracteata* (Kuntze) K. Schum., *Chaptalia majuscula* Greene, *Chaptalia nutans* (L.) Hemsl., comb. superfl., *Chaptalia subcordata* Greene, *Gerbera nutans* (L.) Sch. Bip., *Leria lyrata* Cass., *Leria nutans* (L.) DC., *Thyrsanthema ebracteata* Kuntze, *Thyrsanthema nutans* (L.) Kuntze, *Tussilago lyrata* Pers., *Tussilago nutans* L., *Tussilago vaccina* Vell.
Ref.: Burkart, 1944; Katinas, 1996a.
Diagnosis: Hierba acaule; hojas lirado-pinnatífidas; escapos sin brácteas; aquenios pubescentes, rostro filiforme
Status: Nativa
Categoría: V.
Ecología: En praderas, suelos húmedos, rocosos o arenosos
Distrito: PNE.
Partido: IMG, TIG.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 408* (LP).

95. *Chaptalia piloselloides* (Vahl) Baker
Sin.: *Chaptalia piloselloides* (Vahl) Baker ssp. *bracteata* (Cass.) Burkart, *Gerbera bracteata* (Cass.) Sch. Bip., *Lieberkhuna bracteata* Cass., *Perdicium piloselloides* Vahl, *Tussilago sinuata* Pers.
Ref.: Burkart, 1944; Katinas, 1996a.
Diagnosis: Hierba acaule; hojas enteras; escapos con brácteas; aquenios pubescentes sólo en la base, rostro grueso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En praderas, terrenos arcilloso arenosos
Distrito: PNE, PPA, PPR.
Partido: AVE, CSM, ESC, LOB, LPT, SVT, TAN, TIG, TRQ.
Prov. limítrofe: ERI, PAM, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Lanfranchi 715* (LP).

96. *Chaptalia runcinata* Kunth
N. Vulgar: Lengua de vaca
Sin.: *Loxodon longipes* Cass., *Oxydon bicolor* Less.
Ref.: Burkart, 1944; Katinas, 1996a.
Diagnosis: Hierba acaule; hojas enteras; escapos bracteados; aquenios pubescentes sólo en la base, rostro filiforme
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En praderas, lugares arenosos
Distrito: PNE, PPA, PPR.
Partido: LPT, PLR, TAN, TIG, VMA.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Frangi 238* (LP).

091



094



092

095



093

096

97. *Chaptalia sinuata* (Less.) Baker
N. Vulgar: Lengua de vaca, Peludilla, Yerba de San Juan
Sin.: *Leria nutans* (L.) DC. var. *sinuata* Less., *Leria sinuata* (Less.) DC.
Ref.: Burkart, 1944; Katinas, 1996a.
Diagnosis: Hierba acaule; hojas enteras; escapos sin brácteas; aquenios pubescentes, rostro filiforme
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos, médanos
Distrito: PEC, PPA, PPO, PPR.
Partido: BBL, CHA, CSZ, GPI, JUN, PER, SAA, TAN, TLQ, TRQ.
Prov. limítrofe: ERI, PAM, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 6510* (LP).

Chevreulia Cass., Inuleae

98. *Chevreulia acuminata* Less.
Sin.: *Chevreulia filiformis* Hook. & Arn., *Chevreulia longipes* Wedd.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978.
Diagnosis: Hierba pigmea, pubescente; hojas lanceoladas, acuminadas; flores blanco crema
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En laderas pratenses y campos vírgenes
Distrito: PPR.
Partido: GJM, LPT, PER.
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 8446* (LP).

99. *Chevreulia sarmentosa* (Pers.) Blake
Sin.: *Chevreulia stolonifera* Cass., *Chevreulia thouarsii* J. Rémy, *Gnaphalium calycinum* Poir., *Leria cespitosa* Spreng., *Tussilago sarmentosa* Pers., *Xeranthemum cespitosum* Du Petit- Thouars
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978.
Diagnosis: Hierba estolonífera, pubescente; hojas espatuladas, discoloras; flores blanco crema
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En praderas, estepas prístinas y céspedes ribereños sobre suelos húmedos y fértiles, también sobre suelos pedregosos ca. 500 m.s.m.
Distrito: PPA, PNE, PPR.
Partido: BAL, EXC, IMG, LPT, SAA, SFR, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Añon 1* (LP).

Chondrilla L., Cichorieae

100. *Chondrilla juncea* L.
N. Vulgar: Achicoria dulce, Ajonjera, Chondrilla, Yuyo esqueleto.
Ref.: Tortosa & Medán, 1977; Ariza Espinar & Urtubey, 1998.
Diagnosis: Hierba perenne con látex; hojas basales pecioladas, las caulinares sésiles; involucro con calículo; flores amarillas, violáceas o blanquecinas; papus piloso
Status: Adventicia, Maleza
Categoría: NT.
Ecología: En campos
Distrito: PPO.
Partido: GUA.
Prov. limítrofe: No existen referencias
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Niven s.n.* (BAA 15212).

Chuquiraga Juss., Barnadesieae

101. *Chuquiraga erinacea* D. Don.
N. Vulgar: Ardegras, Chilladora, Chirriadera, Chispeadora, Rabiosa, Romerillo, Uña de gato
Sin.: *Chuquiraga erinacea* D. Don ssp. *mollior* Lorentz, *Chuquiraga erinacea* D. Don var. *unguis-cati* (Ces.) Hauman, *Chuquiraga juniperina* Decne., *Chuquiraga juniperina* Phil., *Chuquiraga unguis-cati* Ces.
Ref.: Ezcurra, 1985, 1996.
Diagnosis: Arbusto; hojas variables, nunca graminiformes; papus plumoso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En matorrales desérticos
Distrito: PEC, PMT, PPO.
Partido: BBL, PAT, TRQ, VIL.
Prov. limítrofe: PAM, RNG.
Uso: Combustible
Ejemplar examinado: *Cabrera & Job 3* (LP).

Cichorium L., Cichorieae

102. *Cichorium intybus* L.
N. Vulgar: Achicoria, Radicheta
Ref.: Cabrera, 1963; Ariza Espinar & Urtubey, 1998.
Diagnosis: Hierba anual o bianual, con látex; hojas basales arrosetadas, las caulinares amplexicaules; capítulos en espigas o racimos laxos; flores blancas o azules; papus coroniforme
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En bosques xeromórficos, en rastrojos, a orillas de los caminos
Distrito: PPA, PPR.
Partido: GJM, IMG, JUN, LPT, LZA, MRL, OLA.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, SFE.
Uso: Alimenticia; Industrial, Medicinal, Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 154* (LP).



097

100

098

101



099



102

Cirsium Mill. Emend Scop., Cardueae

103. *Cirsium vulgare* (Savi) Ten.
N. Vulgar: Cardo, Cardo negro
Sin.: *Carduus lanceolatus* L., *Carduus vulgaris* Savi, *Cirsium lanceolatum* (L.) Scop., *Cirsium vulgare* (Savi) Airy- Shaw, comb. superfl.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978; Covas, 1965; Moore & Frankton, 1974; Moore, 1983; Webb. *et al.*, 1988; Novara, 1993; Ariza Espinar & Delucchi ,1998b.
Diagnosis: Hierba anual, espinosa, pubescente; tallos alados; hojas lanceoladas; capítulos solitarios; filarios con una larga espina apical; flores tubulosas, violáceas; papus plumoso
Status: Naturalizada
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados
Distrito: PET, PNE, PPA, PPO.
Partido: AZU, BER, BZT, CAM, CSM, CST, GPI, LBR, LPT, MHR, PMR, SFR, TAN, TIG, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 140* (LP).

Coleostephus Cass., Anthemideae

104. *Coleostephus myconis* (L.) Cass.
Sin.: *Chrysanthemum myconis* L., *Kremeria myconis* (L.) Maire, *Leucanthemum myconis* (L.) Giraud
Ref.: Cabrera, 1963; Cabrera & Zardini, 1978; Bremer & Humphries, 1993; Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba anual; hojas obovadas, irregularmente dentadas, las caulinares oblongas; capítulos solitarios; flores del margen liguladas, amarillas; aquenios del margen bialado con papus membráceo, los del disco con papus muy reducido
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En campos bajos
Distrito: PPR.
Partido: SAD.
Prov. limítrofe: No existen referencias
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *J.H.Hunziker 7537* (LP).

Conyza Less, Astereae

105. *Conyza albida* Willd. ex Spreng.
Sin.: *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist f. *subleiotheca* Cuatrec., *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. *microcephala* (Cabrera) Cabrera, *Conyza erigeroides* DC., *Conyza floribunda* Kunth var. *subleiotheca* (Cuatrec.) Marshall, *Erigeron albidum* (Willd. ex Spreng) Gray, *Erigeron albidus* (Willd. ex Spreng.) Herter comb. superfl., *Erigeron bonariensis* L. var. *microcephalus* Cabrera
Ref.: Ariza Espinar, 1982a; Cabrera, 1978.
Diagnosis: Hierba pubescente; capítulos pequeños, en panojas; flores del margen filiformes y brevemente liguladas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En todo tipo de suelos
Distrito: PPA, PPR.
Partido: BAL, BBL, CHM, GPU, LPT, MAG, SNC, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 4485* (LP).

106. *Conyza blakei* (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Erigeron blakei* Cabrera
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba anual, hirsuta; hojas apicales lineares, las basales pinnatisectas; capítulos en panojas, invólucro glabro; flores del margen filiformes, 2-dentadas, las del disco pocas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En dunas, praderas, campos húmedos
Distrito: PPA, PPR.
Partido: BAL, CLR, GJM, LPT, MHR, MON, NEC, TAN, TAY, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: Alimenticia; Ictiotóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 10981* (LP).

107. *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist
N. Vulgar: Carnicera, Hierba carnicera, Mata negra, Sanguinaria
Sin.: *Conyza hispida* Kunth, *Conyza linearis* DC., *Conyza plebeja* Phil., *Erigeron bonariensis* L.
Ref.: Cabrera, 1953, 1974, 1978; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Hierba anual, híspida; hojas apicales lineares, las basales obovadas o lobadas; capítulos en seudocorimbos; flores del margen filiformes, cortamente liguladas, las del disco pocas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En bosques secos, terrenos altos, borde de vías férreas
Distrito: PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: BAL, CAM, CHM, DEL, ENS, GJM, GLH, GLV, GPU, HUR, IMG, LPT, MAG, MON, PEH, PEL, SNC, TAN, TOR, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, SFE.
Uso: Medicinal; Fabricación de techos
Ejemplar examinado: *Cabrera 4291* (LP).

108. *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. ***angustifolia*** (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Erigeron bonariensis* L. var. *angustifolius* Cabrera
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1978.
Diagnosis: Hierba anual, híspida; hojas lineares; capítulos en panojas alargadas; flores filiformes cortamente liguladas, las del disco pocas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En estepas arenosas
Distrito: PPA, PPO.
Partido: BBL, CLR, CSZ, IMG, MHR, PEL, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Scala s.n.* (LP).

103



106



104

107



105



108

109. *Conyza floribunda* Kunth
Sin.: *Conyza bilbaoana* J.Remy, *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. *leiotheca* (Blake) Cuatrec., *Conyza elata* Kunth & Bouché, *Conyza myriocephala* J.Remy, *Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker var. *floribunda* (Kunth) Marshall, *Erigeron bilbaoanus* (J.Remy) Cabrera, *Erigeron bonariensis* L. var. *floribundum* (Kunth) Cuatrec., *Erigeron bonariensis* L. f. *glabrata* Speg., *Erigeron bonariensis* L. var. *leiothecus* Blake, *Erigeron floribundus* (Kunth) Sch. Bip., *Marsea bonariensis* (L.) Badillo var. *leiotheca* (Blake) Badillo
Ref.: Cabrera, 1971, 1978; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Hierba anual, híspida; hojas linear-lanceoladas, aserradas, las apicales enteras; capítulos en panojas, invólucro glabro con brácteas hialinas en el margen; flores del margen cortísimamente liguladas, las del disco pocas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En praderas húmedas, a orillas de ríos
Distrito: PET, PNE, PPA, PPR.
Partido: BAL, BER, DEL, ENS, GPU, IMG, LPT, SAD, SID, SNC, TAN, TAY, TIG, TRQ, VLP.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 1695* (LP).

110. *Conyza laevigata* (Rich) Pruski
Sin.: *Conyza apurensis* Kunth, *Conyza subspathulata* Cronquist, *Erigeron apurensis* (Kunth) Griseb, *Erigeron laevigatus* Rich, *Erigeron spathulatus* Vahl hom. illeg.
Ref.: Cabrera, 1971; Roig, 1971; Pruski, 1998.
Diagnosis: Hierba anual; hojas pinnatisectas; capítulos en corimbos paucicéfalos; flores del margen filiformes, 2-dentadas, las del disco pocas; aquenios subglabros
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En salitrales, barrancas
Distrito: PEC, PMT.
Partido: PAT, VIL.
Prov. limítrofe: PAM, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 6698* (LP).

111. *Conyza lorentzii* Griseb.
Sin.: *Erigeron lorentzii* (Griseb.) Cabrera
Ref.: Roig, 1971; Cabrera, 1974.
Diagnosis: Hierba anual subglabra; hojas ovadas, las basales dentadas y las apicales enteras; capítulos pocos o solitarios, invólucro hirsuto; flores del disco numerosas
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En barrancas de ríos
Distrito: PNE.
Partido: No existen referencias
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 5610** (LP).

112. *Conyza monorchis* (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Erigeron monorchis* Griseb.
Ref.: Cabrera, 1953, 1974.
Diagnosis: Hierba perenne, albo-pubescente; hojas basales arrosetadas, obovadas, lobadas, las apicales lineares y pocas; capítulos en corimbos paucicéfalos; flores del margen violáceas, las del disco pocas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En estepas prístinas, campos altos, vías del ferrocarril
Distrito: PET, PPA, PPR.
Partido: BAL, LPT, TAN, TAY, TRQ.
Prov. limítrofe: DF, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 2800* (LP).

113. *Conyza pampeana* (Parodi) Cabrera
Sin.: *Erigeron pampeanus* Parodi
Ref.: Cabrera, 1953, 1974; Ariza Espinar, 1993b.
Diagnosis: Hierba perenne, glabra; hojas lineares, semi-amplexicaules; capítulos en corimbos laxos, invólucro glabro; flores del margen blancas, subliguladas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En praderas, campos bajos o húmedos
Distrito: PPR.
Partido: AVE, ESC, JUN, LPT, MAG.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 10659* (LP).

114. *Conyza primulifolia* (Lam.) Cuatrec. & Lourteig
Sin.: *Conyza chilensis* Spreng., *Conyza myosotifolia* Kunth, *Conyza scabiosaefolia* J.Remy, *Conyza yungasensis* Rusby, *Erigeron chilensis* (Spreng.) D. Don ex Loudon, *Inulae primulaefolia* Lam.
Ref.: Cabrera, 1971; Cabrera, 1978; Lourteig & Cuatrecasas, 1985.
Diagnosis: Hierba perenne, pubescente; hojas basales arrosetadas, oblanceoladas y festoneadas, las apicales pocas; capítulos en corimbos paucicéfalos, invólucro híspido; flores del margen liguladas, las del disco pocas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En dunas semifijas, canteras, praderas, médanos, y al borde de las vías férreas
Distrito: PNE, PPA, PPR.
Partido: BAL, BZT, CAM, CAÑ, DEL, GBG, GJM, GLV, GPU, LBR, LPT, LUJ, NEC, PAT, TAY, TIG, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 2125* (LP).



109



110

111



112

113



114

115. *Conyza serrana* Cabrera
Sin.: *Erigeron platensis* Speg.
Ref.: Cabrera, 1963, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne, pubescente; hojas basales obovadas, aserradas, las apicales lineares; capítulos en corimbos laxos; flores del margen amarillas, subliguladas
Status: Endémica
Categoría: R.
Ecología: En roquedales de sierras
Distrito: PPA.
Partido: CPR, CSZ, TAN, TRQ.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 5763* (LP).

Cosmos Cav., Heliantheae

116. *Cosmos sulphureus* Cav.
Ref.: Sáenz & Delucchi (inéd.).
Diagnosis: Hierba anual; hojas 2-3 pinnatisectas; capítulos pedunculados, solitarios; aquenios curvados con un prominente rostro; papus con 2-3 aristas, con pelos retrorsos
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados, terrenos baldíos y vías férreas
Distrito: PET.
Partido: BER, IMG, LPT, VLP.
Prov. limítrofe: CDB.
Uso: Medicinal; Ornamental
Ejemplar examinado: *Delucchi 701* (LP).

Cotula L., Anthemideae

117. *Cotula australis* (Sieber ex Spreng.) Less.
Sin.: *Anacyclus australis* Sieber ex Spreng., *Lancisia australis* (Sieber ex Spreng.) Rydb., *Soliva tenella* A. Cunn., *Strongylosperma australe* (Sieber ex Spreng.) Less.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978; Bremer & Humphries, 1993; Ariza Espinar, 1997; Troiani & Steibel, 1999.
Diagnosis: Hierba anual, pubescente; hojas obovadas, 1-2 pinnatisectas; capítulos solitarios, pedunculados; flores del margen apétalas con aquenios bialados, las del disco tubulosas con aquenios sin alas
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En lugares húmedos y ambientes modificados, calles y jardines
Distrito: PET, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: AVE, ESC, GSM, JUN, LPT, LUJ, PEH, PER, PIN, QUI, SAR, SFR, SID, TAN, TIG.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Lahitte & Clos 295* (LP).

118. *Cotula coronopifolia* L.
Sin.: *Cotula montevidensis* Spreng., *Lancisia coronopifolia* (L.) Rydb.
Ref.: Caro, 1961; Cabrera, 1963, 1971, 1974; Bremer & Humphries, 1993; Ariza Espinar, 1997; Troiani & Steibel, 1999.
Diagnosis: Hierba perenne, glabra; hojas lanceoladas u oblongas, enteras, lobadas o 1-2 pinnatisectas; capítulos pedunculados, solitarios; flores pediceladas, las del margen apétalas con aquenios bialados, las del disco tubulosas con aquenios engrosados en el margen
Status: Naturalizada
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados y naturales semi-inundados
Distrito: PET, PNE, PPA, PPR.
Partido: AVE, BER, CAM, CAS, CHM, CST, DOL, ENS, GAL, GLV, GPU, LFL, LZA, MAG, MRN, PER, PIN, SFR, SID, TIG, TOR.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, RNG.
Uso: Ornamental
Ejemplar examinado: *Cabrera 1861* (LP).

Crepis L., Cichorieae

119. *Crepis capillaris* (L.) Wallr.
Sin.: *Crepis virens* L., *Lapsana capillaris* L.
Ref.: Cabrera, 1963; Ariza Espinar & Urtubey, 1998.
Diagnosis: Hierba anual casi glabra, con látex; flores amarillas; aquenios poco contraídos, sin rostro; papus piloso, caduco
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En jardines
Distrito: PPA, PPR.
Partido: BAL, GAL, GPU, LPT.
Prov. limítrofe: CDB.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 9941* (LP).

120. *Crepis setosa* Haller f.
Sin.: *Barkhausia setosa* Haller f.
Ref.: Cabrera, 1963; Ariza Espinar & Urtubey, 1998.
Diagnosis: Hierba anual, hirsuta, con látex; flores amarillas; aquenios poco contraídos, rostrados; papus piloso
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En praderas, dunas, talares
Distrito: PET, PPA, PPR.
Partido: CAÑ, ENS, GJM, GLV, GPU, ITU, LPT, TRQ, VMA.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 2737* (LP).



115



118

116



119



117

120

Criscia Katinas, Mutisieae

121. *Criscia stricta* (Spreng.) Katinas
Sin.: *Onoseris stricta* Spreng., *Perezia pampeana* Speg., *Trichocline heterophylla* Griseb., non (Spreg.) Less., hom. illeg., *Trixis stricta* (Spreng.) Less.
Ref.: Katinas, 1994, 1995.
Diagnosis: Hierba acaule; hojas espatuladas, arrosetadas; capítulos solitarios y radiados; flores bilabiadas, hermafroditas, anaranjadas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos rocosos o arenosos
Distrito: PPA, PPR.
Partido: BAL, GPU, MAG, TAN.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Molfino & Clos 284* (LP).

Cyclolepis Gillies ex D. Don., Mutisieae

122. *Cyclolepis genistoides* D. Don
N. Vulgar: Matorro negro, Monte azul, Palo azul, Usillo
Sin.: *Gochnatia genistoides* (D. Don) Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera, 1951; Freire, 1996.
Diagnosis: Arbusto ginodioico; hojas pequeñas, caducas; flores tubulosas, 5-lobadas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos salados
Distrito: PEC, PMT.
Partido: BBL, PAT, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, RNG, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera & Fabris 16512* (LP).

Cynara L., Cardueae

123. *Cynara cardunculus* L.
N. Vulgar: Cardo, Cardo de Castilla, Cardón
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974; Del Aguila, 1964; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b.
Diagnosis: Hierba perenne, canescente; hojas basales arrosetadas; capítulos en falsos corimbos; flores púrpuras, tubulosas; papus plumoso
Status: Naturalizada
Categoría: NT.
Ecología: En praderas naturales y ambientes modificados
Distrito: PET, PNE, PPA, PPR.
Partido: AVE, BAL, CHM, GAL, GPU, LPT, SAR, SID, TAY, TAN.
Prov. limítrofe: ERI, DF, PAM.
Uso: Alimenticia; Medicinal; Ornamental
Ejemplar examinado: *Cabrera 139* (LP).

Eclipta L., Heliantheae

124. *Eclipta elliptica* DC.
Sin.: *Eclipta bellidioides* (Spreng.) Sch. Bip. ex Blake, *Spilanthes wedelioides* Hook. & Arn., *Wollastonia prostrata* DC.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1978
Diagnosis: Hierba perenne; hojas lanceoladas-elípticas; capítulos pedunculados, solitarios; papus formado por dos aristas cortas y una coronita de cerdas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En terrenos muy húmedos
Distrito: PET, PNE, PPA.
Partido: CHM, ENS, IMG, MAG, MIR, NEC, QUI, SFR.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 7580* (LP).

125. *Eclipta megapotamica* (Spreng.) Sch. Bip. ex Blake
Sin.: *Eclipta lanceolata* DC., *Verbesina megapotamica* Spreng.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1978; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas lanceoladas; capítulos pedunculados, solitarios; aquenios estrechamente alados; papus formado por dos aristas cortas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En terrenos húmedos y la ribera platense
Distrito: PNE.
Partido: BAR, IMG, SFR, TIG.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: Medicinal; Tintórea
Ejemplar examinado: *Burkart 1751* (LP, SI).

126. *Eclipta prostrata* (L.) L.
Sin.: *Eclipta alba* (L.) Hassk., *Eclipta erecta* L., *Galinsoga oblonga* DC., *Polygine inconspicua* Phil., *Verbesina alba* L., *Verbesina conyzoides* Trew, *Verbesina prostrata* L., *Wiborgia oblongifolia* Hook.
Ref.: Cabrera, 1974, 1978; Cabrera & Zardini, 1978; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Hierba anual; hojas oblongo-lanceoladas; capítulos solitarios; flores del margen blancas; papus con una corona de cerdas muy cortas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos
Distrito: PET, PNE.
Partido: ENS, IMG, MAG, SFR.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: Alimenticia; Medicinal
Ejemplar examinado: *Sáenz 1548* (LP, SI).



121

124



122



125



123



126

Enhydra Lour., Heliantheae

127. *Enhydra anagallis* Gardner
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1978; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Hierba perenne, acuática; hojas oblanceolado-espatuladas; capítulos sésiles, solitarios; flores del margen blancas, dispuestas en 2-3 series; papus ausente
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En pajonales, pantanos y la ribera platense
Distrito: PET, PNE.
Partido: ENS, IMG, SPD.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Zardini 1165* (LP).

Erechthites Raf., Senecioneae

128. *Erechthites hieracifolia* (L.) Raf. ex DC. var. ***cacalioides*** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Sin.: *Erechthites agrestis* (Sw.) Standl. & Steyerm., *Erechthites cacalioides* (Fisch. ex Spreng.) Less., *Erechthites carduifolia* (Cass.) DC., *Erechthites carduifolia* DC. var. *latifolia* Klatt, *Erechthites hieracifolia* Walp., *Erechthites hieracifolia* (L.) DC. var. *cacalioides* Less. f. *pubescens* Kuntze, *Erechthites hieracifolia* (L.) DC. var. *carduifolia* (Cass.) Griseb., *Erechthites sulcata* Gardner, *Gynura aspera* Ridl., *Gynura malasica* (Ridl.) Ridl., *Gynura zeylanica* Trim. var. *malasica* Ridl., *Neoceis carduifolia* Cass., *Senecio cacalioides* Fisch. ex Spreng., *Senecio carduifolius* (Cass.) Desf., *Senecio fischeri* Sch. Bip., *Senecio hieracifolius* L., *Sonchus agrestis* Sw., *Sonchus brasiliensis* Meyen & Walp., *Sonchus occidentalis* Spreng.
Ref.: Belcher, 1956; Cabrera, 1963, 1974, 1978; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Hierba anual; hojas apicales lanceoladas, dentadas o lobadas, las basales obovadas; capítulos corimbosos, invólucro uniseriado; flores del margen filiformes
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En terrenos arcillosos, inundables; lugares húmedos
Distrito: PNE.
Partido: DEL, IMG, LPT.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Burkart 1108* (LP).

Eupatorium L., Eupatorieae

129. *Eupatorium artemisiifolium* Griseb.
Sin.: *Gyptis artemisiifolia* (Griseb.) R.M.King & H. Rob.
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1974; Ariza Espinar, 1994.
Diagnosis: Sufrútice; hojas lobadas, canescentes; flores 10-16, blancas o rosadas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos secos
Distrito: PPR.
Partido: LZA.
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Spegazzini III-1918* (LP).

130. *Eupatorium betonicaeforme* (DC.) Baker
N.Vulgar: Tabaco de monte, Tabaquillo
Sin.: *Barrosoa betonicaeformis* (DC) R.M.King & H. Rob., *Conoclinium betonicaeforme* DC.
Ref.: Parodi, 1930; Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1989.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas ovadas y cordadas en la base; receptáculo cónico; flores 30-40, rosadas
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En rastrojos
Distrito: PPR.
Partido: PER.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *J.A. de la Peña 1424* (BAF).

131. *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn.
N. Vulgar: Chilca, Romerillo, Romerillo colorado, Romero
Sin.: *Acanthostyles buniifolius* (Hook. & Arn.) R.M.King & H. Rob., *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. *bakerii* Kuntze, *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. *hieronymi* Kuntze, *Eupatorium crithmifolium* Griseb., *Eupatorium pinnatifidum* DC., *Eupatorium pinnatifidum* DC. var. *virgata* (Hook. & Arn.) Baker, *Eupatorium virgatum* D. Don. ex Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978; Ariza Espinar, 1994.
Diagnosis: Arbusto glabro o pubérulo; hojas lineares o pinnatisectas con segmentos lineares; flores 5-6, violáceas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos o estepas, entre rocas o en las quebradas, entre 350-550 m.s.m.
Distrito: PET, PPA.
Partido: BAL, CSZ, LPT, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: Tintórea
Ejemplar examinado: *Cabrera 4458* (LP).

132. *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. ***saucechicoënse*** (Hieron.) Ariza
Sin.: *Acanthostyles saucechicoënse* (Hieron.) R.M.King & H. Rob., *Eupatorium saucechicoënse* Hieron.
Ref.: Cabrera, 1963; Ariza Espinar, 1994.
Diagnosis: Se diferencia de la variedad *buniifolium* por su porte más bajo y las hojas menores, de hasta 3 cm. de longitud
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: Orillas del río Colorado
Distrito: PEC.
Partido: PAT, VIL.
Prov. limítrofe: RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n II-1899* (LP).



127

130



128

131



129



132

133. *Eupatorium bupleurifolium* DC.
Sin.: *Campovassouria bupleurifolia* (DC.) R.M.King & H. Rob., *Campovassouria cruciata* (Vell.) R.M.King & H. Rob., *Chrysocoma cruciata* Vell., *Eupatorium asclepiadeum* DC., *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *asclepiadeum* (DC.) Baker, *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *ensifolium* (Griseb.) Hieron., *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *linifolium* (DC.) Baker, *Eupatorium cruciatum* (Vell.) Ariza, *Eupatorium ensifolium* Griseb., *Eupatorium graminifolium* Chodat, *Eupatorium linifolium* DC.
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera 1974, 1978, 1989, 1996; Ariza Espinar, 1994.
Diagnosis: Arbusto pubescente o glabro; hojas linear-lanceoladas con glándulas; flores 5, rosadas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En planicies de inundación, bordes de arroyos y pajonales, (0) 520-700 m.s.m.
Distrito: PNE, PPA, PPR.
Partido: CSZ, GJM, SFR, TRQ.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 4709* (LP).

134. *Eupatorium cabrerae* B. L. Rob.
Sin.: *Barrosoa cabrerae* (B. L. Rob.) R.M.King & H. Rob.
Ref.: B. L. Robinson, 1930a.
Diagnosis: Hierba perenne, pubescente; hojas ovadas y aserradas; receptáculo cónico, flores 50-60, purpúreas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En albardones sin árboles, suelos pantanosos
Distrito: PET, PPR.
Partido: ENS, LPT, TIG.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 2135* (LP).

135. *Eupatorium candolleanum* Hook. & Arn. p.min.p.
N. Vulgar: Tabaco del monte
Sin.: *Barrosoa candolleana* (Hook. & Arn.) R.M.King & H. Rob., *Eupatorium candolleanum* Hook. & Arn. var. *lancifolium* Baker, *Eupatorium candolleanum* Hook. & Arn. var. *paranensis* Baker, *Eupatorium palustre* (DC.) Baker var. *guaraniticum* Chodat, *Eupatorium palustre* (DC.) Baker var. *verbenaceum* Chodat
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1974, 1996; Ariza Espinar, 1994.
Diagnosis: Hierba perenne, pubescente; hojas ovadas y cuneiformes en la base; receptáculo cónico, flores 30-40, violáceas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos
Distrito: PPA.
Partido: LBR.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Scala 1001* (LP).

136. *Eupatorium commersonii* (Cass.) Hieron.
Sin.: *Eupatorium bacleanum* DC., *Eupatorium commersonii* (Cass.) Hieron. var. *dentata* Speg., *Eupatorium commersonii* (Cass.) Hieron. var. *pinnata* Speg., *Gyptis commersonii* Cass.
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1974; Ariza Espinar, 1994.
Diagnosis: Hierba perenne, estrigoso-pubescente; hojas irregularmente lobadas o pinnatífidas; flores 10-16, blancas o rosadas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En laderas rocosas, 100-250 m.s.m.
Distrito: PPA.
Partido: CSZ, GPU, LBR, OLA, SAA, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 5446* (LP).

137. *Eupatorium hecatanthum* (DC.) Baker
Sin.: *Eupatorium populifolium* Hook. & Arn. hom. illeg., *Hebeclinium hecathantum* DC., *Hebeclinium urolepis* DC., *Urolepis hecatantha* (DC.) R.M.King & H. Rob.
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1996; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Hierba anual, glandulosa; hojas acorazonadas; receptáculo cónico, flores ca. 50, liláceas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: Suelos húmedos, albordones
Distrito: PET, PNE, PPR.
Partido: BER, DEL, ENS, ESC, IMG, SAD.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: Alimenticia (infusiones)
Ejemplar examinado: *Cabrera 744* (LP).

138. *Eupatorium inulifolium* Kunth
N. Vulgar: Doctorcito
Sin.: *Austroeupatorium entreriense* (Hieron.) R.M.King & H. Rob., *Austroeupatorium inulifolium* (Kunth) R.M.King & H. Rob., *Eupatorium entreriense* Hieron., *Eupatorium inulifolium* Kunth var. *suaveolens* (Kunth) Hieron., *Eupatorium molle* Kunth, *Eupatorium pallescens* DC., *Eupatorium pallescens* DC. var. *bonariense* DC., *Eupatorium pallescens* DC. var. *hirsuta* DC., *Eupatorium pallidum* Hook. & Arn., *Eupatorium paranense* Hook. & Arn., *Eupatorium suaveolens* Kunth
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1974, 1978, 1989, 1996; Ariza Espinar, 1994.
Diagnosis: Arbusto pubescente; hojas ovadas y aserradas; flores 10-15, blancas y fragantes
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos
Distrito: PPR.
Partido: DEL, ENS, IMG, LPT, LZA, TIG.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 204* (LP).



133



136

134



137

135



138

139. *Eupatorium ivifolium* L.
Sin.: *Chromolaena ivifolia* (L.) R.M.King & H. Rob., *Eupatorium affine* Hook. & Arn. p.p., *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *affine* (Hook. & Arn.) Baker, *Eupatorium ivifolium* L. var. *genuinum* Hassl. hom. illeg., *Eupatorium ivifolium* L. var. *hirsutum* Hassl., *Eupatorium ivifolium* L. var. *perturbinatum* B. L. Rob., *Eupatorium ivifolium* L. var. *pilcomayense* Hassl., *Eupatorium luquense* Chodat
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1974, 1996.
Diagnosis: Sufrútice erecto, hirsuto; hojas lanceolado-rómbicas; flores 20-40, violáceas
Status: Nativa
Categoría: K.
Ecología: En suelos bajos y húmedos
Distrito: PPA.
Partido: LBR.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Scala II-1918* (LP).

140. *Eupatorium laevigatum* Lam.
N. Vulgar: Doctorcito
Sin.: *Chromolaena laevigata* (Lam.) R.M.King & H. Rob., *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *longepetiolatum* Hassl., *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *psidiifolia* (DC.) Hassl., *Eupatorium psidiifolium* DC.
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1996.
Diagnosis: Arbusto glabro; hojas 3-nervadas; flores numerosas, violáceas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos
Distrito: PET, PNE.
Partido: ENS, TIG.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: Medicinal; Tintórea
Ejemplar examinado: *Lanfranchi 347* (LP).

141. *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. ***crassipes*** (Hieron.) B. L. Rob.
Sin.: *Eupatorium crassipes* Hieron., *Eupatorium hunzigeri* Hieron., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn.
Ref.: Robinson, 1933; Cabrera & Vittet, 1954; Ariza Espinar, 1994.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas rómbico-lanceoladas, aterciopeladas; flores 10-22, lilacinas o blancas
Status: Nativa
Categoría: EX.
Ecología: En campos
Distrito: PPR.
Partido: LZA.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n. III-1918* (LP).

142. *Eupatorium macrocephalum* Less.
Sin.: *Campuloclinium macrocephalum* (Less.) DC., *Chromolaena pratensis* Gardner, *Conoclinium macrocephalum* var. *strigosum* DC., *Eupatorium denudatum* Chodat, *Eupatorium donianum* Hook. & Arn., *Eupatorium macrocephalum* Less. var. *angustifolium* Baker, *Eupatorium macrocephalum* Less. var. *stigmatosum* (Chodat) Hassl., *Eupatorium macrocephalum* Less. var. *strigosum* Baker, *Eupatorium stigmatosum* Chodat, *Eupatorium stigmatosum* Chodat var. *subcalvatum* Chodat, *Eupatorium stigmatosum* Chodat var. *violaceum* Chodat
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1974, 1978, 1989, 1996; Ariza Espinar, 1994.
Diagnosis: Hierba perenne, hirsuta; hojas lanceoladas; receptáculo cónico, flores 60-100, rosado intenso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos altos de pastoreo y afloramientos rocosos
Distrito: PNE, PPA, PPR.
Partido: CSZ, GPU, NJL, SAD, SFR, TAN, TRQ, VMA.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Scott de Birabén & Birabén 805* (LP).

143. *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn.
Sin.: *Austrobrickellia patens* (D. Don ex Hook. & Arn.) R.M.King & H. Rob., *Eupatorium patagonicum* Klatt, *Eupatorium patens* Phil., *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn. var. *gracilior* Lorentz, *Eupatorium vattuonei* Hicken, *Eupatorium xerolepis* Sch. Bip. ex Baker
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1971, 1974, 1978, 1996; Ariza Espinar, 1994.
Diagnosis: Arbusto apoyante; hojas ovadas, pubescentes; flores 7-12, amarillas o verdosas
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En ambientes naturales, usualmente asociadas a jarillas (*Larrea divaricata*)
Distrito: PEC.
Partido: PAT, VIL.
Prov. limítrofe: ERI, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Scala s.n.*. (LP).

144. *Eupatorium squarrulosum* Hook. & Arn.
Sin.: *Chromolaena ascendens* (Sch. Bip. ex Baker) R.M.King & H. Rob., *Chromolaena congesta* (Hook. & Arn.) R.M.King & H. Rob., *Chromolaena squarrulosa* (Hook. & Arn.) R.M.King & H. Rob., *Eupatorium ascendens* Sch. Bip. ex Baker, *Eupatorium ascendens* Sch. Bip. ex Baker var. *paucisetosum* B. L. Rob., *Eupatorium caaguazuense* Hieron. var. *nervosum* Chodat, *Eupatorium congestum* Hook. & Arn., *Eupatorium liatridium* DC., *Eupatorium tozziifolium* DC.
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1974, 1989, 1996.
Diagnosis: Sufrútice hirsuto; hojas ovadas, aserradas; flores 10-15, azuladas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En áreas serranas
Distrito: PPA.
Partido: BAL, TAN.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Abbiatti 4173* (LP).

139



142

140



143

141



144

145. *Eupatorium subhastatum* Hook. & Arn.
N. Vulgar: Pilarcito, Yerba del charrúa
Sin.: *Eupatorium bartsiifolium* DC., *Eupatorium hexanthum* DC., *Eupatorium hirsutum* Hook. & Arn. var. β Hook. & Arn., *Eupatorium hirsutum* Hook. & Arn. var. *triseriale* (Griseb.) Hieron., *Eupatorium subhastatum* Hook. & Arn. var. *hexanthum* (DC.) Malme, *Eupatorium subhastatum* Hook. & Arn. var *hirsutum* (Hook. & Arn.) Griseb., *Eupatorium subhastatum* Hook. & Arn. var. *triseriale* Griseb., *Eupatorium trichophorus* DC.
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954, 1963; Cabrera, 1989, 1996; Ariza Espinar, 1994.
Diagnosis: Sufrútice pubescente; hojas ovadas, dentadas; flores 9-13, lilacinas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos rocosos o arenosos, común en praderas vírgenes, hasta 500 m.s.m.
Distrito: PPA, PPO, PPR.
Partido: BAL, GPU, LZA, OLA, PEH, SAA, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 7164* (LP).

146. *Eupatorium tanacetifolium* Gill. ex Hook. & Arn.
Sin.: *Eupatorium erodiifolium* DC., *Eupatorium erodiifolium* var. *obtusilobum* Hieron., *Gyptis pinnatifida* Cass.
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954, 1963; Cabrera, 1974, 1989, 1996; Ariza Espinar, 1994.
Diagnosis: Sufrútice erecto, pubescente; hojas pinnatisectas; flores 25-35, rosadas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En estepas y faldas de hasta 400 m.s.m.
Distrito: PPA.
Partido: BAL, CSZ, GAL, SAA, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Fabris 4754* (LP).

147. *Eupatorium tremulum* Hook. & Arn.
N. Vulgar: Chilca, Chirca
Sin.: *Eupatorium crenulatum* (Spreng.) Hieron. var. *xylophylloides* Baker, *Eupatorium dendroides* Baker var. *xylophylloides* (DC.) Baker, *Eupatorium xylophylloides* DC., *Raulinoreitzia tremula* (Hook. & Arn.) R.M.King & H. Rob.
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1974, 1989.
Diagnosis: Arbusto glabro; hojas linear-lanceoladas, aserradas; flores 5, violáceas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos y modificados
Distrito: PET.
Partido: BER, ENS, LPT, SID, SFR, TIG.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 4424* (LP).

148. *Eupatorium tweedianum* Hook. & Arn.
Sin.: *Austroeupatorium tweedianum* (Hook. & Arn.) R.M.King & H. Rob., *Eupatorium erigeroides* DC., *Eupatorium steviifolium* DC. var. *erigeroides* (DC.) Baker, *Eupatorium steviifolium* DC. var. *viscosum* Chodat, *Hatschbachiella tweediana* (Hook. & Arn.) R.M.King & H. Rob.
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954, 1963; Cabrera, 1974, 1978, 1996.
Diagnosis: Sufrútice erecto, pubescente; hojas lanceoladas, aserradas; flores 15-25, blancas o violáceas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos arenosos y campos húmedos, en pircas y roquedales entre fisuras y grietas
Distrito: PPA, PPR.
Partido: OLA, SNC, TAN.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 7148* (LP).

Facelis Cass., Inuleae

149. *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip.
Sin.: *Facelis apiculata* Cass., *Gnaphalium retusum* Lam., *Helichrysum retusum* Spreng., *Leptalea apiculata* Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974.
Diagnosis: Hierba anual, pubescente; hojas espatuladas; flores blanco-crema
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En roquedales aflorantes, entre grietas y en terrenos arenosos, húmedos y soleados
Distrito: PEC, PPA, PPR.
Partido: BAL, CDR, CHA, ESC, GJM, GPU, JUN, LPT, MAG, PEL, SAA, TAN, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: Alimenticia (infusiones)
Ejemplar examinado: *Cabrera 8567* (LP).

150. *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. ssp. ***patula*** Beauverd
Ref.: Cabrera, 1963, 1971.
Diagnosis: Se diferencia de la subespecie *retusa* por la presencia de tallos decumbentes
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares secos o pedregosos
Distrito: PPA.
Partido: CSZ, PUA, SAA, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Burkart 4725* (LP).

145

148



146



149



147



150

Flaveria Juss., Heleniеae

151. *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze
N. Vulgar: Balda, Chasca, Contrahierba, Contrayerba, Fique, Flor amarilla, Mata gusanos, Nacunan, Pique, Solo, Tuntusa, Valda
Sin.: *Ethulia bidentis* L., *Eupatorium chilense* Molina, *Flaveria bonariensis* DC., *Flaveria capitata* Juss., *Flaveria chilensis* Juss., *Flaveria contrayerba* (Cav.) Pers., *Milleria chiloensis* Juss., *Milleria contrayerba* Cav., *Vermifuga corymbosa* Ruiz & Pav.
Ref.: Powell, 1978; Petenatti & Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba; capítulos reunidos en glomérulos densos y capituliformes
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares húmedos, arenosos o suelos modificados
Distrito: PEC, PPR.
Partido: BBL, CAS, DOL, GJM, LPT, LZA, MAI, SAD, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Tintórea
Ejemplar examinado: *Cabrera 186* (LP).

152. *Flaveria haumanii* Dimitri & Orfila
Sin.: *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze var. *angustifolia* Kuntze
Ref.: Dimitri & Orfila, 1986; Petenatti & Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba; capítulos reunidos en glomérulos algo laxos y alargados, no capituliformes
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares húmedos, arenosos o suelos modificados
Distrito: PEC, PPA, PPR.
Partido: SAD, TRQ, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 6426* (LP).

Gaillardia Foug., Heleniеae

153. *Gaillardia aristata* Pursh
Ref.: Cabrera 1963; Petenatti & Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba; hojas enteras o sinuadas, flores del margen liguladas, páleas del papus cortas, aristadas en el ápice
Status: Cultivada, Introducida
Categoría: NT.
Ecología: En calles o rastrojos
Distrito: PPR.
Partido: LPT.
Prov. limítrofe: No existen referencias
Uso: Insecticida; Ornamental
Ejemplar examinado: *Cabrera 1341* (LP).

154. *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker
N. Vulgar: Sume, Topasaire, Zuma
Sin.: *Actinea heterophylla* Juss. var. *latifolia* Kuntze, *Cercostylos brasiliensis* (Less.) Less., *Gaillardia doniana* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *discoidea* Griseb., *Guntheria megapotamica* Spreng., *Polypteris brasiliensis* Less.
Ref.: Biddulph, 1944; Cabrera, 1974; Bierner, 1987.
Diagnosis: Sufrútice; hojas enteras con algún diente o lóbulo en el margen; todas las flores tubulosas, páleas del papus largas, trífidas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En estepas, suelos secos o arenosos
Distrito: PEC, PET, PPA, PPO.
Partido: BBL, CLR, CSZ, GPU, GVL, LBR, LIN, LPT, MHR, OLA, PAT, PEH, PEL, PIN, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 135* (LP).

155. *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker var. ***radiata*** (Griseb.) Baker
N. Vulgar: Topsaire
Sin.: *Gaillardia scabiosoidea* (Arn.) Benth. & Hook. var. *radiata* Griseb.
Ref.: Biddulph, 1944; Cabrera, 1974; Petenatti & Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Sufrútice; hojas enteras con algún diente o lóbulo en el margen a profundamente pinnatífidas; flores del margen liguladas, páleas del papus largas, trífidas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En cercos y terrenos baldíos, al borde de caminos, médanos
Distrito: PET.
Partido: PIN.
Prov. CDB, ERI, PAM.
Uso: Medicinal; Ornamental
Ejemplar examinado: *Cabrera 657* (LP).

156. *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker var. ***scabiosoidea*** (Arn. ex DC.) Baker
N. Vulgar: Topsaire
Sin.: *Cercostylos scabiosoides* Arn. ex DC., *Gaillardia scabiosoidea* (Arn.) Benth. & Hook. f.
Ref.: Biddulph, 1944; Cabrera, 1974; Petenatti & Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Sufrútice; hojas profundamente pinnatisectas; flores tubulosas, páleas del papus largas, trífidas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos, médanos, barrancas
Distrito: PEC, PET, PPA.
Partido: BBL, CDR, CLR, CSZ, MHR, PAT, PIN, TRQ, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera & Fabris 16435* (LP).

151



154



152



155



153



156

GALINSOGA RUIZ & PAV., HELIANTHEAE

157. *Galinsoga parviflora* Cav.
Sin.: *Adventina parviflora* Raf., *Galinsoga quinqueradiata* Ruiz & Pav., *Wiborgia acmella* Roth, *Wiborgia parviflora* (Cav.) Kunth
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hierba anual; hojas ovadas; capítulos en cimas; papus ausente en las flores del margen y formado por pajitas laciniadas en las flores del disco
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados, ruderal
Distrito: PEC, PET, PMT, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: Ampliamente distribuida.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Forrajera; Medicinal
Ejemplar examinado: *Sáenz 1541* (LP).

GAMOCHAETA WEDD., INULEAE

158. *Gamochaeta americana* (Mill.) Wedd.
N. Vulgar: Vira-vira
Sin.: *Gamochaeta americana* (Mill.) Wedd. var. *alpina* Wedd., *Gamochaeta guatemalensis* (Gand.) Cabrera, *Gnaphalium americanum* Mill., *Gnaphalium consanguineum* Gaudich., *Gnaphalium guatemalense* Gand., *Gnaphalium purpureum* L. var. *americanum* (Mill.) Klatt
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1978; Nesom, 1990.
Diagnosis: Hierba multicaule, bienal o perenne, pubescente; hojas espatuladas, discoloras; filarios acuminados; flores amarillentas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos altos y secos, sobre rocas aflorantes y entre pastos, ca. 875 m.s.m.
Distrito: PPA.
Partido: BAL, GAL, MHR, PEL, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, RNG, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 5547* (LP).

159. *Gamochaeta argentina* Cabrera
Ref.: Cabrera, 1961.
Diagnosis: Hierba multicaule, anual o bienal, grís-seo-pubescente; hojas espatuladas; filarios largamente apiculados; flores amarillentas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En estepas y praderas prístinas, frecuentemente entre rocas
Distrito: PPA, PPR.
Partido: BAL, CDR, LPT, PUA, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Dawson 826* (LP).

160. *Gamochaeta calviceps* (Fernald) Cabrera
N. Vulgar: Vira-vira
Sin.: *Gnaphalium calviceps* Fernald
Ref.: Cabrera, 1961, 1963, 1974, 1978.
Diagnosis: Hierba multicaule, anual o perenne; canescente; hojas oblanceoladas; filarios agudos; flores amarillentas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos arenosos y a orillas de campos y vías férreas
Distrito: PPO, PPR.
Partido: GVL, PEL, TOR.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 7978* (LP).

161. *Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguélen
Sin.: *Gamochaeta spicata* (Lam.) Cabrera, *Gnaphalium coarctatum* Willd., *Gnaphalium spicatum* Lam. hom. illeg., *Gnaphalium purpureum* var. *spicatum* (Lam.) Baker
Ref.: Cabrera, 1961, 1963, 1974, 1978; Freire & Iharlegui, 1997.
Diagnosis: Hierba perenne, pubescente; hojas espatuladas, discoloras; filarios obtusos; flores amarillentas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En médanos, céspedes en praderas y laderas graminosas, a orillas de caminos en terrenos quebrados y húmedos
Distrito: PET, PNE, PPA, PPR.
Partido: BAL, BER, CHM, CSZ, ENS, GAL, GJM, GLV, HUR, JUN, LPT, LUJ, MAG, MHR, NEC, QUI, RAM, SAA, TAN, TAP, TIG, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, DF.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Dawson 784* (LP).

162. *Gamochaeta falcata* (Lam.) Cabrera
Sin.: *Gamochaeta stagnalis* (I.M. Johnst.) Anderb., *Gnaphalium falcatum* Lam., *Gnaphalium heteroides* Klatt, *Gnaphalium purpureum* L. var. *falcatum* (Lam.) Torr. & Gray, *Gnaphalium stachydifolium* Lam. var. *falcatum* (Lam.) Klatt, *Gnaphalium stagnale* I.M. Johnst.
Ref.: Cabrera, 1961, 1963, 1974; Nesom, 1990.
Diagnosis: Hierba multicaule, perenne; canescente; tallos ramosos; hojas lineares; filarios agudo-acuminados; flores amarillentas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En médanos, dunas y pastizales con afloramientos rocosos
Distrito: PEC, PNE, PPA.
Partido: AVE, CSZ, MHR, SAA, TRQ, VIL.
Prov. limítrofe: CDB.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 5426* (LP).



157



160



158

161



159

162

163. *Gamochaeta filaginea* (DC.) Cabrera
N. Vulgar: Perkán-perkán, Vira-vira
Sin.: *Gnaphalium filagineum* DC.
Ref.: Cabrera, 1961, 1963, 1974.
Diagnosis: Hierba multicaule, perenne, argenteo-pubescente; tallos simples; hojas lineares; filarios agudo-acuminados; flores amarillentas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En estepas graminosas alto-serranas, sobre laderas umbrías, dunas fijas, y a orillas de ríos sobre suelos cubiertos de conchilla
Distrito: PNE, PPA, PPR.
Partido: CSZ, ESC, IMG, JUN, LPT, MAG, PUA, SAA, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Burkart 4726* (LP).

164. *Gamochaeta pensylvanica* (Willd.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium pensylvanicum* Willd., *Gnaphalium peregrinum* Fernald, *Gnaphalium purpureum* L. var. *spathulatum* (Lam.) Baker, *Gnaphalium spathulatum* Lam., hom. illeg.
Ref.: Cabrera, 1961, 1963, 1974, 1978.
Diagnosis: Hierba multicaule, bienal o perenne, albo-pubescente; hojas espatuladas; filarios acuminados; flores amarillentas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados, al borde de caminos, asociadas a vegetación secundaria en suelos arenosos
Distrito: PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: BBL, ENS, LIN, LPT, TIG.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 2236* (LP).

165. *Gamochaeta platensis* (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium platense* Cabrera
Ref.: Cabrera, 1961, 1963.
Diagnosis: Hierba multicaule, bienal o perenne, glandulosa; hojas espatuladas; filarios largamente acuminados; flores amarillentas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares húmedos y sombríos, sobre dunas fijas, en ocasiones asociadas a vías férreas
Distrito: PPA, PPO, PPR.
Partido: CDR, JUN, LPT, PEL, TRQ.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 6582* (LP).

166. *Gamochaeta simplicicaulis* (Willd. ex Spreng.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium simplicicaule* Willd. ex Spreng., *Gnaphalium purpureum* L. var. *simplicicaule* (Willd. ex Spreng.) Klatt
Ref.: Cabrera, 1961, 1963, 1974, 1978.
Diagnosis: Hierba anual, canescente; hojas oblanceoladas, discoloras; flores amarillentas; filarios agudos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En dunas semifijas, sobre terrenos húmedos y fértiles
Distrito: PET, PNE.
Partido: DEL, GJM, GLV.
Prov. limítrofe: CDB, DF.
Uso: Ritual
Ejemplar examinado: *Cabrera 2713* (LP).

167. *Gamochaeta stachydifolia* (Lam.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium stachydifolium* Lam., *Gnaphalium purpureum* L. var. *stachydifolium* (Lam.) Baker
Ref.: Cabrera, 1961, 1963, 1971.
Diagnosis: Hierba multicaule, perenne, albo-pubescente; hojas espatuladas; filarios agudo-acuminados; flores amarillentas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes naturales, formando manchones por encima de los 400 m..s.m.
Distrito: PPA.
Partido: BAL, CSZ, LBR, SAA, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 4715* (LP).

168. *Gamochaeta subfalcata* (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium subfalcatum* Cabrera
Ref.: Cabrera, 1961, 1963, 1974, 1978.
Diagnosis: Hierba multicaule, anual, pubescente; hojas obovadas a linear-obovadas; filarios agudos; flores amarillentas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En dunas próximas al mar, albardones arenosos, estepas, salitrales, potreros y cercanas a las vías férreas
Distrito: PET, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: BBL, CDR, ENS, IMG, JUN, LPT, MAG, MAI, MHR, PEL, SAA, TRQ, VMA.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 8088* (LP).



163



166

164



167



165

168

GNAPHALIUM L., INULEAE

169. *Gnaphalium cabrerae* S. E. Freire
N. Vulgar: Caa-guazú
Sin.: *Gnaphalium fastigiatum* Phil., hom. illeg., *Gnaphalium philippii* Cabrera, hom. illeg.
Ref.: Cabrera, 1963; Freire (Zuloaga & Morrone, 1999).
Diagnosis: Hierba perenne, albo-pubescente; hojas lanceoladas; flores amarillentas; filarios obtusos
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En ambientes modificados, al borde de caminos, ca. 350 m.s.m..
Distrito: PPA.
Partido: BAL, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Ruiz Leal & Roig 18813* (LP).

170. *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam.
N. Vulgar: Huira-huira, Marcela, Marcela macho, Marcelita, Vira-vira, Yerba de la vida
Sin.: *Gnaphalium acutifolium* Phil., *Gnaphalium araucanum* Phil., *Gnaphalium citrinum* Hook. & Arn., *Gnaphalium paniculatum* Colla, *Gnaphalium valdivianum* Phil., *Pseudognaphalium cheiranthifolium* (Lam.) Hillart & Burtt
Ref.: Cabrera, 1941, 1963, 1974, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne, albo-pubescente, glandulosa; hojas lineares; filarios agudos; flores amarillentas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En laderas, ca. 850 m.s.m.
Distrito: PPA.
Partido: LBR, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 5776* (LP).

171. *Gnaphalium gaudichaudianum* DC.
N. Vulgar: Caa-guazú
Sin.: *Gnaphalium mendocinum* Phil., *Pseudognaphalium gaudichaudianum* (DC.) Anderb.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978.
Diagnosis: Hierba anual, tomentosa; hojas lineares, discoloras; filarios obtusos; flores amarillentas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En potreros, al costado de las vías férreas, en estepas arenosas
Distrito: PET, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: BAL, DEL, GVL, LIN, LPT, LZA, MHR, PEH, PEL, TIG, TLQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, RNG, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 10245* (LP).

172. *Gnaphalium leucopeplum* Cabrera
Sin.: *Pseudognaphalium leucopeplum* (Cabrera) Anderb.
Ref.: Cabrera, 1961, 1971, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne, albo-pubescente; hojas lineares; filarios subobtusos; flores amarillentas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos arenosos y dunas cerca del mar
Distrito: PEC, PPA, PPO.
Partido: CLR, GPU, LBR, MHR, PEL, TRQ, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Fabris 5629* (LP).

173. *Gnaphalium montevidense* Spreng.
Sin.: *Gnaphalium subnudum* Phil., *Pseudognaphalium montevidense* (Spreng) Anderb.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971.
Diagnosis: Hierba multicaule, perenne, pubescente; hojas linear-obovadas; filarios obtusos; flores amarillentas
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En suelos secos, arenosos, ca. 800 m.s.m.
Distrito: PEC, PPA.
Partido: MHR, PAT.
Prov. limítrofe: RNG.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Ringuelet 642* (LP).

GRINDELIA WILLD., ASTEREAE

174. *Grindelia aegialitis* Cabrera
Ref.: Cabrera, 1931, 1963; Bartoli y Tortosa, 1999.
Diagnosis: Sufrútice rastrero, pubescente; hojas obovadas, semi-amplexicaules; capítulos solitarios, radiados, invólucro pubescente; flores amarillas; papus formado por 6-10 cerdas gruesas
Status: Endémica
Categoría: V.
Ecología: En dunas y suelos pedregosos
Distrito: PET, PPA.
Partido: CAL, GPU, MCH, TAN.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Molfino & Clos 288* (LP).

169



172



170

173

171



174

175. *Grindelia brachystephana*
Sin.: *Grindelia bergii* (Hieron.) Cabrera, *Grindelia brachystephana* Griseb. var. *bergii* Hieron., *Grindelia diffusa* D. Don ex DC., *Grindelia tehuelches* (Speg.) Cabrera, *Haplopappus patagonicus* Speg. hom. illeg.), *Haplopappus tehuelches* Speg.
Ref.: Cabrera, 1944, 1971, 1974; Bártoli y Tortosa, 1999.
Diagnosis: Sufrútice; hojas pubescentes, obovadas y semi-amplexicaules; capítulos radiados, involucro pubescente; flores amarillas; papus formado por 6-10 cerdas gruesas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En salitrales, al borde de caminos o en terrenos arenosos y suelos húmedos
Distrito: PEC, PMT, PPA, PPO.
Partido: BAL, BBL, CAÑ, CLR, GLM, GUA, LPT, MAG PAT, TAY, TRQ, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 9886* (LP).

176. *Grindelia buphthalmoides* DC.
Ref.: Cabrera, 1963; Bártoli y Tortosa, 1999.
Diagnosis: Arbusto glabro; hojas espatuladas, semi-amplexicaules; capítulos solitarios, radiados; flores amarillas; papus formado por 8-15 aristas desiguales
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En roquedales de sierras, lugares húmedos
Distrito: PPA.
Partido: BAL, CPR, SAA, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: No existen referencias
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 4749* (LP).

177. *Grindelia chiloensis* (Cornel.) Cabrera
N. Vulgar: Botoncito, Melosa, Melosilla
Sin.: *Grindelia foliosa* D. Don. ex Hook. & Arn., *Grindelia resinosa* Gillies ex Hook. & Arn., *Grindelia speciosa* Gillies ex Hook. & Arn., *Grindelia speciosa* Gillies ex Hook. & Arn. var *integrifolia* Speg., *Grindelia volkensii* Kuntze var. *angustifolia* Kuntze, *Grindelia volkensii* Kuntze var. *latifolia* Kuntze, *Haplopappus hoorebekia* DC., nom. illegit., *Helianthus australis* Phil., *Hoorebekia chiloensis* Cornel.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971; Bártoli y Tortosa, 1994.
Diagnosis: Sufrútice glanduloso; hojas obovadas, más densas en la parte basal del tallo; capítulos solitarios, radiados; flores amarillas; papus formado por 8-10 cerdas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En estepas
Distrito: PEC, PPA.
Partido: PAT.
Prov. limítrofe: PAM.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera & Fabris 14893* (LP).

178. *Grindelia pulchella* Dunal
N. Vulgar: Botoncito, Pichanilla amarilla, Quilcha amarilla
Sin.: *Grindelia diffusa* Gillies ex Hook. & Arn., *Grindelia pulchella* Dunal var. *normalis* Kuntze, *Grindelia pulchella* Dunal var. *serratifolia* Kuntze, *Grindelia pulchella* Dunal var. *sublinearis* Kuntze
Ref.: Cabrera, 1963, 1978, Bártoli y Tortosa, 1999.
Diagnosis: Sufrútice; hojas glabras ovado-oblongas; capítulos solitarios, radiados, invólucro glabro; flores amarillas; papus formado por 3-6 cerdas gruesas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos modificados
Distrito: PPR.
Partido: CAM, LPT, SFR, TIG.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, SFE.
Uso: Medicinal; Tintórea
Ejemplar examinado: *Cabrera 10002* (LP).

179. *Grindella pulchella* var. ***discoidea*** (Hook. & Arn.) A. Bartoli & Tortosa.
N. Vulgar: Botón de oro, vácomo
Sin.: *Grindelia anomala* DC, *Grindelia discoidea* Hook. & Arn..
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Bártoli y Tortosa, 1999.
Diagnosis: Sufrútice; hojas glabras, lanceoladas, angostas; capítulos discoideos, pequeños, glandulosos, invólucro glabro; flores amarillas; papus formado por 2-5 aristas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos bajos, sobre suelos arcillosos o algo salados, usualmente junto a las vías férreas
Distrito: PNE, PET, PPA, PPR.
Partido: AVE, AZU, BBL, BNJ, CAÑ, CTJ, FVL, LPT, MAG, MON, OLA, PEH, RAU, SFR, SVT, TAN, TIG.
Prov. limítrofe: CDB, DF.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 5811* (LP).

180. *Grindelia scorzonerifolia* Hook. & Arn.
Sin.: *Grindelia pectinata* Baker, *Grindelia scorzonerifolia* Hook. & Arn. var. *pectinata* (Baker) Hassl., *Grindelia scorzonerifolia* Hook. & Arn. var. *subintegra* Hassl.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974.
Diagnosis: Sufrútice; hojas subglabras, lineares a veces pinnatífidas; capítulos radiados, invólucro glabro; flores amarillas; papus formado por 2-4 cerdas gruesas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos modificados
Distrito: PET, PPR.
Partido: ESC,HUR, LMT, SPD, ZAR.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 5602* (LP).



175

178



176



179

177



180

181. *Grindelia ventanensis* Bartoli & Tortosa
Ref.: Bartoli & Tortosa, 1994, 1999.
Diagnosis: Sufrútice postrado, glanduloso, con ramas radicantes; hojas elípticas; capítulos radiados; flores amarillas; papus formado por 4-6 aristas
Status: Endémica
Categoría: NT.
Ecología: En roquedales
Distrito: PPA.
Partido: BNJ, SAA, TAN, TRQ.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Ponce 71* (LP).

Gutierrezia Lag., Astereae

182. *Gutierrezia gilliesii* Griseb.
N. Vulgar: Canchalahua
Sin.: *Gutierrezia leucantha* Cabrera, *Gutierrezia mandonii* (Sch. Bip.) Solbrig ssp. *gilliesii* (Griseb.) Solbrig, *Gutierrezia spathulata* (Phil.) Kurtz var. *gillesii* (Griseb.) Kuntze
Ref.: Cabrera, 1971; Solbrig, 1966.
Diagnosis: Arbusto glabro, glanduloso; hojas lineares; capítulos radiados en seudocorimbos laxos, filarios externos glabros, con un apéndice linear; flores del margen blancas; papus formado por 10-20 pajitas
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En áreas serranas
Distrito: PPA.
Partido: TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera & Fabris 41* (LP).

Gymnocoronis DC., Eupatorieae

183. *Gymnocoronis spilanthoides* (Hook. & Arn.) DC.
N. Vulgar: Jazmín de bañado
Sin.: *Alomia spilanthoides* Hook & Arn., *Gymnocoronis attenuata* DC, *Gymnocoronis spilanthoides* DC. var. *attenuata* (DC.) Baker.
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1974; Sáenz, 1996; Cabrera & Freire, 1997.
Diagnosis: Hierba perenne, glabra; hojas lanceoladas; flores numerosas, blancas y tubulosas; aquenios sin papus.
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares inundados, frecuentes en lagunas ribereñas y bañados
Distrito: PET, PNE.
Partido: DEL, ENS, IMG, LPT, TIG.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 1709* (LP).

184. *Gymnocoronis spilanthoides* (Hook. & Arn.) DC. var. ***subcordata*** (DC.) Baker
Sin.: *Gymnocoronis subcordata* DC.
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1974; Cabrera & Freire, 1997.
Diagnosis: Hojas ovadas o más o menos acorazonadas en la base
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares inundados y bañados
Distrito: PET.
Partido: DEL, ENS, LPT.
Prov. limítrofe: DF, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (LPS 11311, LP).

Hedypnois Schreb., Cichorieae

185. *Hedypnois cretica* (L.) Dum. Cours
Sin.: *Hedypnois cretica* (L.) Willd., com. superfl., *Hedypnois polymorpha* DC, *Hyoseris cretica* L.
Ref.: Cabrera, 1963; Ariza Espinar & Urtubey, 1998.
Diagnosis: Hierba anual, con látex; hojas basales semi-arrosetadas, las caulinares amplexicaules; capítulos solitarios; flores amarillas; papus formado por una coronita membranácea y una pálea lineal.
Status: Adventicia, Maleza
Categoría: NT.
Ecología: En suelos modificados
Distrito: PET, PPR.
Partido: LPT, PIN.
Prov. limítrofe: DF, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Burkart 9793* (LP).

Helenium L., Helenieae

186. *Helenium radiatum* (Less.) Seckt
Sin.: *Actinea alternifolia* Spreng., nom. superfl., *Actinea heterophylla* Juss., *Actinella heterophylla* (Juss.) Pers. com. superfl., *Actinea heterophylla* Juss. f. *bicolor* Kuntze, nom. superfl., *Actinea heterophylla* Juss. var. *dentata* Kuntze, nom. superfl., *Actinea radiata* (Less.) Kuntze, *Cephalophora heterophylla* (Juss.) Less., *Cephalophora radiata* Less., *Helenium alternifolium* (Spreng.) Cabrera, *Helenium heterophyllum* (Juss.) Malme, hom. illeg., *Helenium mattfeldianum* Herter, nom. superfl., *Helenium radiatum* (Less.) Bierner, comb. superfl.
Ref.: Bierner, 1987; Ariza Espinar, 1993a; Petenatti & Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba o subarbusto; hojas enteras a pinnatisectas, las hojas y brácteas involucrales sin bolsas oleíferas; receptáculo sin cerdas; aquenios pubescentes; papus paleáceo
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos arcilloso-arenosos, al borde de caminos
Distrito: PPA.
Partido: BBL, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: DF, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Gamerro 1192* (LP).

181

184



182

185



183



186

Helianthus L., Heliantheae

187. *Helianthus annuus* L.
N. Vulgar: Girasol, mirasol
Sin.: *Helianthus aridus* Rydb., *Helianthus erythrocarpus* Barth, *Helianthus indicus* L., *Helianthus lenticularis* Douglas, *Helianthus macrocarpus* DC., *Helianthus multiflorus* Hook., *Helianthus ovatus* Lehm., *Helianthus platycephalus* Cass., *Helianthus tubaeformis* Nutt.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hierba anual; hojas anchamente ovadas; capítulos pedunculados, solitarios; papus ausente o con dos aristas caducas
Status: Naturalizada
Categoría: NT.
Ecología: En rastrojos y borde de caminos
Distrito: PET, PNE, PPR.
Partido: CSM, GSM, LPT, RAU, SFR, TIG, TFB.
Prov. limítrofe: ERI, PAM.
Uso: Afrodisíaca; Alimenticia; Industrial; Medicinal
Ejemplar examinado: *Delucchi 630* (BAA).

188. *Helianthus laetiflorus* Pers.
Sin.: *Helianthus laetiflorus* Pers. var. *tricuspis* Torr. & A. Gray, *Helianthus scaberrimus* Elliott, *Helianthus tricuspis* Elliott
Ref.: Cabrera & Zardini, 1978; Sala *et al.*, 1990.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas ovado-lanceoladas, pecíolo alado; capítulos largamente pedunculados, solitarios o en cimas corimbiformes; papus con dos aristas caducas
Status: Naturalizada
Categoría: NT.
Ecología: En suelos modificados
Distrito: PET, PPA.
Partido: BAL, LPT, TAN.
Prov. limítrofe: No existen referencias
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Echarte & Sala 135* (BAL).

189. *Helianthus petiolaris* Nutt.
N. Vulgar: Girasol silvestre, Mirasolcito
Sin.: *Helianthus integrifolius* Nutt., *Helianthus integrifolius* Nutt. var. *gracilis* Nutt., *Helianthus patens* Lehm., *Helianthus petiolaris* Nutt. var. *patens* Rydb., *Helianthus praecox* Engelm. & A. Gray
Ref.: Cabrera, 1974; Cabrera & Zardini, 1978; Troiani, 1984.
Diagnosis: Hierba anual; hojas anchamente ovadas; capítulos pedunculados, en número de 2-4; papus con dos aristas caducas
Status: Naturalizada
Categoría: NT.
Ecología: En suelos modificados
Distrito: PPR.
Partido: CHA, SAD.
Prov. limítrofe: ERI, PAM.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Burkart et al. 26401* (LP).

190. *Helianthus tuberosus* L.
N. Vulgar: Topinambur
Sin.: *Helianthus esculentus* Warsz., *Helianthus serotinus* Tausch
Ref.: Cabrera, 1974.
Diagnosis: Hierba perenne con rizomas tuberosos; hojas ovadas; capítulos pequeños en cimas; papus con dos aristas caducas
Status: Naturalizada
Categoría: NT.
Ecología: En suelos modificados
Distrito: PNE.
Partido: LPT.
Prov. limítrofe: ERI, PAM.
Uso: Alimenticia, Forrajera; Medicinal; Ornamental
Ejemplar examinado: *Sáenz 1539* (LP).

Hieracium L., Cichorieae

191. *Hieracium burkartii* Sleumer
Ref.: Sleumer, 1956; Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex; hojas basales arrosetadas, las caulinares sésiles; filarios hirsutos, glandulosos; aquenio truncado en el ápice; papus piloso
Status: Endémica
Categoría: R.
Ecología: En áreas serranas
Distrito: PPA.
Partido: SAA, TRQ.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Hicken 9191* (SI).

192. *Hieracium chacoense* (Zahn) Sleumer
Sin.: *Hieracium paraguayense* Arv.-Touv. ssp. *ventanicum* Zahn var. *chacoense* Zahn
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex; hojas setosas o glabras, filarios no glandulosos; aquenio truncado en el ápice; papus piloso
Status: Endémica
Categoría: R.
Ecología: En roquedales
Distrito: PPA.
Partido: TRQ.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Proyecto Ventania 425* (LP).



187

190



188



191



189



192

193. *Hieracium palezieuxii* Zahn
Ref.: Sleumer, 1956; Cabrera, 1953.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex; hojas con cerdas rígidas, abundantes; filarios con pubescencia amarillo lanosa-glandulosa; aquenio truncado en el ápice; papus piloso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En pastizales
Distrito: PPA.
Partido: BAL, OLA, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Proyecto Ventania 463a* (SI).

194. *Hieracium tandilense* Sleumer
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex; filarios con pubescencia amarillo lanosa-glandulosa; aquenio truncado en el ápice; papus piloso
Status: Endémica
Categoría: R.
Ecología: En áreas serranas
Distrito: PPA.
Partido: TAN.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Fabris 3711* (LP).

Holocheilus Cass., Mutisieae

195. *Holocheilus brasiliensis* (L.) Cabrera
Sin.: *Cacalia scabra* Vahl, *Cleanthes brasiliensis* (L.) D. Don, *Cleanthes ochroleuca* (Cass.) Parodi, *Cleanthes othonoides* (Less.) Griseb., *Holocheilus ochroleucus* Cass., *Leuceria echioides* D. Don, *Perdicium brasiliense* L., *Perezia ochroleuca* (Cass.) Less., *Platycheilus ochroleucus* Cass., *Trixis brasiliensis* (L.) DC., *Trixis brasiliensis* (L.) DC. var. *genuina* Hassler nom. inval., *Trixis brasiliensis* (L.) DC. var. *sellowii* (Less.) Hassler, *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn., *Trixis othonoides* (Less.) Griseb., *Trixis sellowii* Less. ex DC.
Ref.: Cabrera, 1968; Katinas, 1995.
Diagnosis: Hierba estrigoso-pubescente; hojas basales arrosetadas, oblanceolado-espatuladas; flores blancas, bilabiadas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos rocosos y estepas
Distrito: PPA, PPO, PPR.
Partido: BAL, CPR, CSZ, GAL, JUN, LIN, OLA, PER, PUA, SAA, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: Alimenticia
Ejemplar examinado: *Dawson & Nuñez 42* (LP).

196. *Holocheilus hieracioides* (D. Don) Cabrera
Sin.: *Cleanthes hieracioides* D. Don, *Cleanthes hieracioides* D. Don var. *thrincioides* Griseb., *Leuceria conyzoides* D. Don, *Leuceria thrincioides* Griseb., *Trixis hieracioides* (D. Don) DC., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn., hom. illeg., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *pusilla* Hassler, *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *robusta* Hassler, *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *subintegra* Hassler, *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook & Arn. var. *hieracioides* (D. Don) Kuntze, *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. var. *thrincioides* (Griseb.) Kuntze, *Trixis sonchoides* Chodat, *Trixis thrincioides* (Griseb.) Hassler
Ref.: Cabrera, 1968; Katinas, 1995.
Diagnosis: Hierba glabra; hojas basales arrosetadas, de oblanceolado a espatuladas; flores blancas, bilabiadas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos y salobres
Distrito: PET, PNE, PPR.
Partido: AVE, CAM, ENS, ESC, GPI, LPT, PLR, QUI, SFR, SID, SNC, SPD, TIG.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 7947* (LP).

Hyalis D.Don ex Hook. & Arn., Mutisieae

197. *Hyalis argentea* Hook. & Arn. var. ***latisquama*** Cabrera
N. Vulgar: Olivillo, Olivo
Ref.: Cabrera, 1951; Freire, 1996.
Diagnosis: Subarbusto; hojas enteras; flores 5, las del margen 4-5, bilabiadas, las del disco tubulosa
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En médanos
Distrito: PEC, PMT, PPA.
Partido: BBL, CSZ, MHR, PAT, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Pertusi 259* (LP).

Hymenoxys Cass., Helenieae

198. *Hymenoxys anthemoides* (Juss.) Cass.
N. Vulgar: Botón-botón, Manzanilla, Manzanilla cimarrona, Manzanilla del campo, Topasaire, Toposaire, Topsaire
Sin.: *Actinea anthemoides* (Juss.) Kuntze, *Actinea haenkeana* (DC.) Kuntze, *Actinella anthemidoides* (Juss.) A. Gray, *Actinella anthemioides* (Juss.) Malme comb. superfl., *Actinella anthemoides* (Juss.) Herter comb. illeg., *Hymenopappus anthemoides* Juss., *Hymenoxys haenkeana* DC., *Hymenoxys parodii* Johnst.
Ref.: Parker, 1962; Petenatti & Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba anual con tallos ascendentes; capítulos discoideos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos salobres o arenosos, vías férreas, praderas
Distrito: PET, PNE, PPR.
Partido: CAM, ENS, ESC, GLV, LPT, MAG, PER, PLR, QUI, SNC, SPD, TIG, ZAR.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, SFE.
Uso: Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 2480* (LP).

193



196



194



197



195



198

199. *Hymenoxys cabrerae* K.L. Parker
Ref.: Parker, 1962; Petenatti & Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba anual erecta; hojas pinnatisectas; capítulos discoideos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos salobres o arenosos
Distrito: PEC, PPO, PPR.
Partido: AAL, BBL, CDR, LFL, MAI, MHR, PAT, PEH, PUA, VIL.
Prov. limítrofe: PAM, RNG, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera & Fabris 14840* (LP).

200. *Hymenoxys tweediei* Hook. & Arn.
N. Vulgar: Arnica
Sin.: *Actinea tweediei* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Actinella tweediei* (Hook. & Arn.) Malme comb. superfl.
Ref.: Parker, 1962; Petenatti & Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba anual erecta; hojas pinnatisectas; capítulos radiados
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En praderas, suelos salinos o arenosos
Distrito: PET.
Partido: CAM.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Burkart et al. 30212* (LP).

Hypochaeris L., Cichorieae

201. *Hypochaeris chillensis* (Kunth) Hieron.
N. Vulgar: Achicoria, Achicoria del campo, Cerraja
Sin.: *Apargia chillensis* Kunth, *Achyrophorus brasiliensis* (Less.) Sch.Bip., *Achyrophorus chillensis* (Kunth) Sch.Bip., *Achyrophorus chilensis* Sch.Bip., *Achyrophorus sagittatus* Phil., *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb.; *Hypochaeris brasiliensis* var. *tweediei* (Hook. & Arn.) Baker, *Hypochaeris tweediei* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Leontodon chilense* DC., *Porcellites brasilienses* Less, *Seriola brasiliensis* Less., *Seriola tweediei* Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera, 1976, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex; hojas basales arrosetadas, las caulinares semi-amplexicaules; receptáculo paleáceo, flores amarillas; aquenios largamente rostrados; papus plumoso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En jardines, rastrojos y costas ribereñas
Distrito: PET, PNE, PPR.
Partido: CCR, DEL, EEV, ENS, GJM, GLV, IMG, JUN, LPT, SID, SPD, TIG, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 115* (LP).

202. *Hypochaeris chondrilloides* (A.Gray) Cabrera
Sin.: *Achyrophorus chondrilloides* A.Gray, *Achyrophorus deserticola* Phil., *Achyrophorus glaucus* Phil., *Hypochaeris glauca* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris glauca* (Phil.) Reiche f. *halofila* Hauman, *Hypochaeris halophila* (Hauman) Cabrera, *Oreophila chondrilloides* Don ex A.Gray
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba perenne, glauca, glabra, con látex; hojas basales algo carnosas, las caulinares linear-lanceolados; receptáculo paleáceo, flores amarillas; aquenios largamente rostrados; papus plumoso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En salinas
Distrito: PMT.
Partido: PAT.
Prov. limítrofe: CDB.
Uso: Industrial (Cauchífera)
Ejemplar examinado: *Cabrera et al.* 16769 (LP).

203. *Hypochaeris glabra* L.
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba anual, con látex; hojas basales arrosetadas, las caulinares pequeñas; receptáculo con páleas flageladas; flores amarillas; aquenios del margen truncados en el ápice, los del disco largamente rostrados; papus con una serie interna plumosa y la externa pilosa.
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En dunas
Distrito: PET, PPA, PPR.
Partido: CSZ, PIN, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: Forrajera
Ejemplar examinado: *Cabrera 1881* (LP).

204. *Hypochaeris grisebachii* Cabrera
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex; hojas basales arrosetadas; las caulinares pequeñas; receptáculo con páleas flageladas, flores amarillas; aquenios largamente rostrados; papus plumoso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En terrenos altos y campos
Distrito: PPA, PPR.
Partido: LPT, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 499* (LP).

199

202



200

203

201



204

205. *Hypochaeris megapotamica* Cabrera
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex; hojas basales arrosetadas, las caulinares pequeñas; receptáculo con páleas subuladas, flores amarillas; aquenios largamente rostrados y pubescentes; papus plumoso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En estepas
Distrito: PET, PPA, PPR.
Partido: BZT, ENS, LPT, TAN.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 6868* (LP).

206. *Hypochaeris microcephala* (Sch. Bip.) Cabrera
N. Vulgar: Achicoria, Achicoria del campo
Sin.: *Achyrophorus microcephalus* Sch.Bip., *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *microcephala* (Sch.Bip.) Baker, *Seriola brasilienses* Less. var. *parviflora* Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex; hojas basales arrosetadas, las caulinares lineares, sésiles; receptáculo paleáceo; flores amarillas; aquenios largamente rostrados; papus plumoso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos y fértiles
Distrito: PPR.
Partido: CHM, DEL, IMG, ITU, GLV, PER.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, SFE.
Uso: Alimenticia; Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 314* (LP).

207. *Hypochaeris microcephala* (Sch.Bip.) Cabrera var. ***albiflora*** (Kuntze) Cabrera
Sin.: *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *albiflora* Kuntze
Ref.: Cabrera, 1963, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex; hojas basales arrosetadas, las caulinares lineares, sésiles; receptáculo paleáceo; flores blancas; aquenios largamente rostrados; papus plumoso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos y fértiles
Distrito: PPR.
Partido: DEL, GLV, LPT, MER, PER.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Dawson 1011* (LP).

208. *Hypochaeris pampasica* Cabrera
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex; hojas basales arrosetadas, las caulinares pequeñas; receptáculo con páleas aristadas; flores amarillas; aquenios con rostro corto y pubescente; papus plumoso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos prístinos y estepas
Distrito: PEC, PET, PPA, PPO.
Partido: BBL, GAL, GVL, IMG, JUN, PEL, PER, PUA, TLQ, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 19456* (LP).

209. *Hypochaeris petiolaris* (Hook. & Arn.) Griseb.
Sin.: *Achyrophorus petiolaris* (Hook. & Arn.) DC., *Seriola petiolaris* Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex; hojas basales arrosetadas; receptáculo paleáceo; flores amarillas; aquenios largamente rostrados; papus plumoso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En praderas, suelos salobres
Distrito: PET, PPA, PPO, PPR.
Partido: AVE, CSZ, ENS, GJM, GVL, LPT.
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 8573* (LP).

210. *Hypochaeris radicata* L.
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex; hojas basales arrosetadas, las caulinares pequeñas; receptáculo paleáceo; flores amarillas; aquenios largamente rostrados; papus con serie interna plumosa y la externa pilosa
Status: Adventicia; Maleza
Categoría: NT.
Ecología: En praderas húmedas
Distrito: PET, PNE, PPA, PPR.
Partido: BAL, DEL, GJM, GLA, GPU, HUR, IMG, JUN, LPT, TAN, TIG.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI.
Uso: Alimenticia; Forrajera
Ejemplar examinado: *Cabrera 10703* (LP).



205



208



206



209



207



210

211. *Hypochaeris rosengurttii* Cabrera var. ***pinnatifida*** (Speg.) Cabrera
Sin.: *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *acutibracteata* Speg., *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *pinnatifida* Speg.
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex; hojas basales arrosetadas, las caulinares lineares, pequeñas; receptáculo con páleas aristadas; flores amarillas; aquenios con rostro corto; papus plumoso
Status: Endémica
Categoría: NT.
Ecología: En laderas de sierras, al borde de arroyos
Distrito: PPA.
Partido: BAL, SAA, TAN, TRQ.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 6670* (LP).

212. *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker
Sin.: *Achyrophorus variegatus* (Lam.) Sch.Bip., *Apargia variegata* (Lam.) Willd., *Hieracium variegatum* Lam., *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *glaucescens* Speg., *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *nana* Speg. *Leontodon variegatum* Willd. ex Poiret
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex; hojas basales arrosetadas, las caulinares pequeñas; receptáculo paleáceo; flores amarillo-anaranjadas; aquenios largamente rostrados; papus plumoso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lagunas, sierras, cerros, praderas
Distrito: PPA.
Partido: AZU, CPR, OLA, PUA, SAA, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera & Fabris 19609* (LP).

Hysterionica Willd., Astereae

213. *Hysterionica jasionoides* Willd.
Sin.: *Chrysopsis andicola* Phil., *Diplopappus hispidus* Gill., ex Hook. & Arn., *Erigeron mendocinus* Greene, *Heterochaeta hispida* DC., *Hysterionica intermedia* Hieron., nom. nudum
Ref.: Cabrera, 1946, 1963, 1971, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne, híspida; hojas ovadas, angostas; capítulos solitarios; flores amarillas; papus con una serie externa de pajitas cortas y una interna con pelos largos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En estepas prístinas, barrancas de ríos y sierras, usualmente asociadas a montes de chañar (*Geoffroea decorticans*)
Distrito: PEC, PMT, PPA, PPO.
Partido: AAL, BBL, PAT, SAA, TRQ, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 16284* (LP).

214. *Hysterionica pinifolia* (Poir.) Baker
Sin.: *Diplopappus pinifolius* Hook. & Arn., *Erigeron pinifolius* Poir., *Neja pinifolia* (Poip.) G. L. Nesom
Ref.: Cabrera, 1946, 1963.
Diagnosis: Subarbusto; hojas lineares; capítulos solitarios; flores amarillas; papus con una serie externa de pajitas cortas y una interna con pelos largos
Status: Endémica
Categoría: NT.
Ecología: En sierras, sobre suelos rocosos
Distrito: PPA.
Partido: BAL, GPU, LBR, PUA, SAA, TAN, TRQ.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 4450* (LP).

Jaegeria Kunth, Heliantheae

215. *Jaegeria hirta* (Lag.) Less.
Sin.: *Acmella hirta* Lag., *Eclipta bellidioides* (Spreng.) Sch. Bip. ex Blake, *Jaegeria bellidioides* Spreng., *Jaegeria discoidea* Klatt, *Jaegeria hirta* (Lag.) Less. var. *glabra* Baker, *Jaegeria mniodes* Kunth, *Jaegeria parviflora* DC., *Jaegeria repens* DC., *Spilanthes ecliptoides* Gardner, *Spilanthes karvinskiana* DC., *Spilanthes mariannae* DC., *Spilanthes sessilifolia* Hemsl.
Ref.: Cabrera, 1974, 1978; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hierba anual; hojas ovado-elípticas; capítulos pedunculados, solitarios o agrupados en cimas; papus ausente
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En la ribera platense
Distrito: PET, PNE.
Partido: BER, ENS, LUJ, TIG.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Sáenz 1439* (LP).

Jaumea Pers., Helenieae

216. *Jaumea linearifolia* (Juss.) DC.
Sin.: *Jaumea linearis* Pers., *Kleinia linearifolia* Juss.
Ref.: Cabrera 1963, 1971; Petenatti & Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas linear-subuladas; papus formado por pajitas muy estrechas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En juncales inundables y bañados, suelos salados
Distrito: PEC, PET.
Partido: BBL, GLV, PIN.
Prov. limítrofe: Representada también en Uruguay.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 4935* (LP).



211



214



212



215



213



216

Lactuca L., Cichorieae

217. *Lactuca saligna* L.
Ref.: Cabrera, 1963; Ariza Espinar & Urtubey, 1998.
Diagnosis: Hierba anual, inerme, con látex; capítulos en racimos espiciformes; flores amarillas; aquenios largamente rostrados; papus piloso
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En jardines
Distrito: PET, PPR.
Partido: AVE, CAM, GLV, LPT.
Prov. limítrofe: DF.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Burkart 1975* (LP).

218. *Lactuca serriola* L.
Sin.: *Lactuca scariola* L.
Ref.: Cabrera, 1963; Ariza Espinar & Urtubey, 1998.
Diagnosis: Hierba anual o bianual, con látex; hojas espinulosas; capítulos en panojas laxas; flores amarillas; aquenios largamente rostrados; papus piloso
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En suelos modificados
Distrito: PET, PPA, PPR.
Partido: BBL, ENS, GJM, JUN, PIN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI.
Uso: Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 630* (LP).

Lapsana L., Cichorieae

219. *Lapsana communis* L.
Ref.: Cabrera, 1963; Ariza Espinar & Urtubey, 1998.
Diagnosis: Hierba anual, con látex; hojas basales liradas, pecioladas, las apicales lanceoladas, sésiles; capítulos cimosos; flores amarillas; papus ausente
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En suelos modificados
Distrito: PPA.
Partido: TAN.
Prov. limítrofe: CDB.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Frangi 356* (LP).

Leontodon L., Cichorieae

220. *Leontodon taraxacoides* (Vill.) Merat
Sin.: *Crepis nudicaulis* L., *Hyoseris* taraxacoides Vill, *Leontodon nudicaulis* (L.) Banks
Ref.: Cabrera & Zardini, 1978; Ariza Espinar & Urtubey, 1998.
Diagnosis: Hierba anual, bienal o perenne, con látex; hojas velludas; aquenios del margen sin rostro y con papus escamoso, los del disco rostrados y con papus plumoso.
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En campos húmedos
Distrito: PPA, PPR.
Partido: DOL, GJM, GLV, GPU, LPT, TOR.
Prov. limítrofe: No existen referencias
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 315* (LP).

Leucanthemum Mill., Anthemideae

221. *Leucanthemum vulgare* Lam.
N. Vulgar: Margarita
Sin.: *Chrysanthemum leucanthemum* L.
Ref.: Cabrera 1963; Cabrera & Zardini, 1978; Moore, 1983; Bremer & Humphries, 1993; Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas basales espatuladas, las apicales menores, oblongas; capítulos solitarios; flores del margen liguladas, blancas, las del disco tubulosas, amarillas; aquenios 10-costados
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En potreros, baldíos y al borde de caminos
Distrito: PNE, PPA, PPR.
Partido: BAL, CHM, GPU, GSM, LPT, MON, MRN, TAN, TIG.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, RNG, SFE.
Uso: Biodinámica; Ornamental
Ejemplar examinado: *Burkart 1841* (LP).

Lucilia Cass. s.s. Anderb. & S.E. Freire., Inuleae

222. *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass.
Sin.: *Gnaphalium commersonii* Spreng., *Gnaphalium jamesonii* (Baker) Kuntze, *Gnaphalium virescens* (Less.) Kuntze, *Helichrysum montevidense* Spreng., *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass. f. *virescens* Less., *Lucilia jamesonii* Baker, *Lucilia lundii* Baker, *Lucilia microphylla* Cass., *Pachyrhynchus xeranthemoides* DC., *Serratula acutifolia* Poir.
Ref.: Cabrera 1963, 1974; Freire, 1986.
Diagnosis: Hierba perenne, albo-pubescente; hojas ovadas, extendidas (o recurvadas y más pequeñas); flores blancas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares secos y pedregosos, ca. 800 m.s.m
Distrito: PPA.
Partido: BAL, CSZ, SAA, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 4494* (LP).



217



220



218



221



219



222

Matricaria L., Anthemideae

223. *Matricaria matricarioides* (Less.) Porter ex Britton

N. Vulgar: Manzanilla

Sin.: *Artemisia matricarioides* Less., *Chamomilla suaveolens* (Pursh) Rydb., *Matricaria discoidea* DC., *Santolina suaveolens* Pursh, hom. illeg.

Ref.: Cabrera, 1971; Amat, 1985; Bremer & Humphries, 1993; Ariza Espinar, 1997.

Diagnosis: Hierba anual, glabra; hojas elípticas, 1-3 pinnatisectas; capítulos en corimbos; flores tubulosas; papus reducido

Status: Adventicia

Categoría: NT.

Ecología: En ambientes modificados

Distrito: PPA.

Partido: TAN.

Prov. limítrofe: RNG.

Uso: No se conoce

Ejemplar examinado: *Amat 145* (LP).

224. *Matricaria recutita* L.

N. Vulgar: Manzanilla

Sin.: *Chamomilla recutita* (L.) Rausch., *Matricaria chamomilla* L. hom. illeg.

Ref.: Cabrera, 1963, 1971; Xifreda, 1985; Bremer & Humphries, 1993; Ariza Espinar, 1997; Troiani & Steibel, 1999.

Diagnosis: Hierba anual, glabra; hojas 2-3 partidas; capítulos solitarios o en falsos corimbos; receptáculo cónico; flores del margen liguladas, blancas, con papus membranoso, las del disco tubulosas, amarillas, sin papus

Status: Adventicia

Categoría: NT.

Ecología: En ambientes modificados y ruderales

Distrito: PET, PNE, PPA, PPO, PPR.

Partido: AZU, BAL, IMG, LPT, MAI, OLA, PEH, PER, PIN, SID, TAP, TIG, TRQ.

Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, RNG.

Uso: Cosméticos; Industrial; Medicinal

Ejemplar examinado: *Cabrera 161* (LP).

Microgynella Grau., Astereae

225. *Microgynella trifurcata* (Less.) Grau

Sin.: *Erigeron tridactylum* DC., *Microgyne trifurcata* Less., *Vittadinia trifurcata* (Less.) Benth. & Hook. f. ex Griseb.

Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Grau, 1975; Cabrera y Zardini, 1978.

Diagnosis: Hierba perenne, pubescente; hojas apicales lineares, las basales trífidas; capítulos solitarios; flores del margen blancas, las del disco amarillas; papus amarillento o rojizo

Status: Nativa

Categoría: NT.

Ecología: En praderas, sobre suelos secos

Distrito: PPA, PPR.

Partido: CSZ, ESC, JUN, LPT, PUA, TRQ.

Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.

Uso: No se conoce

Ejemplar examinado: *Cabrera 10317* (LP).

Micropsis DC., Inuleae

226. *Micropsis australis* Cabrera

Ref.: Cabrera 1932, 1963, 1971.

Diagnosis: Hierba multicaule, enana; tallos rastreros; hojas espatuladas; flores 5-7; papus ausente

Status: Nativa

Categoría: R.

Ecología: En suelos arenosos

Distrito: PEC, PPA.

Partido: BBL, CDR, TRQ, VIL.

Prov. limítrofe: PAM, RNG.

Uso: No se conoce

Ejemplar examinado: *Cabrera 6693* (LP).

227. *Micropsis dasycarpa* (Griseb.) Beauverd

Sin.: *Filago dasycarpa* Griseb.

Ref.: Cabrera 1932, 1963, 1974.

Diagnosis: Hierba multicaule; tallos ascendentes; hojas espatuladas; flores 15-30, amarillentas; papus ausente

Status: Nativa

Categoría: R.

Ecología: En campos húmedos, a orillas de lagunas, sobre suelos arcillosos

Distrito: PNE.

Partido: TIG.

Prov. limítrofe: ERI.

Uso: No se conoce

Ejemplar examinado: *Parodi 5402* (LP).

228. *Micropsis ostenii* Beauverd

Sin.: *Micropsis bonaerensis* Manganaro

Ref.: Cabrera, 1932, 1963, 1974.

Diagnosis: Hierba multicaule; tallos ascendentes; hojas espatuladas; flores 4-10; papus coroniforme

Status: Nativa

Categoría: NT.

Ecología: En praderas prístinas y terrenos muy húmedos

Distrito: PEC, PET, PPA, PPR.

Partido: AVE, CDR, LPT, PAT, TFB.

Prov. limítrofe: ERI.

Uso: No se conoce

Ejemplar examinado: *Cabrera 1521* (LP).



223



224



225



226





228

229. *Micropsis spathulata* (Pers.) Cabrera
Sin.: *Evax spathulata* Pers., *Gnaphalium bracteatum* Willd., hom. illeg., *Gnaphalium involucratum* Lam., hom. illeg., *Micropsis herterii* Beauverd, *Micropsis involucrata* (Lam.) Cabrera
Ref.: Cabrera, 1932, 1963, 1974.
Diagnosis: Hierba multicaule; tallos rastreros; hojas espatuladas; flores 6-12; papus coroniforme
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En dunas húmedas y praderas
Distrito: PET, PNE, PPA, PPR.
Partido: AVE, CAM, ESC, IMG, LFL, LPT, MAG, MAI, TAN.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Dawson 814* (LP).

Mikania Willd., Eupatorieae

230. *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd.
N. Vulgar: Erva de Cobra, Erva de Sapo, Guaco, Matacampo, Pompero-Kocho.
Sin.: *Cacalia cordifolia* L. f., *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. var. *tomentosa* Hieron., *Willoughbya cordifolia* (L. f.) Kuntze
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Holmes, 1993; Cabrera, 1974, 1978; Ariza Espinar, 1994; Holmes & McDaniel, 1996.
Diagnosis: Enredadera glabrescente; hojas acorazonadas, denticuladas; filarios 4; flores 4, blancas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares húmedos
Distrito: PNE.
Partido: IMG, SFR.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 10415* (LP).

231. *Mikania cynanchifolia* (Baker) Malme
Nombre Vulgar: Guaco.
Sin.: *Mikania scandens* (L.) Willd. f. *intermedia* (Malme) Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. ssp. *cynanchifolia* (Baker) Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *cynanchifolia* Baker, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *intermedia* Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. subvar. *mollis* Chodat
Ref.: Cabrera & Vittet, 1954; Holmes & McDaniel, 1996; Cerana, 1997.
Diagnosis: Enredadera perenne, tomentosa; hojas ovado-sagitadas, onduladas; filarios 4; flores 4, blancas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos pantanosos
Distrito: PNE.
Partido: No existen referencias
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Tweedie 1091* (K).

232. *Mikania dusenii* B.L.Rob.
Ref.: Cabrera, 1974; Cerana, 1997.
Diagnosis: Enredadera; hojas ovado-lanceoladas; filarios 4; flores 4, blancas
Status: Nativa
Categoría: K.
Ecología: Lugares húmedos
Distrito: PNE, PPR.
Partido: SVT , TIG, SFE.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Burkart 20009* (SI).

233. *Mikania micrantha* Kunth
N. Vulgar: Bejuco, Charrúa, Guaco, Pompero-Kocho.
Sin.: *Mikania glechomaefolia* Sch. Bip. ex Baker, *Mikania orinocensis* Kunth, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *subcymosa* Baker, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *umbellifera* Baker, *Mikania subcrenata* Hook. & Arn., *Mikania subcymosa* Gardner, *Mikania umbellifera* Gardner
Ref.: Robinson, 1934; Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1974, 1978; Holmes, 1993.
Diagnosis: Enredadera glabrescente; hojas sagitado-acorazonadas, crenadas; filarios 4; flores 4, blancas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares húmedos, a orillas de ríos, pantanos
Distrito: PET, PNE, PPR.
Partido: ENS, IMG, SNC, TIG.
Prov. limítrofe: DF, ERI.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 2120* (LP).

234. *Mikania parodii* Cabrera
N. Vulgar: Guaco
Ref.: Cabrera, 1941, 1989; Cabrera & Vittet, 1954.
Diagnosis: Enredadera perenne, pubescente; hojas ovado-sagitadas, dentadas; filarios 4; flores 4, blancas
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En campos bajos próximos al mar, entre juncales
Distrito: PPR.
Partido: GLV.
Prov. limítrofe: DF, ERI, SFE
Uso: Alimenticia
Ejemplar examinado: *Cabrera 4941* (LP).

229



232



230



233

231



234

235. *Mikania periplocifolia* Hook. & Arn.
N. Vulgar: Guaco, Enredadera de campo, Guaco del río, Tapa cerco.
Sin.: *Mikania araucana* Phil., *Mikania auricularis* Griseb., *Mikania humilis* Kuntze ex Hieron., *Mikania niederleinii* Hieron., *Mikania scandens* (L.) Willd. ssp. *paraguayensis* Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *periplocifolia* (Hook. & Arn.) Baker, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *sagittifolia* Hassl.
Ref.: B. L. Robinson, 1934; Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1971, 1974, 1978.
Diagnosis: Enredadera perenne, glabra; hojas ovado-acorazonadas, dentadas; filarios 4; flores 4, blancas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos, en bañados y a orillas de ríos
Distrito: PET, PPA, PPR.
Partido: CSZ, ENS, IMG, LPT, MAG, SFR, SID, SNC, TAN.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Parodi 8082* (LP).

Mutisia L. f., Mutisieae

236. *Mutisia coccinea* A. St. Hil. var. ***dealbata*** (Less.) Cabrera
Sin.: *Mutisia dealbata* (Less.) DC., *Mutisia dealbata* (Less.) DC. var. *guaranitica* Chodat, *Mutisia hayenbeckii* Arechav, *Mutisia speciosa* Aiton var. *dealbata* Less., *Mutisia speciosa* Aiton var. *elliptica* Chodat
Ref.: Cabrera, 1965; Katinas, 1996a.
Diagnosis: Subarbusto voluble; hojas pinnatisectas; flores del margen liguladas y rojas, las del disco bilabiadas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En selvas y orillas de matorrales
Distrito: PNE.
Partido: SFR.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Burkart 4858* (LP).

Noticastrum DC., Astereae

237. *Noticastrum acuminatum* (DC.) Cuatrec.
Sin.: *Aster calendulaceus* (Griseb.) Kuntze, *Haplopappus acuminatus* DC., *Haplopappus calendulaceus* Griseb., *Leucopsis acuminata* (DC.) Malme, *Leucopsis calendulacea* (Griseb.) Baker, *Noticastrum calendulaceum* (Griseb.) Malme
Ref.: Cabrera, 1974; Zardini, 1985.
Diagnosis: Hierba lanosa, rastrera; hojas oblongo-ovadas; capítulos solitarios; flores del margen liguladas, amarillas; papus rojizo
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En dunas
Distrito: PET.
Partido: IMG.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Pastore 222* (LP).

238. *Noticastrum argentinense* (Cabrera) Cuatrec.
Sin.: *Aster argentinensis* Cabrera
Ref.: Zardini, 1985.
Diagnosis: Hierba perenne, ascendentes; hojas arrosetadas, espatuladas; capítulos solitarios; flores del margen liguladas, blancas; papus amarillento
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En praderas secas, sierras
Distrito: PPA, PPR.
Partido: GPU, LPT, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Proyecto Ventania 2* (LP).

239. *Noticastrum chebataroffii* (Herter) Zardini
Sin.: *Aster chebataroffii* Herter, *Aster decumbens* Auct. non Baker
Ref.: Zardini, 1985.
Diagnosis: Hierba perenne, estolonífera, subglabra; hojas basales arrosetadas, espatuladas; capítulos solitarios; flores del margen liguladas, blancas; papus amarillento
Status: Nativa
Categoría: K.
Ecología: En campos próximos al mar, sobre suelos arenosos o arcillosos
Distrito: PPA, PPR.
Partido: LBR, LPT, GPU, MAG, MCH, PIL.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 628* (LP).

240. *Noticastrum diffusum* (Pers.) Cabrera
Sin.: *Aster montevidensis* (Spreng.) Griseb., *Diplopappus diffusus* (Pers.) Hook. & Arn., *Erigeron diffusus* Pers., *Haplopappus diffusus* (Pers.) DC., *Leucopsis diffusa* (Pers.) Baker, *Noticastrum montevidense* (Spreng.) Cuatrec., *Onoseris montevidensis* Spreng.
Ref.: Cabrera, 1974, Zardini, 1985.
Diagnosis: Hierba perenne, rastrera, pubescente; hojas arrosetadas, espatuladas; capítulos solitarios, subradiados; flores del margen liguladas, blancas; papus purpúreo, raras veces amarillento
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En roquedales y terrenos altos, al borde de los caminos
Distrito: PET, PNE, PPA, PPR.
Partido: AVE, BAL, BZT, CAÑ, CHM, CSZ, ENS, GGD, GJM, GLV, GPI, GPU, IMG, LBR, LFL, LPT, MAG, MHR, MIR, NJL, OLA, TAN, TAY, TOR, TRQ, VMA.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI.
Uso: Aromática
Ejemplar examinado: *Cabrera 4960* (LP).



235

238



236

239



237

240

241. *Noticastrum gnaphalioides* (Baker) Cuatrec.
Sin.: *Aster gnaphalioides* (Baker) Hassl., *Leucopsis gnaphalioides* Baker
Ref.: Zardini, 1985.
Diagnosis: Hierba erecta, lanosa; hojas basales arrosetadas; capítulos subradiados; flores del margen liguladas, blancas o rosadas; papus amarillento
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En campos
Distrito: PPA, PPR.
Partido: BAL, CAM, GAL, SNC, TAN.
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Clos 20* (LP).

242. *Noticastrum marginatum* (Kunth) Cuatrec.
Sin.: *Aster acaulis* Wedd., *Aster marginatus* Kunth, *Aster perezii* Cuatrec., *Noticastrum marginatum* (Kunth) Cuatrec. f. *acaulis* (Wedd.) Cuatrec.
Ref.: Zardini, 1985.
Diagnosis: Hierba glabra; escapiforme; hojas arrosetadas, ovadas; capítulos solitarios, subradiados; flores del margen liguladas, blancas, rosadas o purpúreas; papus amarillento
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En terrenos bajos
Distrito: PET, PPA, PPO.
Partido: IMG, LPT, PEH, TAY, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 10227* (LP).

243. *Noticastrum sericeum* (Less.) Less. ex Phil.
Sin.: *Aster albus* (Phil.) Kuntze, *Aster albus* (Phil.) Reiche, *Aster haplopappus* (J. Rémy) Kuntze, *Aster haplopappus* (J. Rémy) Reiche, *Aster marginatus* Kunth var. *tomentosus* Wedd., *Aster nitens* Kuntze, *Aster notosericeus* Griseb., *Aster sericeus* (Less.) Nees, *Diplopappus sericeus* Less., *Haplopappus sericeus* (Less.) DC., *Leucopsis sericea* (Less.) Baker, *Noticastrum album* Phil., *Noticastrum haplopappus* J. Rémy, *Noticastrum phillipii* Sch. Bip., nom. nud.
Ref.: Zardini, 1985.
Diagnosis: Hierba lanosa, ascendente o en ocasiones rastrera; hojas espatuladas, las basales arrosetadas; capítulos subradiados; flores del margen liguladas, blancas o rosadas; papus rojizo o amarillento
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En médanos, sobre suelos arenosos
Distrito: PEC, PPA, PPO.
Partido: AVE, GAL, GPU, MAG, MHR, MIR, NEC, PAT, PEL, TLQ.
Prov. limítrofe: CDP PAM.
Uso: Aromática
Ejemplar examinado: *Cabrera 7540* (LP).

Onopordum L., Cardueae

244. *Onopordum acanthium* L.
N. Vulgar: Cardo
Ref.: Cabrera, 1963, 1971; Del Aguila, 1964; Amaral Franco, 1976b; Webb et al, 1988; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b.
Diagnosis: Hierba bienal, lanosa, erecta; hojas decurrentes, ovado-oblongas; capítulos en falsos corimbos; flores violáceas
Status: Naturalizada
Categoría: NT.
Ecología: En sierras, sobre suelos calcáreos y arenosos
Distrito: PPA, PPR.
Partido: AZU, BAL, CHM, LPT, LUJ, MHR, PER, PIN, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: DF, PAM.
Uso: Alimentacia; Medicinal; Ornamental
Ejemplar examinado: *Cabrera 622* (LP).

Panphalea Lag., Mutisieae

245. *Panphalea bupleurifolia* Less.
Ref.: Cabrera, 1953; Katinas 1995.
Diagnosis: Hierba anual; hojas basales enteras, linear-lanceoladas; flores blancas, bilabiadas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos húmedos y suelos salobres
Distrito: PET, PPR.
Partido: AVE, CAÑ, LPT, PIN, SVT.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Burkart 1782* (LP).

246. *Panphalea heterophylla* Less.
Sin.: *Pamphalea tweedii* Gardner
Ref.: Cabrera, 1953; Katinas, 1995.
Diagnosis: Hierba anual; hojas basales orbiculares o lirado-pinnatisectas; flores blancas, bilabiadas
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En campos y suelos rocosos
Distrito: PPA.
Partido: BAL, TAN.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Boffa 332* (LP).



241



244



242



245



243



246

Parthenium L., Heliantheae

247. *Parthenium hysterophorus* L.
N. Vulgar: Ajenjo, Altamisa, Altamisa del campo, Artemisilla, Yerba de la oveja
Sin.: *Argyrochaeta bipinnatifida* Cavanilles, *Echetrosis pentaspermum* Phil., *Parthenium glomeratum* Rollins, *Pharthenium lobatum* Buckley, *Pharthenium pinnatifidum* Stok.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978.
Diagnosis: Hierba anual; hojas 1-2 pinnatisectas; capítulos en cimas corimbiformes; flores del margen femeninas unidas en su base a dos páleas que encierran a las masculinas; aquenios unidos por dos filamentos a dos páleas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados, al borde de caminos
Distrito: PEC, PET, PMT, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: Ampliamente distribuida
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, SFE.
Uso: Aromática; Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: *Sáenz 1484* (LP).

Perezia Lag., Mutisieae

248. *Perezia multiflora* (Humb. & Bonpl.) Less. ssp. ***sonchifolia*** (Baker) Vuilleum.
Sin.: *Perezia aletes* J.F.Macbr., *Perezia sonchifolia* Baker, *Perezia sonchifolia* Baker var. *tandilensis* Kuntze
Ref.: Simpson Vuilleumier, 1969; Katinas, 1995.
Diagnosis: Hierba caulescente; hojas lanceoladas; capítulos 4-numerosos, agrupados en pseudopanojas o en pseudocorimbos; flores blancas
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En planicies y cerros bajos
Distrito: PPA.
Partido: AZU, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Ruiz Leal 22330* (LP).

249. *Perezia recurvata* (Vahl) Less.
Sin.: *Chaetanthera recurvata* (Vahl) Spreng., *Clarionia recurvata* (Vahl) D.Don., *Homoianthus donianus* (Less.) J.Remy, *Homoianthus echinulatus* Cass., *Homoianthus inermis* Meyen & Walpers, nom illeg., *Homoianthus patagonicus* Gand., *Homoianthus pectinatus* Phil., *Homoianthus triceps* Phil., *Perdicium recurvatum* Vahl, *Perezia beckii* Hook. & Arn., *Perezia doniana* Less., *Perezia flavescens* Dusén, *Perezia patagonica* Speg., *Perezia patagonica* Speg. var. *intermedia* Speg., *Perezia pectinata* (Phil.) Reiche, *Perezia recurvata* (Vahl) Less. ssp. *beckii* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Perezia recurvata* (Vahl) Less. ssp. *patagonica* (Speg.) Cabrera, *Perezia recurvata* (Vahl) Less. ssp. *triceps* (Phil.) Cabrera, *Perezia reflexa* Meyen, *Perezia triceps* (Phil.) Reiche.
Ref.: Simpson Vuilleumier, 1969.
Diagnosis: Subarbusto; hojas lineares, recurvadas; capítulos solitarios 1-3 en el ápice de los tallos; flores amarillas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos secos
Distrito: PMT.
Partido: PAT.
Prov. limítrofe: RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Berg 119** (LP).

Picris L., Cichorieae

250. *Picris echioides* L.
Sin.: *Helminthia echioides* (L.) Gaertn., *Helminthotheca echioides* (L.) Holub.
Ref.: Cabrera, 1963; Ariza Espinar & Urtubey, 1998.
Diagnosis: Hierba anual o perenne, con látex; filarios exteriores foliáceos; aquenios del margen curvados, rostrados, con papus corto; flores amarillas; aquenios del disco rostrados; papus plumoso
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos y terrenos baldíos
Distrito: PET, PPA, PPR.
Partido: BZT, ENS, GPU, JUN, LPT, LUJ.
Prov. limítrofe: DF, ERI.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 312* (LP).

Picrosia D.Don., Cichorieae

251. *Picrosia longifolia* D.Don
N. Vulgar: Achicoria silvestre
Sin.: *Picrosia australis* Decne., *Picrosia longifolia* var. *angustissima* Kuntze, *Prenanthes subdentata* Hooker, *Psilopogon albiflorus* Phil., *Tragopogon fritillarioides* Less.
Ref.: Cabrera, 1963; Ariza Espinar & Urtubey, 1998.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex; filarios uniseriados; flores blancas; aquenios rostrados; papus piloso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En praderas húmedas, bañados y cañadones
Distrito: PET, PPR.
Partido: CHM, DEL, ENS, GLV, JUN, IMG, LPT, MER, PIN, QUI.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 1543* (LP).

Plagiocheilus Arn. ex DC., Anthemideae

252. *Plagiocheilus tanacetoides* Haenk. ex DC.
Ref.: Cabrera, 1963; Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba anual, pubescente; hojas elípticas, pinnatisectas, auriculado-amplexicaules; capítulos en corimbos laxos; flores del margen bilabiadas, las del disco tubulosas; aquenios pubescentes; papus ausente
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares húmedos, arcillosos y de relleno
Distrito: PET, PNE, PPR.
Partido: CHA, SFR, SNC, TIG.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Burkart 553* (LP).



247



250



248



251

249

252

Pluchea Cass., Inuleae

253. *Pluchea sagittalis* (Lam.) Cabrera
N. Vulgar: Kitó, Lucera, Quitoc, Quitoco, Quitoque, Yerba del lucero
Sin.: *Conyza sagittalis* Lam., *Epaltes brasiliensis* DC., *Gnaphalium suaveolens* Vell., *Pluchea quitoc* DC., *Pluchea suaveolens* (Vell.) Kuntze
Ref.: Cabrera, 1949a, 1963, 1974, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne, glanduloso-pubescente; tallos alados, hojas lanceoladas, aserradas; flores blancas, las del disco 30-50
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos inundados y bañados
Distrito: PET, PPA, PPR.
Partido: BER, ENS, LPT, LUJ, MAG, TAN, TOR, VMA.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: Alimenticia; Industrial (licoreria); Medicinal
Ejemplar examinado: *Dawson 976* (LP).

Podocoma Cass., Astereae

254. *Podocoma hieracifolia* (Poir.) Cass.
Sin.: *Erigeron hieracifolium* Poir., *Podocoma primulaefolia* Cass., *Podopappus pubescens* Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974.
Diagnosis: Hierba perenne, híspida; hojas denticuladas; capítulos en corimbos laxos; flores del margen liguladas, blancas, las del disco amarillas; aquenios rostrados; papus piloso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En pastizales, estepas, sierras o en laderas pedregosas
Distrito: PPA, PPO.
Partido: GPU, OLA, PEH, TAN, TLQ, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 4493* (LP).

255. *Podocoma hirsuta* (Hook. & Arn.) Baker
Sin.: *Podopappus hirsutus* Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba perenne, hirsuta; hojas basales dentadas; capítulos en corimbos laxos; flores del margen liguladas, blancas, las del disco amarillas; aquenios rostrados; papus piloso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En sierras y márgenes de ríos y arroyos
Distrito: PNE, PPA, PPR.
Partido: BAL, DEL, ENS, IMG, LPT, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Dawason 944* (LP).

256. *Podocoma rivularis* (Gardner) G. L. Nesom
Sin.: *Baccharidastrum rivulare* (Gardner) Herter, *Conyza* rivularis Gardner, Erigeron *gardneri* Cabrera
Ref.: Cabrera, 1974; Nesom, 1994a.
Diagnosis: Hierba perenne, glabras; hojas auriculadas, las basales arrosetadas; capítulos en corimbos paucicéfalos; flores del margen blancas, las del disco numerosas; aquenios cortamente rostrados, pubescentes; papus piloso
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En bosques, zonas húmedas y umbrías
Distrito: PNE.
Partido: DEL, ENS.
Prov. limítrofe: No existen referencias
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 309* (LP).

Porophyllum Guett., Helenieae

257. *Porophyllum obscurum* (Spreng.) DC.
N. Vulgar: Hierba del venado, Pus pus, Yerba del venado
Sin.: *Kleinia linifolia* Hook. & Arn., *Kleinia obscura* Spreng., *Porophyllum lineare* DC.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974, 1978; Petenatti & Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas y brácteas involucrales con bolsas oleíferas; invólucro uniseriado; papus formado por numerosas páleas
Status: Nativa
Categoría: K.
Ecología: En suelos secos y arenosos
Distrito: No existen referencias
Partido: No existen referencias
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, SFE.
Uso: Aromática, Medicinal
Ejemplar examinado: *Molfino 777** (BAF).

Pterocaulon Elliott., Inuleae

258. *Pterocaulon balansae* Chodat
Sin.: *Pterocaulon interruptum* Auct. non DC., *Pterocaulon paniculatum* Arechav., *Pterocaulon polystachyum* DC. var. *tomentosa* Arechav., *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *subpaniculata* Arechav.
Ref.: Cabrera & Ragonese, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne, canescente u ócreo-pubescente; hojas obovado-elípticas, aserradas; capítulos en panojas de espigas; flores blancas
Status: Nativa
Categoría: K.
Ecología: En terrenos bajos y húmedos
Distrito: PNE.
Partido: TIG, ZAR.
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Burkart 7726* (SI).



253

256

254



257



255



258

259. *Pterocaulon cordobense* Kuntze
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Cabrera & Ragonese, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne, ócreo-pubescente; hojas elípticas a lineares, aserradas; capítulos en espigas alargadas y laxas, ramificadas en la base; flores blancas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos y estepas prístinas
Distrito: PET, PPO, PPR.
Partido: ENS, LIN, LPT, LZA.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 10220* (LP).

260. *Pterocaulon lorentzii* Malme
Sin.: *Pterocaulon malmeanum* Chodat, *Pterocaulon virgatum* (L.) DC.var. *angustifolia* Arechav., *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. var. *spicata* Arechav.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Cabrera & Ragonese, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne, albo-pubescente; hojas oblanceoladas a linear-lanceoladas, enteras, revolutas; capítulos en espigas alargadas y densas; flores blancas
Status: Nativa
Categoría: V.
Ecología: En campos altos, sobre rocas aflorantes y suelos arenosos y húmedos
Distrito: PNE.
Partido: IMG.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Pastore 237* (LP).

261. *Pterocaulon virgatum* (L.) DC.
Sin.: *Conyza virgata* (L.) L., *Chlaenobolus virgatus* (L.) Cass., *Gnaphalium virgatum* L., *Pterocaulon pilcomayense* Malme, *Pterocaulon pompilianum* Standley & Williams, *Pterocaulon subspicatum* Chodat, *Pterocaulon subvirgatum* Malme, *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *subvirgata* (Malme) Arechav.
Ref.: Cabrera, 1978; Cabrera & Ragonese, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne, albo-pubescente; hojas oblanceoladas a linear-elípticas, aserradas, revolutas; capítulos en espigas alargadas y laxas; flores blancas
Status: Nativa; Maleza
Categoría: R.
Ecología: En ambientes modificados, a orillas de caminos, campos altos, secos y en suelos arcillosos
Distrito: PET, PPO.
Partido: CAM, GLV, SNC.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: Insecticida
Ejemplar examinado: *Hunziker 12014* (LP).

Schkuhria Roth., Helenieae

262. *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell
N. Vulgar: Canchalahua, Matapulgas, Pichana, Piqui pichana
Sin.: *Amblyopappus mendocinus* Phil., *Pectis pinnata* Lam., *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze, *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze var. *pallida* Kuntze, *Schkuhria advena* Thell., *Schkuhria coquimbana* Phil., *Schkuhria isopappa* Benth.
Ref.: Heiser, 1945; Cabrera, 1978.
Diagnosis: Hierba anual; hojas pinnatisectas o 2-pinnatisectas; papus formado por 8 páleas múticas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos arenosos o pedregosos, al borde de caminos
Distrito: PPR.
Partido: PER.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, SFE.
Uso: Insecticida
Ejemplar examinado: *Burkart & Troncoso 24310* (LP).

263. *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. ***abrotanoides*** (Roth) Cabrera
N. Vulgar: Canchalagua, Canchalahua, Escobilla, Matalahuga, Matapulgas, Pillaguay, Yuyo amargo
Sin.: *Schkuhria abrotanoides* Roth, *Schkuhria abrotanoides* Roth var. *isopappa* (Benth.) Hieron., *Schkuhria abrotanoides* Roth var. *pomasquiensis* Hieron., *Schkuhria bonariensis* Hook. & Arn.
Ref.: Heiser, 1945; Cabrera, 1978; Petenatti & Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba anual; hojas pinnatisectas o 2-pinnatisectas; papus formado por 4-5 páleas aristadas y 3-4 páleas múticas
Status: Nativa; Maleza
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados, al borde de los caminos y campos altos
Distrito: PEC, PET, PPR.
Partido: BBL, JUN, LPT, PER, SNC.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, RNG, SFE.
Uso: Insecticida; Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 7152* (LP).

264. *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. ***octoaristata*** (DC.) Cabrera
N. Vulgar: Canchalagua, Canchalahua, Piquipichana
Sin.: *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze var. *purpurascens* Kuntze, *Schkuhria octoaristata* DC.
Ref.: Heiser, 1945; Cabrera, 1978; Petenatti & Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba anual; hojas pinnatisectas o 2-pinnatisectas; papus formado por páleas largamente aristadas, raras veces múticas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos pedregosos, a orillas de ríos
Distrito: PPA.
Partido: LOB.
Prov. limítrofe: CDB, PAM.
Uso: Insecticida; Medicinal
Ejemplar examinado: *Scala s.n.* (LP 5052).



259



262



260



263

261



264

Schlechtendalia Less., Barnadesieae

265. *Schlechtendalia luzulaefolia* Less.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Urtubey, 1996.
Diagnosis: Hierba con hojas graminiformes; papus formado por cerdas rígidas y estrigosas
Status: Nativa
Categoría: V.
Ecología: En pedregales y en suelos arenosos
Distrito: PNE.
Partido: IMG.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Gamerro 1364* (LP).

Scolymus L., Cichorieae

266. *Scolymus hispanicus* L.
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex; hojas espinosas, las basales oblanceoladas, las caulinares decurrentes; flores amarillas; aquenio glabros envuelto por las páleas; papus formado por dos cerdas rígidas
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En suelos graminosos y modificados
Distrito: PET, PPR.
Partido: CHA, LPT.
Prov. limítrofe: DF, ERI.
Uso: Alimenticia; Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 24279* (LP).

Senecio L., Senecioneae

267. *Senecio arechavaletae* Baker
Ref.: Cabrera, 1963; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Hierba perenne, pubescente; hojas lineares, enteras o dentadas, el margen a veces revoluto; capítulos radiados, pocos, terminales
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En cañadones húmedos y roquedales
Distrito: PPA.
Partido: TRQ.
Prov. limítrofe: No existen referencias. Representada también en Uruguay.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Hicken 32* (LP).

268. *Senecio bergii* Hieron.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Subarbusto pubescente; hojas lineares con 1 ó 2 lóbulos (raras veces enteras); capítulos discoideos en corimbos compactos
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En estepas
Distrito: PEC.
Partido: PAT.
Prov. limítrofe: RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *C. Berg 1874* (LP).

269. *Senecio bonariensis* Hook. & Arn.
N. Vulgar: Lampasillo, Lampaso, Lengua de ciervo, Margarita de bañado, Sanguinaria
Sin.: *Senecio ochroleucus* Hook. & Arn. var. *β* Hook. & Arn., *Senecio rhodaster* Baker, *Senecio sagittarioides* Speg., *Senecio sagittifolius* Baker pp.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1980; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas basales ovado-deltoideas, las apicales lanceoladas; capítulos radiados en corimbos compuestos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares húmedos e inundables
Distrito: PEC, PET, PMT, PNE, PPA PPR.
Partido: BER, ENS, IMG, MAG, MHR, PAT, PMR, QUI, TIG, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Cabrera 1502* (LP).

270. *Senecio brasiliensis* (Spreng.) Less. var. ***tripartitus*** (DC.) Baker
Sin.: *Senecio tripartitus* DC., *Senecio amabilis* Vell., *Senecio cannabinifolius* Hook. & Arn., *Senecio megapotamicus* H.Buek.
Ref.: Cabrera, 1957, 1963, 1974, 1985; Cabrera & Zardini, 1980, Sáenz, 1996.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas pinnatisectas con 1-4 segmentos lineares; capítulos radiados, en corimbos amplios
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En las orillas de lagunas
Distrito: PET, PNE, PPA, PPR.
Partido: BZT, ENS, GPU, IMG, LPT, LZA, MRN, SPD, VLP.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 1557* (LP).

265



268



266

269

267



270

271. *Senecio bravensis* Cabrera

Ref.: Cabrera, 1963; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Subarbusto glanduloso-pubescente; hojas acuminadas; capítulos radiados en corimbos laxos
Status: Endémica
Categoría: R.
Ecología: En sierras
Distrito: PPA.
Partido: GAL, GPU.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 9936* (LP).

272. *Senecio ceratophylloides* Griseb.

Sin.: *Senecio ceratophyllus* D. Don ex Hook. & Arn. (hom. illeg.), *Senecio ceratophyllus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *macrodon* (Baker) Malme, *Senecio ceratophyllus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *major* D. Don ex Hook. & Arn., *Senecio chilensis* Less. var. *ceratophyllus* (D. Don. ex Hook. & Arn.) Baker, *Senecio chilensis* Less. var. *macrodon* Baker, *Senecio cuspidatus* DC. var. *ceratophylloides* (Griseb.) Kuntze, *Senecio cuspidatus* DC. var. *ceratophyllus* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Senecio cuspidatus* DC. var. *macrodon* (Baker) Kuntze.
Ref: Cabrera, 1963; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Hierba perenne, pubescente; hojas enteras, trífidas o con 2-4 dientes; capítulos solitarios, radiados, largamente pedunculados
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En estepas y caminos arenosos, médanos
Distrito: PEC, PPA, PPO, PPR.
Partido: BOL, JUN, PEL, PUA, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, PAM.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 7102* (LP).

273. *Senecio crassiflorus* (Poir.) DC.

N. Vulgar: Boleo
Sin.: *Cineraria crassiflora* Poir., *Cineraria vestita* Spreng., *Senecio andryaloides* DC., *Senecio crassiflorus* (Poir.) DC. var. *andryaloides* (DC.) Arechav. *Senecio crassiflorus* (Poir.) DC. var. *tricuspis* Baker.
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Hierba perenne pubescente; hojas enteras, aserradas o dentadas en la parte apical; capítulos radiados, largamente pedunculados, en corimbos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos arenosos, dunas
Distrito: PET, PNE, PPR.
Partido: ENS, GJM, GLV, IMG, LPT, MAG, QUI, SFR.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 3385* (LP).

274. *Senecio filaginoides* DC.

Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn., *Senecio albicaulis* Hook. & Arn. var. *gilliesii* Hook. & Arn., *Senecio albolanatus* Phil., *Senecio caricifolius* Hook. & Arn., *Senecio doeringii* Hieron., *Senecio leuciscus* Phil., *Senecio leyboldtii* Phil., *Senecio meyeni* Phil., *Senecio quenselii* Skottsb., *Senecio sericeus* Kuntze, *Senecio sericeus* Kuntze var. *gilliesii* (Hook. & Arn.) Kuntze
Ref.: Cabrera, 1963, 1971; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Arbusto de hasta 1m., densamente pubescente; hojas enteras, revolutas; capítulos discoideos en corimbos densos; aquenios densamente papiloso-pubescentes
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En dunas fijas o lugares arenosos y secos
Distrito: PEC, PMT, PPA.
Partido: BBL, CLR, MHR, PAT.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 6747* (LP).

275. *Senecio goldsackii* Phil.

Sin.: *Senecio gilliesianus* Hieron. var. *arachnoidea* Hieron., *Senecio stipellatus* O. Hoffm.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Subarbusto pubescente; hojas pinnatisectas con 3-6 pares de segmentos; capítulos radiados, laxamente corimbosos
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En colinas y mesetas pedregosas
Distrito: PMT.
Partido: PAT.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *C. Berg. 109* (LP).

276. *Senecio grisebachii* Baker

N. Vulgar: Primavera
Ref.: Cabrera, 1957, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Hierba perenne, glabra o pubescente; hojas linear-lanceoladas, aserradas; capítulos radiados en amplias cimas corimbiformes; aquenios pubescentes
Status: Nativa; Maleza
Categoría: NT.
Ecología: En suelos sueltos, algo húmedos; Invasora
Distrito: PNE, PPA.
Partido: DEL, TAN, ZAR.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: Tóxico para el ganado
Ejemplar examinado: *Cabrera 4877* (LP).



271

274

272

275

273



276

277. *Senecio grisebachii* Baker var. ***anomalus*** Cabrera

Ref.: Cabrera, 1957, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Hierba perenne, pubescente o glabra; hojas pinnatisectas; capítulos radiados en cimas corimbiformes; aquenios pubescentes
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En la ribera platense
Distrito: PET.
Partido: BAR, CAM.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Burkart 8475* (LP).

278. *Senecio grisebachii* Baker var. ***leptotus*** Cabrera

Ref.: Cabrera, 1957, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Hierba perenne, glabra o laxamente pubescente; hojas lanceoladas, aserradas, con un aurícula linear a cada lado de la base; capítulos en cimas corimbiformes; aquenios pubescentes
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En la ribera platense
Distrito: PPA.
Partido: DEL.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 1631* (LP).

279. *Senecio grisebachii* Baker var. ***schyzotus*** Cabrera

Ref.: Cabrera, 1957, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Hierba perenne, laxamente pubescente; hojas lanceoladas, dentadas, con aurículas divididas en 2 o más lacinias lineares; capítulos radiados en cimas corimbiformes; aquenios pubescentes
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En bosques húmedos
Distrito: PNE.
Partido: CAM, SNC.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Burkart 3074* (LP).

280. *Senecio grisebachii* Baker var. ***subincanus*** Cabrera

Ref.: Cabrera, 1957, 1963; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Hierba perenne, densamente pubescente; hojas lanceoladas, dentadas; capítulos radiados en cimas corimbiformes; aquenios pubescentes
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En sierras
Distrito: PPA.
Partido: BAL, GPU, TAN.
Prov. limítrofe: No existen referencias. Representada también en Uruguay.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 6819* (LP).

281. *Senecio heterotrichus* DC.

Sin.: *Senecio maldonadensis* Baker
Ref.: Cabrera, 1957, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Hierba perenne, hojosa, pubescente en la parte superior, glandulosa en la inferior; hojas lanceoladas, dentadas o aserradas, las apicales auriculadas; capítulos radiados, en corimbos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares secos y médanos
Distrito: PET.
Partido: BER, IMG.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 394* (LP).

282. *Senecio leucopeplus* Cabrera

Sin.: *Senecio candolleanus* Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Subarbusto pubescente; hojas pinnatisectas con 2-4 pares de segmentos; capítulos discoideos, en corimbos; aquenios pubescentes
Status: Endémica
Categoría: R.
Ecología: En suelos rocosos
Distrito: PPA.
Partido: BBL, TRQ.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 4432* (LP).

277

278

279

280

281

282

283. *Senecio leucostachys* Baker
Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn. var. *pinnatifidus* Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Subarbusto pubescente; hojas pinnatisectas con 2-4 pares de segmentos; capítulos discoideos, pedunculados con invólucro cilíndrico
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En regiones secas
Distrito: PMT.
Partido: PAT.
Prov. limítrofe: CDB, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera & Job 6* (LP).

284. *Senecio madagascariensis* Poir.
Sin.: *Senecio burchelli* Auct. (non DC.) Cabrera, *Senecio incognitus* Cabrera
Ref.: Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas linear-lanceoladas, enteras o raras veces dentadas; capítulos radiados, pedunculados, en corimbos laxos; flores amarillas
Status: Adventicia; Maleza
Categoría: NT.
Ecología: En suelos rocosos y arenosos; Invasora
Distrito: PET, PPA.
Partido: BAL, BAR, BBL, BER, CAM, CHM, EXC, GAL, GJM, GPU, LBR, LPT, MCH, PIN, TAN.
Prov. limítrofe: DF, ERI.
Uso: Tóxica
Ejemplar examinado: *Solbrig 1073*(LP).

285. *Senecio melanopotamicus* Cabrera
Ref.: Cabrera, 1963, 1971; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Arbusto hojoso; hojas pinnatisectas con 4-6 pares de segmentos lineares, 2-furcados en la base, generalmente el segmento interior más corto; capítulos radiados, pocos, en corimbos laxos
Status: Endémica
Categoría: K.
Ecología: En barrancas
Distrito: PMT.
Partido: PAT.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera et al., 19582* (LP).

286. *Senecio mikanioides* Otto ex Walp.
Sin.: *Senecio scandens* DC.
Ref.: Cabrera 1949a, 1957, 1963; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Hierba voluble (enredadera); hojas anchamente ovadas, carnosas; capítulos discoideos en corimbos
Status: Adventicia; Maleza
Categoría: NT.
Ecología: En cercos; Invasora
Distrito: PET.
Partido: BZT, LPT, QUI.
Prov. limítrofe: CDB.
Uso: Ornamental
Ejemplar examinado: *Cabrera 329* (LP).

287. *Senecio montevidensis* (Spreng.) Baker
Sin.: *Cineraria montevidensis* Spreng., *Senecio chilensis* Baker, *Senecio cuspidatus* DC., *Senecio cuspidatus* DC. var. *montevidensis* (Spreng.) Kuntze.
Ref.: Cabrera, 1935, 1939, 1957, 1963, 1971; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Hierba pubescente; tallos decumbentes; hojas lineares, enteras o con algunos dientes, frecuentemente trífidas; capítulos radiados, solitarios
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos arenosos, dunas
Distrito: PET, PPA, PPO, PPR.
Partido: BOL, GLV, GPU, LIN, LPT, MIR, PEL, PMR, SAD, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 6962* (LP).

288. *Senecio ostenii* Mattf.
Ref.: Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Subarbusto pubescente; hojas enteras, ensanchadas en la base con pequeñas aurículas redondeadas; capítulos radiados, en corimbos; aquenios pubescentes
Status: Adventicia
Categoría: K.
Ecología: En suelos rocosos
Distrito: PPA.
Partido: BAL.
Prov. limítrofe: No existen referencias. Representada también en Uruguay.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Ruiz Leal 22306* (LP).



283



286

284

287

285

288

289. *Senecio pampeanus* Cabrera

Ref.: Cabrera, 1971, 1985; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas pinnatisectas con 7-8 pares de segmentos; capítulos radiados, en corimbos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos arenosos o salados
Distrito: PPA, PPO.
Partido: CLR, GPU, PEL, TLQ, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 10336* (LP).

290. *Senecio pinnatus* Poir.

Sin.: *Cineraria megapotamica* Spreng.
Ref.: Cabrera, 1939, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Subarbusto; hojas pinnatisectas con 3-6 segmentos lineares; capítulos pedunculados, radiados, en corimbos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos gredosos
Distrito: PMT, PPO.
Partido: AAL, PAT.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Burkart 4819* (LP).

291. *Senecio pinnatus* Poir. var. ***simplicifolius*** Cabrera

Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Subarbusto; hojas con 1-2 segmentos lineares; capítulos pedunculados, radiados, en corimbos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En terrenos húmedos, bajos y salados
Distrito: PET.
Partido: LPT, PIN, QUI.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 1662* (LP).

292. *Senecio pulcher* Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio icoglossus* DC. var. *araneosus* DC.
Ref.: Cabrera, 1957, 1963; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Hierba perenne, pubescente; hojas radicales y caulinares; capítulos radiados, en corimbos; flores del margen violáceas o púrpuras
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En lugares rocosos
Distrito: PPA.
Partido: GPU, OLA, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: No existen referencias
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 10339* (LP).

293. *Senecio quequensis* Cabrera

Ref.: Cabrera, 1963; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Subarbusto pubescente con tallos ascendentes; hojas crasas, lineares; capítulos discoideos, en corimbos
Status: Endémica
Categoría: R.
Ecología: En dunas litorales
Distrito: PPA.
Partido: BBL, CDR, MHR.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Fabris & Schwabe 4819* (LP).

294. *Senecio selloi* (Spreng.) DC.

Sin.: *Cineraria selloi* Spreng., *Senecio doroniciflorus* Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera, 1974; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Subarbusto glanduloso-pubescente; hojas lanceoladas, aserradas, auriculadas; capítulos radiados, en corimbos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares secos
Distrito: PET, PPA, PPR.
Partido: BAL, BAR, ENS, GLV, GPU, IMG, MAG, TAN.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 6796* (LP).

289

292

290



293



291

294

295. *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *elatior* Hook. & Arn., *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *prostratus* D. Don.
Ref.: Cabrera, 1949a, 1963, 1971; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Arbusto hojoso; hojas pinnatisectas con 1-2 pares de segmentos; capítulos radiados, en corimbos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos arenosos
Distrito: PEC, PMT, PPA.
Partido: CDR, CLR, PAT, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, PAM.
Uso: Forrajera; Ornamental; Tóxica
Ejemplar examinado: *Carette s.n.* (LP).

296. *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. ***erectus*** Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio mendocinus* Phil., *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *macranthus* Hook. & Arn.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Arbusto hojoso; hojas lineares; capítulos radiados
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos arenosos y áridos
Distrito: PEC, PMT, PPA.
Partido: BAL, CDR, PAT.
Prov. limítrofe: PAM, RNG.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Job 1575* (LP).

297. *Senecio tandilensis* Cabrera
Ref.: Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Subarbusto pubescente; hojas pinnatisectas con 1-2 pares de segmentos curvados hacia el ápice; capítulos radiados, en corimbos
Status: Endémica
Categoría: K.
Ecología: En sierras
Distrito: PPA.
Partido: TAN.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Spegazzini 97* (LP).

298. *Senecio tweediei* Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio argentinensis* Speg.
Ref.: Cabrera, 1974; Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Hierba; hojas lanceoladas, las apicales sésiles, enteras o con 2-5 dientes a cada lado, basales; capítulos radiados, en corimbos; flores blancas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos pantanosos
Distrito: PET.
Partido: CHM, CST, GLV, PMR.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 10720* (LP).

299. *Senecio ventanensis* Cabrera
Sin.: *Senecio pinnatus* Poir. var. *glandulosus* Ball
Ref.: Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Arbusto pubescente glanduloso; hojas pinnatífidas con segmentos lineares; capítulos radiados, en corimbos
Status: Endémica
Categoría: R.
Ecología: En laderas rocosas
Distrito: PPA.
Partido: BBL, CPR, CSZ, SAA, TRQ.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 4677* (LP).

300. *Senecio viravira* Hieron.
Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn. var. *glabriusculus* Griseb., *Senecio argentinus* Baker, *Senecio pinnatus* Poir. var. *achalensis* Griseb., *Senecio sericeus* Kuntze var. *glabriusculus* (Griseb.) Kuntze, *Senecio sericeus* Kuntze var. *pinnatifidus* Kuntze.
Ref.: Cabrera & Zardini, 1980.
Diagnosis: Subarbusto pubescente; hojas pinnatisectas o 2-pinnatisectas, con 3-4 pares de segmentos; capítulos discoideos, pedunculados
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En sierras
Distrito: PNE.
Partido: SPD.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 5620* (LP).



295

298

296



299



297

300

301. *Senecio vulgaris* L.
Ref.: Cabrera, 1949a, 1963, 1971, 1974, 1985; Cabrera & Zardini, 1980; Moore, 1983.
Diagnosis: Hierba anual glabra o laxamente pubescente; hojas pinnatisectas con lóbulos dentados, las basales con pecíolos alados, las apicales sésiles; capítulos discoideos
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados, ruderal
Distrito: PPR.
Partido: AVE, BAL, GAL, GPU, LPT, TAN, TIG, SAA.
Prov. limítrofe: DF, ERI.
Uso: Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 2139* (LP).

Silybum Adams., Cardueae

302. *Silybum marianum* (L.) Gaertn.
N. Vulgar: Cardo, Cardo asnal, Cardo blanco, Cardo mariano
Sin.: *Carduus marianus* L.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978; Del Aguila, 1964; Novara, 1993; Ariza Espinar & Delucchi, 1998b.
Diagnosis: Hierba anual, espinosa; hojas basales arrosetadas, lobadas; capítulos solitarios; filarios con 2 espinas laterales; flores tubulosas, purpúreas
Status: Naturalizada
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes naturales y terrenos modificados
Distrito: PET, PNE, PPA, PPO, PPR
Partido: AVE, BAL, CHM, ESC, GAL, GPU, LIN, LPT, LUJ, MAG, MPZ, QUI, TAN, TIG, TOR, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, SFE.
Uso: Alimenticia; Medicinal; Ornamental; Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 100* (LP)

Smallanthus Macloskie, Heliantheae

303. *Smallanthus connatus* (Spreng.) H. Rob.
Sin.: *Gymnolomia connata* Spreng., *Polymnia andrei* Arechav., *Polymnia connata* (Spreng.) Blake, *Polymnia silphioides* DC., *Polymnia silphioides* DC. var. *perennis* Bettfr.
Ref.: Cabrera 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1978; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas ovado-triangulares, auriculadas, pecíolos alados; receptáculo paleáceo; flores amarillas; papus ausente
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares húmedos, al borde de arroyos
Distrito: PET, PNE.
Partido: BER, ENS, IMG, MAG, SFR, TIG.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Zardini 1334* (LP).

Solidago L., Astereae

304. *Solidago chilensis* Meyen
N. Vulgar: Falso romerillo, Penacho, Punta de lanza, Romerillo amarillo, Saucillo, Vara amarilla, Vara de oro
Sin.: *Solidago linearifolia* DC., *Solidago linearifolia* DC. var. *brachypoda* Speg., *Solidago microglossa* DC. var. *linearifolia* (DC.) Baker
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne glabra; hojas linear-ovadas; capítulos en panojas piramidales; flores amarillas; papus blanco
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En dunas, estepas arenosas, campos altos o suelos húmedos
Distrito: PEC, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: BBL, CAM, CHA, CHM, ENS, GAL, GJM, GLV, GPU, GUA, IMG, JUN, LBR, LIN, LPT, MAG, MHR, MIR, NEC, OLA, PAT, PEL, SNC, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: Melífera; Medicinal; Tintórea; Tóxica
Ejemplar examinado: *Maldonado 551* (LP).

Soliva Ruiz & Pav., Anthemideae

305. *Soliva anthemifolia* (Juss.) R. Br. ex Less.
Sin.: *Gymnostyles anthemifolia* Juss.
Ref.: Cabrera, 1949b, 1963, 1974; Bremer & Humphries, 1993; Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba anual, postrada, pubescente; hojas arrosetadas, 2-3 pinnatisectas; capítulos sésiles, aglomerados en el centro de la roseta; flores del margen desnudas, las del disco tubulosas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos arenosos e inundables
Distrito: PET, PNE, PPR.
Partido: AVE, CHA, ESC, LPT, QUI, RAM, ROJ, SFR, SID, TIG.
Prov. limítrofe: ERI, DF.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Burkart 1985* (LP).

306. *Soliva macrocephala* Cabrera
Ref.: Cabrera, 1949b, 1963, 1974; Bremer & Humphries, 1993; Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba anual, glabra; hojas arrosetadas, 2-3 pinnatisectas; capítulos en el centro de la roseta; flores del disco masculinas, las del margen femeninas, desnudas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos húmedos
Distrito: PET, PNE, PPR.
Partido: BER, ENS, LPT, SNC.
Prov. limítrofe: DF, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 7217* (LP).



301



304



302



305



303



306

307. *Soliva sessilis* Ruiz & Pav. var. ***barclayana*** (DC.) Baker.

Sin.: *Gymnostyles alata* Spreng., *Gymnostyles pterosperma* Juss., *Ranunculus alatus* Poir., *Soliva alata* (Spreng.) DC., *Soliva barclayana* DC., *Soliva sessilis* Griseb., hom. illeg., *Soliva pterosperma* (Juss.) Less

Ref.: Cabrera, 1949b, 1963, 1974, 1978; Bremer & Humphries, 1993; Ariza Espinar, 1997.

Diagnosis: Hierba anual, pigmea, pubescente; hojas 2-3 pinnatisectas; capítulos sésiles en la axila de las hojas; flores del margen desnudas, las del disco tubulosas

Status: Nativa

Categoría: NT.

Ecología: En talares, ambientes naturales y modificados

Distrito: PET, PNE, PPA, PPR.

Partido: AVE, BAL, BER, CDR, CHA, CSM, ESC, GJM, GPU, IMG, JUN, LPT, LZA, MER, MRL, MRN, PIN, PUA, QUI, ROJ, SAA, SFR, SID, TAN, TAP, TIG, TRQ, VLP.

Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, RNG, SFE.

Uso: No se conoce

Ejemplar examinado: *Cabrera 6512* (LP).

308. *Soliva stolonifera* (Brot.) R. Br. ex G. Don

Sin.: *Gymnostyles lusitanica* Spreng., *Gymnostyles nasturtiifolia* Juss., *Gymnostyles stolonifera* (Brot.) Tutin, *Hippia stolonifera* Brot., *Soliva acaulis* Hook. & Arn., *Soliva anthemifolia* (Juss.) R. Br. ex Less. var. *acaulis* (Hook. & Arn.) Baker, *Soliva lusitanica* (Spreng.) Less.; *Soliva nasturtiifolia* (Juss.) DC.; *Soliva urbica* Phil.

Ref.: Cabrera, 1949b, 1963; Bremer & Humphries, 1993; Ariza Espinar, 1997.

Diagnosis: Hierba pigmea, rastrera, estolonífera, subglabra; hojas arrosetadas, pinnatisectas; capítulos solitarios; flores del margen apétalas, las del disco tubulosas

Status: Nativa

Categoría: NT.

Ecología: En ambientes naturales y en jardines

Distrito: PNE, PPR.

Partido: CAÑ, CHA, CSM, LPT, TIG.

Prov. limítrofe: DF, ERI.

Uso: No se conoce

Ejemplar examinado: *Cabrera 3349* (LP).

Sommerfeltia Less., Astereae

309. *Sommerfeltia spinulosa* (Spreng.) Less.

Sin.: *Conyza spinulosa* Spreng.

Ref.: Cabrera, 1963.

Diagnosis: Arbusto glanduloso; hojas pinnatisectas; capítulos solitarios; flores del margen blancas, las del disco amarillas

Status: Nativa

Categoría: NT.

Ecología: En roquedales y sierras

Distrito: PPA.

Partido: CSZ, GPU, SAA, TAN, TRQ.

Prov. limítrofe: No existen referencias

Uso: No se conoce

Ejemplar examinado: *Zardini 14* (LP).

Sonchus L., Cichorieae

310. *Sonchus asper* (L.) Hill

N. Vulgar: Cerraja

Sin.: *Sonchus oleraceus* L. var. *asper* L.

Ref.: Cabrera, 1963; Ariza Espinar & Urtubey, 1998.

Diagnosis: Hierba anual, con látex; hojas caulinares con aurículas basales redondeadas, dentado-espinosas; aquenios costados, lisos; papus piloso

Status: Adventicia

Categoría: NT.

Ecología: En ambientes modificados, ruderal

Distrito: PET, PMT, PPA, PPR.

Partido: BER, ENS, GLV, JUN, LPT, MHR, PAT, TRQ.

Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, SFE.

Uso: Alimenticia; Medicinal

Ejemplar examinado: *Cabrera 6758* (LP).

311. *Sonchus oleraceus* L.

N. Vulgar: Cerraja

Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978; Ariza Espinar & Urtubey, 1998.

Diagnosis: Hierba anual, con látex; hojas caulinares con aurículas agudas; aquenios con costillas denticuladas; papus piloso

Status: Adventicia

Categoría: NT.

Ecología: En laderas rocosas, dunas, arroyos y praderas

Distrito: PET, PPA, PPR.

Partido: GJM, GLV, GPU, IMG, LPT, MER, MHR, MIR, OLA, PER, PUA, TIG, TRQ.

Prov. limítrofe: CDB, DF, SFE.

Uso: Alimenticia; Alucinógena; Medicinal; Narcótica

Ejemplar examinado: *Cabrera 104* (LP).

312. *Sonchus tenerrimus* L.

Ref.: Cabrera, 1963; Ariza Espinar & Urtubey, 1998.

Diagnosis: Hierba anual, con látex; hojas pinnatisectas, auriculadas, semi-amplexicaules; aquenios con costillas arrugadas transversalmente; papus piloso

Status: Adventicia

Categoría: NT.

Ecología: En suelos modificados

Distrito: PET.

Partido: No existen referencias

Prov. limítrofe: DF.

Uso: Alimenticia; Medicinal

Ejemplar examinado: *A. T. Hunziker 801* (LP).



307



310



308



311



309



312

Stevia Cav., Eupatorieae

313. *Stevia aristata* D. Don ex Hook. & Arn.
Sin.: *Stevia aristata* D. Don Hook. & Arn. var. *typica* B. L. Rob. nom. inval., *Stevia polycephala* Auct. non Baker
Ref.: Robinson, 1930b; Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1974; Ariza Espinar, 1994.
Diagnosis: Hierba perenne, pubescente; hojas ovado-rómbicas, aserradas; filarios 5; flores 5, blancas o rosadas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos, a orillas de zanjas
Distrito: PNE, PPR.
Partido: LZA, SFR.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 4889* (LP).

314. *Stevia multiaristata* Spreng.
Sin.: *Pectis violacea* Griseb., *Stevia hirsuta* Hook. & Arn., *Stevia laxa* Hook. & Arn., *Stevia megapotamica* DC., *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch.Bip. var. *laxa* (Hook. & Arn.) Baker, *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch.Bip. var. *multiaristata* (Spreng.) Baker, *Stevia violacea* (Griseb.) Hieron.
Ref.: Robinson, 1930b; Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1974.
Diagnosis: Subarbusto erecto, pubescente; hojas lineares; filarios 5; flores 5, purpúreas
Status: Nativa
Categoría: R.
Ecología: En suelos secos y rocosos, en pastizales
Distrito: PPA, PPR.
Partido: BAL, CHA, TAN.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Frangi 329* (LP).

315. *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip.
Sin.: *Eupatorium satureiifolium* Lam., *Mikania satureiifolia* (Lam.) Willd., *Nothites satureiifolia* (Lam.) DC., *Stevia multiaristata* Griseb., hom. illeg., *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch.Bip. var. *angustifolia* Baker, *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch.Bip. var. *genuina* Hieron. hom. illeg.
Ref.: Robinson, 1930b; Cabrera & Vittet, 1954; Cabrera, 1971, 1974; Ariza Espinar, 1994.
Diagnosis: Subarbusto erecto, pubescente; hojas lineares; capítulos pedunculados; filarios 5; flores 5, rosadas o violáceas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos rocosos, albardones de conchillas de los bañados y en dunas
Distrito: PEC, PET, PPA, PPR.
Partido: BAL, LBR, LPT, MAG, MHR, OLA, PAT, SAA, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Ringuelet 246* (LP).

316. *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch.Bip. var. ***patagonica*** (Hieron.) Hieron.
Sin.: *Stevia multiaristata* Spreng. var. *patagonica* Hieron.
Ref.: Robinson, 1930b; Cabrera & Vittet, 1954.
Diagnosis: capítulos sésiles, hojas estrechamente lineares
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En sierras, entre los 250-700 m.s.m., y en dunas
Distrito: PPA, PPR.
Partido: BAL, BER, CDR, CLR, GPU, SAA, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 6839* (LP).

317. *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. var. ***ventanensis*** Cabrera
Ref.: Cabrera, 1941; Cabrera & Vittet, 1954.
Diagnosis: hojas oblanceoladas; capítulos casi sésiles
Status: Endémica
Categoría: NT.
Ecología: En roquedales y grietas, ca. 1100 m.s.m.
Distrito: PPA.
Partido: TRQ.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 8124* (LP).

Stuckertiella Beauverd, Inuleae

318. *Stuckertiella peregrina* Beauverd
Ref.: Cabrera, 1963, 1971.
Diagnosis: Hierba anual, decumbente, pubescente; hojas espatuladas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En médanos y praderas húmedas serranas asociada a alfalfares (*Medicago sativa*)
Distrito: PPA, PPO.
Partido: BBL, CDR, PEL, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 7998* (LP).

313

316



314



317



315



318

TAGETES L., HELENIEAE

319. *Tagetes minuta* L.
N. Vulgar: Chil-chil, Chilca, Chilquilla, Chilquita, Chinchilla, Floramar, Flor amar, Flor amarilla, Manzanillo silvestre, Matapulga, Picón del rey, Quinchigue, Suico, Suiquillo
Sin.: *Tagetes bonariensis* Pers., *Tagetes glandulifera* Schrank, *Tagetes glandulosa* Link, *Tagetes porophyllum* Vell.
Ref.: Ferraro, 1955; Ariza Espinar, 1967; Petenatti & Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba anual; hojas y brácteas involucrales con bolsas oleíferas; papus formado por 5-6 páleas desiguales
Status: Nativa; Maleza
Categoría: NT.
Ecología: En sabanas, terrenos baldíos y al borde de caminos
Distrito: PEC, PET, PNE, PPA.
Partido: BBL, BNJ, CHM, GLH, GPU, LIN, LOB, LPT, PAT, SFR, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, DF, ERI, PAM, SFE.
Uso: Condimento; Forrajera; Insecticida; Medicinal; Tintórea; Tóxica
Ejemplar examinado: *Rodrigo 3419* (LP).

TANACETUM L., ANTHEMIDEAE

320. *Tanacetum balsamita* L.
N. Vulgar: Menta romana, Té de pedrero, Yerba de San Pedro
Sin.: *Balsamita major* Desf., *Chrysanthemum balsamita* (L.) Baill., *Leucanthemum balsamita* (L.) Over; *Pyrethrum balsamita* (L.) Willd., *Pyrethrum balsamitoides* (Náb.) Tzvelev, *Pyrethrum majus* (Desf.) Tzvelev
Ref.: Cabrera 1963; Cabrera & Zardini, 1978; Bremer & Humphries, 1993; Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas basales aovadas o elípticas, las apicales auriculadas; capítulos en corimbos; flores tubulosas
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En rastrojos y bordes de caminos
Distrito: PPR.
Partido: ATB.
Prov. limítrofe: DF, PAM.
Uso: Aromática; Medicinal; Ornamental
Ejemplar examinado: *Molfino 381* (BAF); SI *8490* (LP).

321. *Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip.
N. Vulgar: Altamisa, Artemisa, Camamilla amarga, Margarita, Piretro de jardín
Sin.: *Chrysanthemum parthenium* (L.) Bernh., *Leucanthemum parthenium* (L.) Gren. & Godr., *Matricaria parthenium* L., *Pyrethrum parthenium* (L.) Smith
Ref.: Cabrera 1963; Cabrera & Zardini, 1978; Moore, 1983; Bremer & Humphries, 1993; Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas pecioladas, 1-3 pinnatisectas; capítulos en corimbos pedunculados; flores del margen blancas, las del disco tubulosas
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En cultivos, escombros y rastrojos
Distrito: PNE, PPR.
Partido: LPT, TIG.
Prov. limítrofe: CDB, RNG.
Uso: Aromática; Cosméticos; Industrial (licorería); Medicinal (adulterante de la *Matricaria*); Ornamental
Ejemplar examinado: *Boffa 3100* (LP).

322. *Tanacetum vulgare* L.
N. Vulgar: Palma imperial, Tanaceto, Yerba de San Marcos
Sin.: *Chrysanthemum vulgare* (L.) Bernh., *Pyrethrum vulgare* (L.) Boiss.
Ref.: Cabrera 1963, 1971; Moore, 1983; Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba perenne, glandulosa; hojas 2-3 pinnatisectas; flores del margen 3-dentadas, las del disco 5-dentadas; papus irregularmente denticulado
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados
Distrito: PET, PNE, PPR.
Partido: BER, LPT, MAG.
Prov. limítrofe: DF, RNG.
Uso: Condimento; Insecticida; Medicinal; Ornamental
Ejemplar examinado: *Cabrera 594* (LP).

TARAXACUM HALLER., CICHORIEAE

323. *Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC.
Sin.: *Leontodon laevigatus* Willd., *Taraxacum erythrospermun* Andrz. ex Besser
Ref.: Ariza Espinar & Urtubey, 1998.
Diagnosis: Hierba perenne, acaule, con látex; hojas arrosetadas; aquenios costados en la base, espinulosos en el ápice; papus piloso
Status: Adventicia, Maleza
Categoría: K.
Ecología: En campos, asociada a cultivos
Distrito: No existen referencias
Partido: No existen referencias
Prov. limítrofe: No existen referencias
Uso: Industrial (cauchífera)
Ejemplar examinado: *Marzocca s.n.* (BAB)

324. *Taraxacum officinale* Weber
N. Vulgar: Achicoria, Amargón, Diente de león
Sin.: *Leontodon taraxacum* L., *Leontodon vulgare* Lam., *Taraxacum dens-leonis* Desf., *Taraxacum vulgare* (Lam.) Schrank.
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba perenne, con látex, acaule; filarios externos reflexos; aquenios largamente rostrados; papus piloso
Status: Adventicia; Cultivada; Maleza
Categoría: NT.
Ecología: En praderas, orillas de ríos, lugares modificados, húmedos y sombríos
Distrito: PET, PNE, PPA, PPR.
Partido: DEL, GLV, IMG, LPT, OLA, PIN, TRQ.
Prov. limítrofe: DF.
Uso: Alimenticia; Medicinal
Ejemplar examinado: *Nicora & Giardelli 120* (LP).



319



322

320

323

321



324

Tessaria Ruiz & Pav., Inuleae

325. *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC.
N. Vulgar: Brea, Pájaro bobo, Suncho negro
Sin.: *Baccharis absinthioides* Hook. & Arn., *Gynheteria incana* Spreng. *Pluchea absinthioides* (Hook. & Arn.) H. Rob. & Cuatrec.
Ref.: Cabrera, 1939, 1963, 1971, 1978; Ariza Espinar, 1979.
Diagnosis: Arbusto canescente; hojas lanceoladas, aserradas; flores blancas, las del disco 12-14, cortamente lobadas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos y arenosos, en dunas, común en terrenos altos
Distrito: PEC, PET, PPA, PPR.
Partido: BBL, GJM, GLV, MCH, MHR, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, RNG.
Uso: Alimenticia; Fabricación de brea; Ritual
Ejemplar examinado: *Cabrera 10063* (LP).

326. *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav.
N. Vulgar: Aliso, Aliso de río, Bobo, Pájaro bobo, Palo bobo
Sin.: *Gynheteria incana* Spreg. *Tessaria dentata* Ruiz & Pavón; *Tessaria legitima* DC.
Ref.: Cabrera, 1974; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Arbol, raramente arbusto, blanco-pubescente; hojas oblanceoladas o elípticas; flores rosado-pálidas, las del disco 1, profundamente lobada
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En orillas de ríos
Distrito: PNE.
Partido: IMG, SFR.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Burkart 1240* (LP).

327. *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. var. ***ambigua*** (DC.) S. E. Freire
N. Vulgar: Aliso, Aliso de río, Bobo, Pájaro bobo, Palo bobo
Sin.: *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC. var. *ambigua* (DC.) R. E. Fr., *Tessaria ambigua* DC., *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. var. *polyandra* Cabrera
Ref.: Freire, 1997.
Diagnosis: Flores del disco 3-6
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares húmedos, a orillas de ríos
Distrito: PNE.
Partido: SNC.
Prov. limítrofe: CDB, SFE.
Uso: Algodón de pólvora; Construcción; Fabricación de papel;
Ejemplar examinado: *Parodi 8892* (BAA).

Thelesperma Less., Heliantheae

328. *Thelesperma megapotamicum* (Spreng.) Kuntze
N. Vulgar: Té indio, Té pampa
Sin.: *Bidens leyboldii* Phil., *Bidens megapotamica* Spreng., *Bidens paradoxa* Don ex Hook. & Arn., *Thelesperma scabiosoides* Less.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974; Cabrera & Zardina, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas pinnatisectas a 2-pinnatisectas; capítulos solitarios, pedunculados; papus con dos pajitas cubiertas por pelos retrorsos
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos arenosos
Distrito: PPA, PPO.
Partido: BBL, CSZ, LIN, MHR, NEC, PEH, PEL, TAN, TLQ, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Sáenz 1685* (LP).

Thymophylla Lag., Helenieae

329. *Thymophylla pentachaeta* (DC.) Small var. ***belenidium*** (DC.) Strother
N. Vulgar: Perlilla
Sin.: *Dyssodia belenidium* (DC.) Macloskie, *Dyssodia cupulata* A. Nelson, *Dyssodia gracilis* (Rydb.) Cory, *Dyssodia pentachaeta* (DC.) Rob. var. *belenidium* (DC.) Strother, *Dyssodia thurberi* (A. Gray) Rob., *Hymenatherum belenidium* DC., *Hymenatherum candolleanum* Hook. & Arn., hom. illeg., *Hymenatherum thurberi* A. Gray, *Tagetes belenidium* (DC.) Kuntze, *Thymophylla belenidium* (DC.) Cabrera, *Thymophylla gracilis* Rydb., *Thymophylla thurberi* (A. Gray) Wooton & Standl.
Ref.: Strother 1969, 1986; Petenatti & Ariza Espinar, 1997.
Diagnosis: Hierba caulescente con bolsas oleíferas; hojas pinnatisectas; papus formado por 10 páleas iguales
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos arenosos, pedregosos
Distrito: PEC, PMT.
Partido: BBL, CLR, PAT, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, RNG.
Uso: Aromática
Ejemplar examinado: *Villar 10* (LP).

Tragopogon L., Cichorieae

330. *Tragopogon dubius* Scop.
Sin.: *Tragopogon majos* Jacq.
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba bienal, con látex; hojas linear-lanceoladas; pedúnculos engrosados; filarios uniseriados; flores amarillas; papus plumoso
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En suelos húmedos y vías del ferrocarril
Distrito: PPA, PPO.
Partido: CSZ, PEL, TAN, TRQ, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, PAM.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 6667* (LP).

325



328

326-327



329



330

331. *Tragopogon porrifolius* L.
N. Vulgar: Salsifí
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba anual o bienal, glabra, con látex; hojas linear-lanceoladas, semi-amplexicaules; filarios uniseriados; flores violáceas o azules; papus plumoso
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En suelos modificados y rastrojos
Distrito: No existen referencias
Partido: No existen referencias
Prov. limítrofe: RNG.
Uso: Alimenticia; Medicinal
Ejemplar examinado: *Ruiz Leal 10528* (LP).

332. *Tragopogon pratensis* L.
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba anual, bienal o perenne, glabra, con látex; hojas lineares a lanceoladas, semi-amplexicaules; filarios uniseriados; flores amarillas; papus plumoso
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En rastrojos
Distrito: No existen referencias
Partido: SID, TRQ.
Prov. limítrofe: No existen referencias
Uso: Alimenticia; Medicinal
Ejemplar examinado: *Molfino I-1918* (BAF).

Trichocline Cass., Mutisieae

333. *Trichocline reptans* (Wedd.) Rob.
N. Vulgar: Arnica, Contrayerba, Coro, Yerba china, Yerba del ciervo
Sin.: *Bichenia reptans* Wedd., *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze var. *intermedia* Kuntze, *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze var. *reptans* (Wedd.) Kuntze, *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze var. *reptans* (Wedd.) Kuntze f. *aurantiaca* Kuntze, *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze var. *reptans* (Wedd.) Kuntze f. *pallida* Kuntze
Ref.: Zardini, 1975; Katinas, 1996a.
Diagnosis: Hierba acaule; hojas arrosetadas, sinuadas o lobadas; brácteas del invólucro gradualmente mayores hacia el interior
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos arenosos, pedregosos
Distrito: PEC, PMT.
Partido: PAT, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, PAM, RNG, SFE.
Uso: Aromática; Medicinal
Ejemplar examinado: *Fabris 5685* (LP).

334. *Trichocline sinuata* (D. Don) Cabrera
N. Vulgar: Árnica del campo
Sin.: *Bichenia sinuata* D. Don
Ref.: Zardini, 1975; Katinas, 1996a.
Diagnosis: Hierba acaule; hojas arrosetadas, enteras o lobadas; brácteas del invólucro todas de la misma longitud
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos rocosos, arenosos
Distrito: PPA.
Partido: CPR, GPI, GVL, PAT, SAA, TRQ, VIL.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 5667* (LP).

Trixis P. Br., Mutisieae

335. *Trixis nobilis* (Vell.) Katinas
N. Vulgar: Arnica, Arnica del campo, Arnica gigantesca, Solidonia misionera, Urusú-catí, Yaguareté-caá
Sin.: *Castra nobilis* Vell., *Trixis glaberrima* Less., *Trixis glabrata* Baker, hom. illeg., *Trixis megapotamica* Hook. & Arn., *Trixis rosea* Baker, hom. illeg., *Trixis stricta* Mart. non (Spreng.) Less., hom. illeg., *Trixis suaveolens* Baker, hom. illeg., *Trixis verbasciformis* Less., *Trixis verbasciformis* Less. var. *glaberrima* (Less.) Malme, *Trixis verbasciformis* Less. var. *intermedia* Malme
Ref.: Cabrera, 1936; Katinas, 1995, 1996b.
Diagnosis: Subarbusto; tallos alados; hojas elíptico-lanceoladas, blanco amarillentas, tomentosas en el envés; capítulos en pseudoespigas; flores anaranjadas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos, pedregales, suelos húmedos
Distrito: PNE.
Partido: TIG.
Prov. limítrofe: SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Burkart 4429* (LP).

336. *Trixis praestans* (Vell.) Cabrera
N. Vulgar: Humo bravo, Tabaquillo de monte
Sin.: *Cacalia praestans* Baker, hom. illeg., *Castra praestans* Vell., *Trixis flexuosa* Baker hom. illeg., *Trixis missionum* Cabrera, *Trixis mollissima* D. Don
Ref.: Cabrera, 1936; Katinas, 1995, 1996b.
Diagnosis: Arbusto; tallos no alados; hojas ovado-lanceoladas, blanco-seríceas en el envés; capítulos en pseudorracimos; flores amarillas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En bosques, capueras y al costado de caminos
Distrito: PET, PNE.
Partido: IMG, LPT, ZAR.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 17233* (LP).



331



334

332



335

333



336

Urospermun Scop., Cichorieae

337. *Urospermun picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
Sin.: *Tragopogon picroides* L.
Ref.: Cabrera, 1963.
Diagnosis: Hierba anual, con látex; hojas basales runcinadas, denticulado-espinosas, las apicales lanceoladas, auriculadas; filarios uniseriados con espinas; flores amarillas
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En suelos modificados
Distrito: PET.
Partido: SID.
Prov. limítrofe: DF, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Molfino XII-1923* (BAF).

Verbesina L., Heliantheae

338. *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f.
N. Vulgar: Flor de Santa María, Girasolcito, Girasolcito del campo, Mirasol, Mirasolcito, Mirasolcito del campo, Suncho
Sin.: *Verbesina australis* Blake, *Verbesina scabra* Phil., *Ximenesia encelioides* Cav., *Ximenesia microptera* DC.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hierba anual; hojas ovado-triangulares con pecíolos alados; capítulos en cimas corimbiformes; aquenios alados; papus con dos aristas delgadas muy cortas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados, ruderal
Distrito: PEC, PET, PMT, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: Ampliamente distribuida
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Dawson 3012* (LP).

339. *Verbesina subcordata* DC.
Sin.: *Verbesina auriculata* Hook. & Arn., *Verbesina heterosperma* Griseb.
Ref.: Cabrera, 1963; 1974; Cabrera & Zardini, 1978; Sáenz, 1996.
Diagnosis: Arbusto; hojas alternas, semi-auriculadas, lanceoladas; capítulos en cimas corimbiformes; aquenios alados; papus con dos aristas muy cortas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos arenosos y de conchillas
Distrito: PET, PNE.
Partido: ENS, IMG, MAG, SFR, TIG.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Sáenz 1545* (LP, SI).

Vernonia Schreb., Vernonieae

340. *Vernonia echioides* Less.
Sin.: *Eupatorium arechavaletae* Baker, *Vernonia lingua* Chodat, *Vernonia oreophila* Speg., *Vernonia spegazzinii* Hicken
Ref.: Cabrera, 1944, 1963, 1974.
Diagnosis: Hierba perenne, pubescente; hojas linear-lanceoladas, enteras o crenadas; capítulos en umbela de cincinos; flores numerosas, violáceas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos secos y rocosos y en bosques ribereños
Distrito: PET, PNE, PPR.
Partido: ENS, GLV, LPT, SFR, TAN, ZAR.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 742* (LP).

341. *Vernonia flexuosa* Sims.
N. Vulgar: Quiebra arado, Quiebrarao
Sin.: *Cacalia flexuosa* Kuntze, *Chrysolaena flexuosa* (Sims.) H. Rob., *Vernonia montevidensis* Nees. ex Otto & Dietr.
Ref.: Cabrera, 1944, 1974.
Diagnosis: Hierba perenne, glabra o pubescente; hojas oblanceoladas, enteras; capítulos en cincinos de 3 ó más; flores 50 o casi, purpuráceas, violáceas o blancas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En roquedales bajos, faldeos con exposición norte, entre los 100-250 m.s.m., sobre terrenos secos
Distrito: PPA, PPR.
Partido: BAL, CHM, GPU, LBR, LZA, MAG, OLA, TAN.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Fabris 2644* (LP).

342. *Vernonia incana* Less.
Sin.: *Cacalia incana* (Less.) Kuntze, *Vernonia inmunis* Griseb.
Ref.: Cabrera, 1944, 1974, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne, albo-pubescente; hojas lanceoladas, enteras o aserradas; capítulos en amplios corimbos cincinados en el ápice; flores 15-25, violáceas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos bajos y húmedos, rara en praderas prístinas
Distrito: PPA, PPR.
Partido: LBR, MAG.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 632* (LP).



337



340

338



341

339

342

343. *Vernonia mollissima* D. Don ex Hook. & Arn.
Sin.: *Cacalia mollissima* (D.Don ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Lessingianthus mollissimus* (D.Don ex Hook. & Arn.) H. Rob., *Vernonia mollissima* D. Don ex Hook. & Arn. var. *microcephala* Hieron.
Ref.: Cabrera, 1944, 1974.
Diagnosis: Subarbusto albo-pubescente; hojas lanceoladas, enteras; capítulos en corimbos; flores muy numerosas, purpúreas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos prístinos, ocasionalmente a orillas de caminos
Distrito: PPR.
Partido: JUN.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Burkart 7506* (SI).

344. *Vernonia nitidula* Less.
N. Vulgar: Chilca
Sin.: *Baccharis montevidensis* Spreng., *Piptocarpha nitidula* (Less.) Griseb., *Vernonia arechavaletae* André, *Vernonia gochnatioides* Hook. & Arn., *Vernonia nitidula* Less. var. *acutifolia* Griseb.
Ref.: Cabrera 1944, 1974.
Diagnosis: Arbusto sedoso-pubescente; hojas oblanceoladas, enteras o dentadas; capítulos en panojas de densos corimbos 8-14, liláceas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En albardones arenosos
Distrito: PNE.
Partido: IMG.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Molfino & Clos 472* (LP).

345. *Vernonia platensis* (Spreng.) Less.
Sin.: *Cacalia platensis* (Spreng.) Kuntze, *Chrysolaena platensis* (Spreng.) H. Rob., *Conyza platensis* Spreng.
Ref.: Cabrera, 1944.
Diagnosis: Hierba perenne, sedoso-pubescente; hojas oblanceoladas, aserradas; capítulos en panojas de cincinos; flores 40 o casi, violáceas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En lugares húmedos
Distrito: PET.
Partido: BER, ENS, LPT, TIG.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 719* (LP).

346. *Vernonia pseudoincana* (Hieron.) Cabrera
N. Vulgar: Quiebra arado
Sin.: *Cacalia rubricaulis* (Humb. & Bonpl.) Kuntze var. *pseudoincana* (Hieron.) Kuntze, *Vernonia rubricaulis* Humb. & Bonpl. var. *australis* Hieron, *Vernonia rubricaulis* Humb. & Bonpl. var. *pseudoincana* Hieron.
Ref.: Cabrera, 1974.
Diagnosis: Subarbusto glabro o pubescente; hojas lineares a lanceoladas, enteras o dentadas, glabrescentes en el envés; capítulos en panojas de cincinos; flores numerosas, purpúreas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos y estepas
Distrito: PPA, PPO, PPR, PNE.
Partido: CHA, CHM, GLV, GPI, LIN, LBR, LFL, LOB, LPT, MAG, MRL, PER, SNC.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Ragonese 203** (LP).

347. *Vernonia rubricaulis* Humb. & Bonpl.
N. Vulgar: Quiebra arado
Sin.: *Cacalia intermedia* (DC.) Kuntze, *Cacalia rubricaulis* (Humb. & Bonpl.) Kuntze, *Lessingianthus rubricaulis* (Humb. & Bonpl.) H. Rob., *Vernonia intermedia* DC., *Vernonia linearis* D. Don ex Hook. & Arn., *Vernonia salicifolia* Gill. ex Hook & Arn.
Ref.: Cabrera, 1944, 1974, 1978.
Diagnosis: Subarbusto glabro o pubescente; hojas lineares, enteras o dentadas, pubescentes en el envés; capítulos en panojas de cincinos; flores numerosas, purpúreas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En campos altos de suelos arenosos y en praderas prístinas
Distrito: PET, PPA, PPO, PPR.
Partido: AVE, ESC, GPI, GVL, LBR, LIN, LPT, LUJ, MAG, MRL, NEC, SVT.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 6332* (LP).

348. *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. ***sororia*** (DC.) Baker
Sin.: *Cacalia scorpioides* (Lam.) Kuntze var. *sororia* (DC.) Kuntze, *Vernonia sororia* DC.
Ref.: Cabrera, 1944.
Diagnosis: Arbusto apoyante o semitrepador, griseo-sedoso, pubescente, hojas ovado-lanceoladas, denticuladas; capítulos en panojas de cincinos; flores 20-30, violáceas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En selvas ribereñas
Distrito: PNE.
Partido: IMG.
Prov. limítrofe: ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Hurrel et al., 958* (LP).



343



346



344

347



345

348

Viguiera Kunth., Heliantheae

349. *Viguiera anchusaefolia* (DC.) Baker

Sin.: *Leighia anchusaefolia* DC., *Leighia baldwiniana* Nutt., *Leighia dissitifolia* DC., *Leighia inmarginata* DC., *Leighia lomatoneura* DC.
Ref.: Cabrera, 1974; Cabrera & Zardini, 1978; Saénz, 1979.
Diagnosis: Subarbusto; hojas basales opuestas, el resto alternas, oblongas; capítulos pedunculados, solitarios; papus persistente de escamitas unidas y dos aristas de casi el doble del tamaño
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos secos
Distrito: PET, PNE.
Partido: BAR, BER, ENS, MAG, PIN, SFR, TIG.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 6415* (LP, SI).

350. *Viguiera anchusaefolia* (DC.) Baker var. ***inmarginata*** (DC.) Baker

Sin.: *Leighia stenophylla* Hook. & Arn., *Viguiera stenophylla* (Hook. & Arn.) Griseb.
Ref.: Cabrera, 1974; Cabrera y Zardini, 1978; Saénz, 1979.
Diagnosis: Subarbusto; hojas basales opuestas, el resto alternas, linear-oblongas; capítulos pedunculados, solitarios; papus persistente de escamitas unidas y dos aristas de casi el doble del tamaño
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos secos
Distrito: PET, PNE.
Partido: BAR, BER, ENS, MAG, PIN, SFR, TIG.
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Cabrera 779* (LP, SI).

Wedelia Jacq., Heliantheae

351. *Wedelia glauca* (Ortega) Hoffm. ex Hicken

N. Vulgar: Asolador, Chilca amarga, Chilquilla, Clavel amarillo, Espantacolono, Flor de sapo, Mata sapo, Sunchillo, Yerba del sapo, Yuyo sapo
Sin.: *Helianthus copiapanus* Phil., *Leighia ecliptifolia* DC., *Lorentzia pascalaides* Griseb., *Pascalia glauca* Ortega, *Wedelia chrysostephana* Griseb., *Wedelia copiapana* (Phil.) Reiche, *Wedelia ecliptaefolia* (DC.) B.L. Turner
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hierba perenne; hojas lanceoladas; capítulos pedunculados, solitarios; aquenios glabros; papus con una coronita de escamas cortas, a veces con dos aristas breves
Status: Nativa; Maleza
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados, al borde de caminos y vías férreas
Distrito: PEC, PET, PMT, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: Ampliamente distribuida
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 5154* (LP).

Xanthium L., Heliantheae

352. *Xanthium ambrosioides* Hook. & Arn.

N. Vulgar: Cepa caballo
Ref.: Cabrera, 1963, 1971.
Diagnosis: Hierba anual, con espinas trífidas; hojas pinnatisectas, seríceas; aquenios cubiertos de espinas ganchudas con rostro erecto
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos secos
Distrito: PEC, PPO.
Partido: PEH, TLQ.
Prov. limítrofe: PAM, RNG.
Uso: Medicinal
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (LP).

353. *Xanthium cavanillesii* Schouw

N. Vulgar: Abrojo, Abrojo grande, Abrojo macho
Sin.: *Xanthium australe* Millsp. & Sherff
Ref.: Cabrera, 1971, 1974, 1978; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hierba anual; hojas ovado-triangulares, acorazonadas en la base; aquenios cubierto por espinas ganchudas y dos rostros apicales
Status: Nativa; Maleza
Categoría: NT.
Ecología: En todo tipo de suelos
Distrito: PEC, PET, PMT, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: Ampliamente distribuida
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Insecticida; Medicinal; Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 175* (LP).

354. *Xanthium saccharatum* Wallr.

N. Vulgar: Abrojo
Ref.: Cabrera, 1963, 1974; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hierba anual; hojas ovadas a ovada-deltoidea; aquenios cubierto de espinas y dos rostros apicales de igual longitud
Status: Adventicia
Categoría: K.
Ecología: En suelos modificados
Distrito: PPR.
Partido: No existen referencias
Prov. limítrofe: ERI.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Parodi 7223* (LP).



349



352

350



353

351



354

355. *Xanthium spinosum* L.
N. Vulgar: Abrojillo, Abrojito, Abrojo, Abrojo chico, Amor de negro, Cepa caballo
Sin.: *Acanthoxanthium spinosum* (L.) E. Fourn.
Ref.: Cabrera, 1963, 1971, 1974, 1978; Cabrera & Zardini, 1978.
Diagnosis: Hierba anual, con espinas trífidas; hojas enteras con un lóbulo a cada lado; aquenios cubierto de espinas ganchudas, con rostro erecto
Status: Adventicia; Maleza
Categoría: NT.
Ecología: En suelos modificados
Distrito: PEC, PET, PMT, PNE, PPA, PPO, PPR.
Partido: Ampliamente distribuidas
Prov. limítrofe: CDB, ERI, PAM, RNG, SFE.
Uso: Industria (conservante de carnes); Medicinal; Tintórea; Tóxica
Ejemplar examinado: *Cabrera 173* (LP).

Zexmenia L., Heliantheae

356. *Zexmenia buphtalmiflora* (Lorentz) Ariza
Sin.: *Wedelia buphtalmiflora* Lorentz
Ref.: Cabrera, 1963; Cabrera & Zardini, 1978; Ariza Espinar, 1982b.
Diagnosis: Subarbusto; hojas lanceoladas a linealllanceoladas; capítulos solitarios; aquenios 3-alados, los del margen y 2-alados los del disco; papus formado por una corona de pajitas unidas y dos aristas desiguales
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos rocosos
Distrito: PPA.
Partido: MHR, PUA, SAA, TAN, TRQ.
Prov. limítrofe: CDB, PAM.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Bottino 161* (LP).

ADDENDA

357. *Crepis foetida* L.
Ref.: Ariza Espinar, 1967; Arziza Espinar & Urtubey, 1998; Villamil & Long, 1999; Troiani & Steibel, 1999
Diagnosis: Hierba anual, fétida, con látez; flores amarillas; aquenios dimorfos, con papus largamente rostrado
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes modificados
Distrito: PPA.
Partido: BBL, TAY, TRQ.
Prov. limítrofe: PAM.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Villamil 4778* (BBB).

358. *Crepis vesicaria* L.
Ref.: Villamil & Long, 1999
Diagnosis: Hierba anual, bienal o perenne, con látex; flores amarillas, brácteas involucrales sin pelis, a veces con pelos glandulares capitados; aquenios isomorfos, con rostro.
Status: Adventicia
Categoría: NT.
Ecología: Ambientes modificados
Distrito: PPA.
Partido: CSZ, SAA, TRQ.
Prov. limítrofe: No existen referencias.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Villamil 8852* (BBB, LP).

359. Grindelila cabrerae Ariza
Ref.: Bártoli & Tortosa, 1999.
Diagnosis: Subarbusto; hojas enteras, pseudopecioladas, espinuloso-dentadas, pubescentes; capítulos solitarios, radiados; invólucro pubescente-glanduloso; flores amarillas; aquenios costados; papus formado por 2-5 aristas aplanadas
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En ambientes cercanos a cuerpos de agua
Distrito: PPR.
Partido: CAÑ, PER.
Prov. limítrofe: CDB, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Parodi 1868* (LP).

360. *Grindelia patagonica* A. Bártoli & Tortosa
Ref.: Bártoli & Tortosa, 1999.
Diagnosis: Subarbusto; hojas glandulosas, pilosas en los nervios, obovadas, dentadas; capítulos solitarios, radiados; invólucro glanduloso; flores amarillas; aquenios aplanados; papus formado por 6-10 aristas paleáceas.
Status: Nativa
Categoría: NT.
Ecología: En suelos modificados
Distrito: PEC.
Partido: CLR.
Prov. limítrofe:CDB, ERI, SFE.
Uso: No se conoce
Ejemplar examinado: *Valentin s/n.* (LP).

355

358



356

359

357



360

361. *Scorzonera lacinita* L.

Ref.: Bártoli & Roitman, 1990; Ariza Espinar & Urtubey, 1998.

Diagnosis: Hierba; hojas arrosetadas, profundamente pinnatisectas; capítulos solitarios; invólucro con filarios glabros, con un apéndice subapical; aquenios con podogino; papus plumoso.

Status: Adventicia

Categoría: NT.

Ecología: En campos

Distrito: PPA.

Partido: GLM, LAP, TAY.

Prov. limítrofe: No existen referencias.

Uso: No se conoce

Ejemplar examinado: *Batista 170* (BBA).



CONCLUSIONES

Las Compuestas están representadas en la flora de la provincia de Buenos Aires por 113 géneros que corresponde al 34% del total de géneros descriptos (222) en esta familia para Argentina. Estos géneros comprenden 356 especies que representan el 18% de la totalidad de especies registradas en el país.

De las 356 especies 17 son endémicas como se detalla en el cuadro siguiente:

Taxa endémicos	Categoría	Distrito	Partidos
Baccharis rufescens var. *ventanicola*	NT	PPA	CSZ, SAA, TRO
Baccharis tandilensis	R	PPA	BAL, GPU, TAN
Conyza serrana	R	PPA	CPR, CSZ, TAN, TRQ
Grindefia aegialitis	V	PET, PPA	GPU, MCH, TAN
Grindefia ventanensis	NT	PPA	TRQ
Hieracium burkartii	R	PPA	SAA, TRQ
Hieracium chacoense	R	PPA	TRO
Hieracium tandilense	R	PPA	TAN
Hypochaeris rosengurttii var *pinnatifida*	NT	PPA	BAL, SAA, TAN, TRO
Hysterionica pinifolia	NT	PPA	BAL, GPU, LBR, PUA, SAA, TAN, TRO
Senecio bravensis	R	PPA	GAL, GPU
Stevia satureiifolia var. *ventanensis*	NT	PPA	TRQ
Senecio leucopeplus	R	PPA	BBL, TRO
Senecio melanopotamicus	K	PMT	PAT
Senecio quequensis	R	PPA	BBL, CDR, MHR
Senecio tandilensis	K	PPA	TAN
Senecio ventanensis	R	PPA	BBL, CPR, CSZ, SAA, TRQ

Representatividad de especies en los partidos de la provincia de Buenos Aires

Si bien el partido con mayor número de especies de Compuestas es el de La Plata (LPT) con 123 especies, esto probablemente se debe a que es una de las localidades con mayor muestreo. Le siguen los partidos de Tornquist (TRQ) con 105 especies y Tandil (TA) con 93 especies, estos dos últimos, ambos perteneciente al distrito Austral (PPA) y con una complejidad orográfica y climática que garantiza y condiciona esta diversidad. La Isla Martín García (IMG) con 69 especies constituye todo un mosaico de comunidades vegetales, donde confluyen floras diversas provenientes de los distintos distritos fitogeográficos.

Agunos partidos como Alberti (ALB), Ayacucho (AYA), Bartolomé Mitre (BMT), General Alvear (GAV), Malvinas Argentinas (MAR) y Tres Lomas (TLM) entre otros, carecen de registros de compuestas, lo cual puede deberse probablemente a la ausencia de muestreos en estas zonas.

AAL	5	CST	6	GRZ	0	MHR	44	SAD	10
AGC	2	CSZ	36	GSM	4	MIR	7	SAG	0
ALB	0	CTJ	0	GUA	5	MON	5	SAL	1
ATB	0	CHA	17	GVI	0	MOR	0	SAQ	7
AVE	30	CHI	0	GVL	10	MPZ	1	SAR	5
AYA	0	CHM	27	HUR	4	MRL	4	SCY	0
AZU	9	DAI	4	HYR	2	MRN	8	SFR	37
BAL	65	DOL	5	IMG	69	NAV	0	SID	20
BAR	12	EEV	4	ITU	3	NEC	10	SMG	0
BBL	46	ENS	64	JCP	0	NJL	2	SNC	22
BER	31	ESC	26	JUN	32	OLA	28	SPD	14
BMT	0	EXC	2	LAN	0	PAT	54	SUI	1
BNJ	1	EZE	0	LAP	1	PEH	14	SVT	0
BOL	4	FAM	0	LBR	31	PEL	21	TAN	93
BRA	0	FVL	1	LFL	4	PER	24	TAP	2
BZT	16	GAL	25	LIN	15	PIL	1	TAY	15
CAM	22	GAR	0	LMT	2	PIN	26	TFB	4
CAÑ	7	GAV	0	LNA	0	PLR	3	TIG	53
CAR	0	GBG	1	LOB	4	PMR	10	TLM	0
CAS	4	GGD	1	LPT	123	PUA	16	TLQ	14
CBR	0	GJM	31	LUJ	12	QUI	17	TOR	9
CCR	2	GLH	2	LZA	20	RAM	3	TRQ	105
CDR	14	GLM	0	MAG	44	RAU	1	VGS	1
CLR	21	GLV	34	MAI	8	RIV	1	VIL	36
COL	1	GPA	0	MAR	0	ROJ	3	VLP	3
CPR	6	GPI	8	MCH	5	RPZ	0	VMA	8
CSM	14	GPU	68	MER	6	SAA	34	ZAR	8

Representatividad del número de especies en los distritos biogeográficos de la provincia de Buenos Aires



El mayor número de especies (206) se hallan representadas en el distrito Austral (PPA) que incluye los cordones serranos de Balcarce, Ventania y Tandilia, seguidos de los distritos: Oriental -PPR (167)-, del Talar -PET (132)- y Paranaense -PNE (132)-, siendo además la provincia del Monte -PMT (49)- la menor representada en cuanto al número de especies.

Categorías conservacionistas de las compuestas de la provincia de Buenos Aires

Las Compuestas están representadas en la provincia de Buenos Aires por 267 especies indígenas o nativas, 55 adventicias y 16 naturalizadas.

De las 267 especies nativas, 11 (*Baccharis melanopotamica*, *Baccharis triangularis*, *Baccharis tridentata* var. *subopposita*, *Baccharis gnaphalioides*, *Baccharis albida*, *Baccharis phyteumoides*, *Baccharis caprariifolia*, *Chaptalia nutans*, *Grindelia aegialitis*, *Pterocaulon lorentzii*, *Schlechtendalia luzulaefolia*) están en la categoría de vulnerables (V), en tanto que dos de ellas (*Baccharis cordobensis*, *Eupatorium lanigerum* var. *crassipes*) se encuentran extintas (EX) para la provincia.

INDICE DE NOMBRES VALIDOS

1. *Acanthospermum australe*, 4
2. *Acanthospermum hispidum*, 4
3. *Achillea millefolium*, 4
4. *Achyrocline alata*, 4
5. *Achyrocline satureioides*, 4
6. *Acmella bellidioides*, 4
7. *Acmella decumbens*, 6
8. *Acmella decumbens var. affinis*, 6
9. *Acmella pusilla*, 6
10. *Acroptilon repens*, 6
11. *Adenostemma brasilianum*, 6
12. *Ageratum conyzoides*, 6
13. *Ambrosia elatior*, 8
14. *Ambrosia scabra*, 8
15. *Ambrosia tenuifolia*, 8
16. *Anthemis cotula*, 8
17. *Arctium minus*, 8
18. *Arctotheca calendula*, 8
19. *Artemisia absinthium*, 10
20. *Artemisia annua*, 10
21. *Artemisia verlotiorum*, 10
22. *Aspilia pascalioides*, 10
23. *Aspilia silphioides*, 10
24. *Aster squamatus*, 10
25. *Aster squamatus var. graminifolius*, 12
26. *Baccharidastrum argutum*, 12
27. *Baccharidastrum triplinervium*, 12
28. *Baccharis albida*, 12
29. *Baccharis artemisioides*, 12
30. *Baccharis articulata*, 12
31. *Baccharis caprariifolia*, 14
32. *Baccharis cordobensis*, 14
33. *Baccharis coridifolia*, 14
34. *Baccharis crispa*, 14
35. *Baccharis darwinii*, 14
36. *Baccharis divaricata*, 14
37. *Baccharis genistifolia*, 16
38. *Baccharis gilliesii*, 16
39. *Baccharis gnaphalioides*, 16
40. *Baccharis juncea*, 16
41. *Baccharis medullosa*, 16
42. *Baccharis melanopotamica*, 16
43. *Baccharis microcephala*, 18
44. *Baccharis notosergila*, 18
45. *Baccharis penningtonii*, 18
46. *Baccharis phyteuma*, 18
47. *Baccharis phyteumoides*, 18
48. *Baccharis pingraea*, 18
49. *Baccharis pingraea f. angustissima*, 20
50. *Baccharis punctulata*, 20
51. *Baccharis rufescens*, 20
52. *Baccharis rufescens var. ventanicola*, 20
53. *Baccharis salicifolia*, 20
54. *Baccharis spartioides*, 20
55. *Baccharis spicata*, 22
56. *Baccharis stenophylla*, 22
57. *Baccharis tandilensis*, 22
58. *Baccharis tenella*, 22
59. *Baccharis triangularis*, 22
60. *Baccharis tridentata*, 22
61. *Baccharis trimera*, 24
62. *Baccharis ulicina*, 24
63. *Berroa gnaphalioides*, 24
64. *Bidens aurea*, 24
65. *Bidens laevis*, 24
66. *Bidens pilosa*, 24
67. *Bidens pilosa var. minor*, 26
68. *Bidens subalternans*, 26
69. *Bidens subalternans var. simulans*, 26
70. *Brachyclados lycioides*, 26
71. *Brachyclados megalanthus*, 26
72. *Calendula arvensis*, 26
73. *Calendula officinalis*, 28
74. *Calyptocarpus biaristatus*, 28
75. *Carduus acanthoides*, 28
76. *Carduus pycnocephalus*, 28
77. *Carduus tenuiflorus*, 28
78. *Carduus thoermeri*, 28
79. *Carthamus lanatus*, 30
80. *Centaurea calcitrapa*, 30
81. *Centaurea cyanus*, 30
82. *Centaurea diffusa*, 30
83. *Centaurea iberica*, 30
84. *Centaurea jacea*, 30
85. *Centaurea melitensis*, 32
86. *Centaurea nigrescens*, 32
87. *Centaurea solstitialis*, 32
88. *Centaurea tweediei*, 32
89. *Chamaemelum mixtum*, 32
90. *Chaptalia arechavaletae*, 32
91. *Chaptalia exscapa*, 34
92. *Chaptalia ignota*, 34
93. *Chaptalia integerrima*, 34
94. *Chaptalia nutans*, 34
95. *Chaptalia piloselloides*, 34
96. *Chaptalia runcinata*, 34
97. *Chaptalia sinuata*, 36
98. *Chevreulia acuminata*, 36
99. *Chevreulia sarmentosa*, 36
100. *Chondrilla juncea*, 36
101. *Chuquiraga erinacea*, 36
102. *Cichorium intybus*, 36
103. *Cirsium vulgare*, 38
104. *Coleostephus myconis*, 38
105. *Conyza albida*, 38
106. *Conyza blakei*, 38
107. *Conyza bonariensis*, 38
108. *Conyza bonariensis var. angustifolia*, 38
109. *Conyza floribunda*, 40
110. *Conyza laevigata*, 40
111. *Conyza lorentzii*, 40
112. *Conyza monorchis*, 40
113. *Conyza pampeana*, 40
114. *Conyza primulifolia*, 40
115. *Conyza serrana*, 42
116. *Cosmos sulphureus*, 42
117. *Cotula australis*, 42
118. *Cotula coronopifolia*, 42
119. *Crepis capillaris*, 42
120. *Crepis setosa*, 42
121. *Criscia stricta*, 44
122. *Cyclolepis genistoides*, 44
123. *Cynara cardunculus*, 44
124. *Eclipta elliptica*, 44
125. *Eclipta megapotamica*, 44
126. *Eclipta prostrata*, 44
127. *Enhydra anagallis*, 46
128. *Erechthites hieracifolia* var. *cacalioides*, 46
129. *Eupatorium artemisiifolium*, 46
130. *Eupatorium betonicaeforme*, 46
131. *Eupatorium buniifolium*, 46
132. *Eupatorium buniifolium var. saucechicoënse*, 46
133. *Eupatorium bupleurifolium*, 48
134. *Eupatorium cabrerae*, 48
135. *Eupatorium candolleanum*, 48
136. *Eupatorium commersonii*, 48
137. *Eupatorium hecatanthum*, 48
138. *Eupatorium inulifolium*, 48
139. *Eupatorium ivifolium*, 50
140. *Eupatorium laevigatum*, 50
141. *Eupatorium lanigerum* var. *crassipes*, 50
142. *Eupatorium macrocephalum*, 50
143. *Eupatorium patens*, 50
144. *Eupatorium squarrulosum*, 50
145. *Eupatorium subhastatum*, 52
146. *Eupatorium tanacetifolium*, 52
147. *Eupatorium tremulum*, 52
148. *Eupatorium tweedianum*, 52

149. *Facelis retusa*, 52
150. *Facelis retusa ssp. patula*, 52
151. *Flaveria bidentis*, 54
152. *Flaveria haumanii*, 54
153. *Gaillardia aristata*, 54
154. *Gaillardia megapotamica*, 54
155. *Gaillardia megapotamica* var. *radiata*, 54
156. *Gaillardia megapotamica* var. *scabiosoidea*, 54
157. *Galinsoga parviflora*, 56
158. *Gamochaeta americana*, 56
159. *Gamochaeta argentina*, 56
160. *Gamochaeta calviceps*, 56
161. *Gamochaeta coarctata*, 56
162. *Gamochaeta falcata*, 56
163. *Gamochaeta filaginea*, 58
164. *Gamochaeta pensylvanica*, 58
165. *Gamochaeta platensis*, 58
166. *Gamochaeta simplicicaulis*, 58
167. *Gamochaeta stachydifolia*, 58
168. *Gamochaeta subfalcata*, 58
169. *Gnaphalium cabrerae*, 60
170. *Gnaphalium cheiranthifolium*, 60
171. *Gnaphalium gaudichaudianum*, 60
172. *Gnaphalium leucopeplum*, 60
173. *Gnaphalium montevidense*, 60
174. *Grindelia aegialitis*, 60
175. *Grindelia brachystepahana*, 62
176. *Grindelia buphthalmoides*, 62
177. *Grindelia chiloensis*, 62
178. *Grindelia pulchella*, 62
179. *Grindelia pulchella* var. *discoidea*, 62
180. *Grindelia scorzonerifolia*, 62
181. *Grindelia ventanensis*, 64
182. *Gutierrezia gilliesii*, 64
183. *Gymnocoronis spilanthoides*, 64
184. *Gymnocoronis spilanthoides*, var. *subcordata*, 64
185. *Hedypnois cretica*, 64
186. *Helenium radiatum*, 64
187. *Helianthus annuus*, 66
188. *Helianthus laetiflorus*, 66
189. *Helianthus petiolaris*, 66
190. *Helianthus tuberosus*, 66
191. *Hieracium burkartii*, 66
192. *Hieracium chacoense*, 66
193. *Hieracium palezieuxii*, 68
194. *Hieracium tandilense*, 68
195. *Holocheilus brasiliensis*, 68
196. *Holocheilus hieracioides*, 68
197. *Hyalis argentea* var. *latisquama*, 68
198. *Hymenoxys anthemoides*, 68
199. *Hymenoxys cabrerae*, 70
200. *Hymenoxys tweediei*, 70
201. *Hypochaeris chillensis*, 70
202. *Hypochaeris chondrilloides*, 70
203. *Hypochaeris glabra*, 70
204. *Hypochaeris grisebachii*, 70
205. *Hypochaeris megapotamica*, 72
206. *Hypochaeris microcephala*, 72
207. *Hypochaeris microcephala* var. *albiflora*, 72
208. *Hypochaeris pampasica*, 72
209. *Hypochaeris petiolaris*, 72
210. *Hypochaeris radicata*, 72
211. *Hypochaeris rosengurttii* var. *pinnatifida*, 74
212. *Hypochaeris variegata*, 74
213. *Hysterionica jasionoides*, 74
214. *Hysterionica pinifolia*, 74
215. *Jaegeria hirta*, 74
216. *Jaumea linearifolia*, 74
217. *Lactuca saligna*, 76
218. *Lactuca serriola*, 76
219. *Lapsana communis*, 76
220. *Leontodon taraxacoides*, 76
221. *Leucanthemum vulgare*, 76
222. *Lucilia acutifolia*, 76
223. *Matricaria matricarioides*, 78
224. *Matricaria recutita*, 78
225. *Microgynella trifurcata*, 78
226. *Micropsis australis*, 78
227. *Micropsis dasycarpa*, 78
228. *Micropsis ostenii*, 78
229. *Micropsis spathulata*, 80
230. *Mikania cordifolia*, 80
231. *Mikania cynanchifolia*, 80
232. *Mikania dusenii*, 80
233. *Mikania micrantha*, 80
234. *Mikania parodii*, 80
235. *Mikania periplocifolia*, 82
236. *Mutisia coccinea* var. *dealbata*, 82
237. *Noticastrum acuminatum*, 82
238. *Noticastrum argentinense*, 82
239. *Noticastrum chebataroffii*, 82
240. *Noticastrum diffusum*, 82
241. *Noticastrum gnaphalioides*, 84
242. *Noticastrum marginatum*, 84
243. *Noticastrum sericeum*, 84
244. *Onopordum acanthium*, 84
245. *Panphalea bupleurifolia*, 84
246. *Panphalea heterophylla*, 84
247. *Parthenium hysterophorus*, 86
248. *Perezia multiflora* ssp. *sonchifolia*, 86
249. *Perezia recurvata*, 86
250. *Picris echioides*, 86
251. *Picrosia longifolia*, 86
252. *Plagiocheilus tanacetoides*, 86
253. *Pluchea sagittalis*, 88
254. *Podocoma hieracifolia*, 88
255. *Podocoma hirsuta*, 88
256. *Podocoma rivularis*, 88
257. *Porophyllum obscurum*, 88
258. *Pterocaulon balansae*, 88
259. *Pterocaulon cordobense*, 90
260. *Pterocaulon lorentzii*, 90
261. *Pterocaulon virgatum*, 90
262. *Schkuhria pinnata*, 90
263. *Schkuhria pinnata* var. *abrotanoides*, 90
264. *Schkuhria pinnata* var. *octoaristata*, 90
265. *Schlechtendalia luzulaefolia*, 92
266. *Scolymus hispanicus*, 92
267. *Senecio arechavaletae*, 92
268. *Senecio bergii*, 92
269. *Senecio bonariensis*, 92
270. *Senecio brasiliensis* var. *tripartitus*, 92
271. *Senecio bravensis*, 94
272. *Senecio ceratophylloides*, 94
273. *Senecio crassiflorus*, 94
274. *Senecio filaginoides*, 94
275. *Senecio goldsackii*, 94
276. *Senecio grisebachii*, 94
277. *Senecio grisebachii* var. *anomalus*, 96
278. *Senecio grisebachii* var. *leptotus*, 96
279. *Senecio grisebachii* var. *schyzotus*, 96
280. *Senecio grisebachii* var. *subincanus*, 96
281. *Senecio heterotrichus*, 96
282. *Senecio leucopeplus*, 96
283. *Senecio leucostachys*, 98
284. *Senecio madagascariensis*, 98
285. *Senecio melanopotamicus*, 98
286. *Senecio mikanioides*, 98
287. *Senecio montevidensis*, 98
288. *Senecio ostenii*, 98
289. *Senecio pampeanus*, 100
290. *Senecio pinnatus*, 100
291. *Senecio pinnatus* var. *simplicifolius*, 100
292. *Senecio pulcher*, 100
293. *Senecio quequensis*, 100
294. *Senecio selloi*, 100
295. *Senecio subulatus*, 102
296. *Senecio subulatus* var. *erectus*, 102
297. *Senecio tandilensis*, 102
298. *Senecio tweediei*, 102
299. *Senecio ventanensis*, 102
300. *Senecio viravira*, 102
301. *Senecio vulgaris*, 104
302. *Silybum marianum*, 104
303. *Smallanthus connatus*, 104
304. *Solidago chilensis*, 104
305. *Soliva anthemifolia*, 104
306. *Soliva macrocephala*, 104
307. *Soliva sessilis* var. *barclayana*, 106
308. *Soliva stolonifera*, 106
309. *Sommerfeltia spinulosa*, 106
310. *Sonchus asper*, 106
311. *Sonchus oleraceus*, 106
312. *Sonchus tenerrimus*, 106
313. *Stevia aristata*, 108
314. *Stevia multiaristata*, 108
315. *Stevia satureiifolia*, 108
316. *Stevia satureiifolia* var. *patagonica*, 108
317. *Stevia satureiifolia* var. *ventanensis*, 108
318. *Stuckertiella peregrina*, 108
319. *Tagetes minuta*, 110
320. *Tanacetum balsamita*, 110
321. *Tanacetum parthenium*, 110
322. *Tanacetum vulgare*, 110
323. *Taraxacum laevigatum*, 110
324. *Taraxacum officinale*, 110
325. *Tessaria absinthioides*, 112
326. *Tessaria integrifolia*, 112
327. *Tessaria integrifolia* var. *ambigua*, 112
328. *Thelesperma megapotamicum*, 112
329. *Thymophylla pentachaeta* var. *belenidium*, 112
330. *Tragopogon dubius*, 112
331. *Tragopogon porrifolius*, 114
332. *Tragopogon pratensis*, 114
333. *Trichocline reptans*, 114
334. *Trichocline sinuata*, 114
335. *Trixis nobilis*, 114
336. *Trixis praestans*, 114
337. *Urospermun picroides*, 116
338. *Verbesina encelioides*, 116
339. *Verbesina subcordata*, 116
340. *Vernonia echioides*, 116
341. *Vernonia flexuosa*, 116
342. *Vernonia incana*, 116
343. *Vernonia mollissima*, 118
344. *Vernonia nitidula*, 118
345. *Vernonia platensis*, 118
346. *Vernonia pseudoincana*, 118
347. *Vernonia rubricaulis*, 118
348. *Vernonia scorpioides* var. *sororia*, 118
349. *Viguiera anchusaefolia*, 120
350. *Viguiera anchusaefolia* var. *inmarginata*, 120
351. *Wedelia glauca*, 120
352. *Xanthium ambrosioides*, 120
353. *Xanthium cavanillesii*, 120
354. *Xanthium saccharatum*, 120
355. *Xanthium spinosum*, 122
356. *Zexmenia buphtalmiflora*, 122
357. *Crepis foetida*, 122
358. *Crepis vesicaria*, 122
359. *Grindelia cabrerae*, 122
360. *Grindelia patagonica*, 122
361. *Scorzonera laecinita*, 124

LISTADO DE SINÓNIMOS

Acanthospermum brasilianum (1)
Acanthospermum hirsutum (1)
Acanthospermum xanthioides (1)
Acanthostyles buniifolius (131)
Acanthostyles saucechicoënse (132)
Acanthoxanthium spinosum (355)
Acmella hirta (215)
Achillea lanulosa (3)
Achillea sudetica (3)
Achyrocline alata var. *vautheriana* (4)
Achyrocline argentina (4)
Achyrocline flavescens (4)
Achyrocline pterocaula (4)
Achyrocline vargasiana (5)
Achyrocline vautheriana (4)
Achyrophorus brasiliensis (201)
Achyrophorus chilensis (201)
Achyrophorus chillensis (201)
Achyrophorus chondrilloides (202)
Achyrophorus deserticola (202)
Achyrophorus glaucus (202)
Achyrophorus microcephalus (206)
Achyrophorus petiolaris (209)
Achyrophorus sagittatus (201)
Achyrophorus variegatus (212)
Actinea alternifolia (186)
Actinea anthemoides (198)
Actinea haenkeana (198)
Actinea heterophylla (186)
Actinea heterophylla f. bicolor (186)
Actinea heterophylla var. *dentata* (186)
Actinea heterophylla var. *latifolia* (154)
Actinea radiata (186)
Actinea tweediei (200)
Actinella anthemidoides (198)
Actinella heterophylla (186)
Actinella tweediei (200)
Adenostemma triangularis (11)
Adenostemma viscosum (11)
Adesnotemma viscosum var. *brasilianum* (11)
Adenostemma viscosum var. *triangulare* (11)
Adventina parviflora (157)
Ageratum hirtum (12)
Ageratum hirsutum (12)
Alomia spilanthoides (183)
Amblyopappus mendocinus (262)
Ambrosia artemiaefolia (13)
Ambrosia chilensis (13)
Ambrosia peruviana (13)
Anacyclus australis (117)
Anthemis mixta (89)
Apargia chillensis (201)
Apargia variegata (212)
Arctotis calendula (18)
Arctotis calendulacea (18)
Argyrochaeta bipinnatifida (247)
Arrhenachne juncea (40)
Artemisia matricarioides (223)
Aster acaulis (242)
Aster albus (243)
Aster argentinensis (238)
Aster calendulaceus (237)
Aster chebataroffii (239)
Aster decumbens (239)
Aster divaricatus (24)
Aster divaricatus var. *graminifolius* (25)
Aster exilis var. *australis* (24)
Aster gnaphalioides (241)
Aster haplopappus (243)
Aster linifolius (24)
Aster marginatus (242)
Aster marginatus var. *tomentosus* (243)
Aster moelleri (24)
Aster montevidensis (240)
Aster nitens (243)
Aster notosericeus (243)
Aster perezii (242)
Aster sericeus (243)
Aster subtropicus (24)
Austrobrickellia patens (143)
Austroeupatorium entreriense (138)
Austroeupatorium inulifolium (138)
Austroeupatorium tweedianum (148)
Baccharidastrum rivulare (256)
Baccharis absinthioides (325)
Baccharis affinis (60)
Baccharis alamanii (53)
Baccharis amygdalina (50)
Baccharis angulata (35)
Baccharis angulata var. *andina* (35)
Baccharis angustifolia (48)
Baccharis asteroides (24)
Baccharis attenuata (55)
Baccharis baldwinii (51)
Baccharis breviseta (26)
Baccharis caerulescens (53)
Baccharis curtifolia (44)
Baccharis cylindrica (34)
Baccharis denticulata (51)
Baccharis dusenii (42)
Baccharis farinosa (53)
Baccharis fluminensis (51)
Baccharis genistelloides var. *crispa* (34)
Baccharis genistelloides var. *cylindrica* (34)
Baccharis genistelloides var. *trimera* (61)
Baccharis genistifolia var. *β* (44)
Baccharis glutinosa (53)
Baccharis grisea (31)
Baccharis grossedentata (35)
Baccharis icma (38)
Baccharis involucrata (38)
Baccharis iresinoides (53)
Baccharis lanceolata (53)
Baccharis linifolia (53)
Baccharis longipes (53)
Baccharis marginalis (53)
Baccharis marginalis var. *longipes* (53)
Baccharis medullosa var. *latifolia* (41)
Baccharis melastomifolia (50)
Baccharis microptera (43)
Baccharis montevidensis (344)
Baccharis nana (38)
Baccharis oxyodonta var. *punctulata* (50)
Baccharis parviflora (53)
Baccharis paucidentata (51)
Baccharis paucidentata var. *β* (38)
Baccharis perplexa (34)
Baccharis pingraea f. latifolia (48)
Baccharis pinnatifida (62)
Baccharis platensis (55)
Baccharis prenanthoides (41)
Baccharis pseudoserrulata (27)
Baccharis purpurascens (53)
Baccharis recurvata (31)
Baccharis rotundifolia var. *stuckertii* (32)
Baccharis rufescens var. *subrufescens* (51)
Baccharis sarophora (54)
Baccharis serrulata (27)
Baccharis serrulata (41)
Baccharis serrulata var. *pingraea* (48)
Baccharis sessiliflora var. *stuckertii* (32)
Baccharis strobeliana (62)
Baccharis subopposita (60)
Baccharis subopposita var. *affinis* (60)
Baccharis subpingraea (48)
Baccharis subpingraea f. crassifolia (49)
Baccharis subpingraea f. nana (56)
Baccharis subpingraea f. pseudoulicina (56)
Baccharis subrufescens (51)
Baccharis subulata (40)
Baccharis trimera var. *viscosissima* (59)
Baccharis tweediei (60)
Baccharis ulicina var. *multifida* (62)
Baccharis ulicina var. *subintegrifolia* (35)
Baccharis viscosa (53)
Baccharis viscosa var. *nigricans* (53)
Baccharis vulneraria (27)
Balsamita major (320)
Barkhausia setosa (120)
Barrosoa betonicaeformis (130)
Barrosoa cabrerae (134)
Barrosoa candolleana (135)
Baucis lavandulifolia (70)
Bichenia reptans (333)
Bichenia sinuata (334)
Bidens californica (66)
Bidens chrysanthemoides (65)
Bidens helianthoides (65)
Bidens hirsuta (66)
Bidens hispida (67)
Bidens leucantha f. discoidea (66)
Bidens leucantha var. *pilosa* (66)
Bidens leucantha var. *sundaica* (67)
Bidens leyboldii (328)
Bidens megapotamica (328)
Bidens montaubanii (66)
Bidens paradoxa (328)
Bidens pilosa var. *brevifoliata* (67)
Bidens pilosa var. *discoidea* (66)
Bidens pilosa var. *dubia* (67)
Bidens platensis (68)
Bidens quadrangularis (68)
Bidens reflexa (66)
Bidens sundaica (67)
Bidens sundaica var. *minor* (67)
Blainvillea biaristata (74)
Brachyclados involutus (70)
Brachyclados lycioides var. *macrocephala* (71)
Brachyclados lycioides var. *microcephala* (70)
Brachyclados macrocephalus (70)
Cacalia cordifolia (230)
Cacalia flexuosa (341)
Cacalia incana (342)
Cacalia intermedia (347)
Cacalia mollissima (343)
Cacalia platensis (345)
Cacalia praestans (336)
Cacalia rubricaulis (347)
Cacalia rubricaulis var. *pseudoincana* (346)
Cacalia scabra (195)
Cacalia scorpioides var. *sororia* (348)
Campovassouria bupleurifolia (133)
Campovassouria cruciata (133)
Campuloclinium macrocephalum (142)
Carduus lanceolatus (103)
Carduus leiophyllus (78)
Carduus macrocephalus (76)
Carduus macrolepis (78)
Carduus marianus (302)
Carduus nutans ssp. macrolepis (78)
Carduus nutans var. *macrocephalus* (78)
Carduus pycnocephalus var. *tenuiflorus* (77)
Carduus vulgaris (103)

Carelia conyzoides (12)
Castra nobilis (335)
Castra praestans (336)
Centaurea dubia ssp. vochinensis (86)
Centaurea parviflora (82)
Centaurea picris (10)
Centaurea repens (10)
Centaurea rotundifolia (86)
Centaurea vochinensis (86)
Centrospermum xanthioides (1)
Cephalophora heterophylla (186)
Cephalophora radiata (186)
Ceratocephalus arnicoides (6)
Ceratocephalus decumbens (7)
Ceratocephalus decumbens var. *macropoda* (7)
Cercostylos brasiliensis (154)
Cercostylos scabiosoides (156)
Chaetanthera recurvata (249)
Chamomilla recutita (224)
Chamomilla suaveolens (223)
Chaptalia ebracteata (94)
Chaptalia exscapa var. *typica* (91)
Chaptalia integrifolia (93)
Chaptalia majuscula (94)
Chaptalia microdonta (93)
Chaptalia nutans (94)
Chaptalia piloselloides ssp. bracteata (95)
Chaptalia subcordata (94)
Chevreulia filiformis (98)
Chevreulia longipes (98)
Chevreulia stolonifera (99)
Chevreulia thouarsii (99)
Chlaenobolus virgatus (261)
Chromolaena ascendens (144)
Chromolaena congesta (144)
Chromolaena ivifolia (139)
Chromolaena laevigata (140)
Chromolaena pratensis (142)
Chromolaena squarrulosa (144)
Chrysanthemum balsamita (320)
Chrysanthemum leucanthemum (221)
Chrysanthemum myconis (104)
Chrysanthemum parthenium (321)
Chrysanthemum vulgare (322)
Chrysocoma cruciata (133)
Chrysolaena flexuosa (341)
Chrysolaena platensis (345)
Chrysopsis andicola (213)
Chuquiraga erinacea subsp. mollior (101)
Chuquiraga erinacea var. *unguis-cati* (101)
Chuquiraga juniperina (101)
Chuquiraga unguis-cati (101)
Cineraria crassiflora (273)
Cineraria megapotamica (290)
Cineraria montevidensis (287)
Cineraria selloi (294)
Cineraria vestita (273)
Cirsium lanceolatum (103)
Cirsium vulgare (103)
Clarionia recurvata (249)
Cleanthes brasiliensis (195)
Cleanthes hieracioides (196)
Cleanthes hieracioides var. *thrincioides* (196)
Cleanthes ochroleuca (195)
Cleanthes othonoides (195)
Conoclinium betonicaeforme (130)
Conoclinium macrocephalum var. *strigosum* (142)
Conyza apurensis (110)
Conyza arguta (26)
Conyza articulata (30)
Conyza berteroana (24)
Conyza bilbaoana (109)
Conyza bonariensis f. subleiotheca (105)
Conyza bonariensis var. *leiotheca* (109)
Conyza bonariensis var. *microcephala* (105)
Conyza chilensis (114)
Conyza elata (109)
Conyza erigeroides (105)
Conyza floribunda var. *subleiotheca* (105)
Conyza graminifolia (25)
Conyza hispida (107)
Conyza linearis (107)
Conyza montevidensis (48)
Conyza myosotifolia (114)
Conyza myriocephala (109)
Conyza platensis (345)
Conyza plebeja (107)
Conyza rivularis (256)
Conyza sagittalis (253)
Conyza scabiosaefolia (114)
Conyza spinulosa (309)
Conyza squamata (24)
Conyza subspathulata (110)
Conyza sumatrensis var. *floribunda* (109)
Conyza triplinervia (27)
Conyza virgata (261)
Conyza yungasensis (114)
Conyzanthus squamatus (24)
Coreopsis aurea (64)
Cotula montevidensis (118)
Crepis nudicaulis (220)
Crepis virens (119)
Cryptostemma calendula (18)
Cryptostemma calendulaceum (18)
Diplopappus diffusus (240)
Diplopappus hispidus (213)
Diplopappus pinifolius (214)
Diplopappus sericeus (243)
Dyssodia belenidium (329)
Dyssodia cupulata (329)
Dyssodia gracilis (329)
Dyssodia pentachaeta var. *belenidium* (329)
Dyssodia thurberi (329)
Eclipta alba (126)
Eclipta bellidioides (124)
Eclipta bellidioides (215)
Eclipta erecta (126)
Eclipta lanceolata (125)
Echetrosis pentaspermum (247)
Epaltes brasiliensis (253)
Erechthites agrestis (128)
Erechthites cacalioides (128)
Erechthites carduifolia (128)
Erechthites carduifolia var. *latifolia* (128)
Erechthites hieracifolia (128)
Erechthites hieracifolia var. *cacalioides f. pubescens* (128)
Erechthites hieracifolia var. *carduifolia* (128)
Erechthites sulcata (128)
Erigeron albidum (105)
Erigeron albidus (105)
Erigeron apurensis (110)
Erigeron bilbaoanus (109)
Erigeron blakei (106)
Erigeron bonariensis (107)
Erigeron bonariensis f. glabrata (109)
Erigeron bonariensis var. *angustifolius* (108)
Erigeron bonariensis var. *floribundum* (109)
Erigeron bonariensis var. *leiothecus* (109)
Erigeron bonariensis var. *microcephalus* (105)
Erigeron chilensis (114)
Erigeron depilis (24)
Erigeron diffusus (240)
Erigeron floribundus (109)
Erigeron gardneri (256)
Erigeron hieracifolium (254)
Erigeron laevigatus (110)
Erigeron lorentzii (111)
Erigeron mendocinus (213)
Erigeron monorchis (112)
Erigeron pampeanus (113)
Erigeron pinifolius (214)
Erigeron platensis (115)
Erigeron semiamplexicaule (24)
Erigeron spathulatus (110)
Erigeron tridactylum (225)
Ethulia bidentis (151)
Eupatorium affine (139)
Eupatorium arechavaletae (340)
Eupatorium ascendens (144)
Eupatorium ascendens var. *paucisetosum* (144)
Eupatorium asclepiadeum (133)
Eupatorium bacleanum (136)
Eupatorium bartsiifolium (145)
Eupatorium buniifolium var. *bakerii* (131)
Eupatorium buniifolium var. *hieronymi* (131)
Eupatorium bupleurifolium var. *asclepiadeum* (133)
Eupatorium bupleurifolium var. *ensifolium* (133)
Eupatorium bupleurifolium var. *linifolium* (133)
Eupatorium caaguazuense var. *nervosum* (144)
Eupatorium candolleanum var. *lancifolium* (135)
Eupatorium candolleanum var. *paranensis* (135)
Eupatorium commersonii var. *dentata* (136)
Eupatorium commersonii var. *pinnata* (136)
Eupatorium congestum (144)
Eupatorium conyzoides var. *affine* (139)
Eupatorium crassipes (141)
Eupatorium crenulatum var. *xylophylloides* (147)
Eupatorium crithmifolium (131)
Eupatorium cruciatum (133)
Eupatorium chilense (151)
Eupatorium dendroides var. *xylophylloides* (147)
Eupatorium denudatum (142)
Eupatorium donianum (142)
Eupatorium ensifolium (133)
Eupatorium entreriense (138)
Eupatorium erigeroides (148)
Eupatorium erodiifolium (146)
Eupatorium erodiifolium var. *obtusilobum* (146)
Eupatorium graminifolium (133)
Eupatorium hexanthum (145)
Eupatorium hirsutum var. ((145)
Eupatorium hirsutum var. *triseriale* (145)
Eupatorium hunzigeri (141)
Eupatorium inulifolium var. *suaveolens* (138)
Eupatorium ivifolium var. *genuinum* (139)
Eupatorium ivifolium var. *hirsutum* (139)
Eupatorium ivifolium var. *perturbinatum* (139)
Eupatorium ivifolium var. *pilcomayense* (139)
Eupatorium laevigatum var. *longepetiolatum* (140)
Eupatorium laevigatum var. *psidiifolia* (140)
Eupatorium lanigerum var. *minor* (141)
Eupatorium liatridium (144)
Eupatorium linifolium (133)
Eupatorium luquense (139)
Eupatorium macrocephalum var. *angustifolium* (142)
Eupatorium macrocephalum var. *stigmatosum* (142)
Eupatorium macrocephalum var. *strigosum* (142)
Eupatorium molle (138)
Eupatorium montevidense (33)
Eupatorium palustre var. *guaraniticum* (135)
Eupatorium palustre var. *verbenaceum* (135)
Eupatorium pallescens (138)
Eupatorium pallescens var. *bonariense* (138)
Eupatorium pallescens var. *hirsuta* (138)
Eupatorium pallidum (138)
Eupatorium paranense (138)
Eupatorium patagonicum (143)
Eupatorium patens (143)
Eupatorium patens var. *gracilior* (143)
Eupatorium pinnatifidum (131)
Eupatorium pinnatifidum var. *virgata* (131)

Eupatorium populifolium (137)
Eupatorium psidiifolium (140)
Eupatorium satureiifolium (315)
Eupatorium saucechicoënse (132)
Eupatorium spicatum (55)
Eupatorium steviifolium var. *erigeroides* (148)
Eupatorium steviifolium var. *viscosum* (148)
Eupatorium stigmatosum (142)
Eupatorium stigmatosum var. *subcalvatum* (142)
Eupatorium stigmatosum var. *violaceum* (142)
Eupatorium suaveolens (138)
Eupatorium subhastatum var. *hexanthum* (145)
Eupatorium subhastatum var. *hirsutum* (145)
Eupatorium subhastatum var. *triseriale* (145)
Eupatorium tozziifolium (144)
Eupatorium trichophorus (145)
Eupatorium vattuonei (143)
Eupatorium virgatum (131)
Eupatorium xerolepis (143)
Eupatorium xylophylloides (147)
Evax spathulata (229)
Facelis apiculata (149)
Filago dasycarpa (227)
Flaveria bidentis var. *angustifolia* (152)
Flaveria bonariensis (151)
Flaveria capitata (151)
Flaveria chiloensis (151)
Flaveria contrayerba (151)
Gaillardia doniana var. *discoidea* (154)
Gaillardia scabiosoidea (156)
Gaillardia scabiosoidea var. *radiata* (155)
Galinsoga oblonga (126)
Galinsoga quinqueradiata (157)
Gamochaeta americana var. *alpina* (158)
Gamochaeta guatemalensis (158)
Gamochaeta spicata (161)
Gamochaeta stagnalis (162)
Gerbera bracteata (95)
Gerbera brevipes (91)
Gerbera incana var. *intermedia* (333)
Gerbera incana var. *reptans* (333)
Gerbera incana var. *reptans f. aurantiaca* (333)
Gerbera incana var. *reptans f. pallida* (333)
Gerbera nutans (94)
Gnaphalium acutifolium (170)
Gnaphalium alatum (4)
Gnaphalium americanum (158)
Gnaphalium araucanum (170)
Gnaphalium bracteatum (229)
Gnaphalium calviceps (160)
Gnaphalium calycinum (99)
Gnaphalium citrinum (170)
Gnaphalium coarctatum (161)
Gnaphalium commersonii (222)
Gnaphalium consanguineum (158)
Gnaphalium falcatum (162)
Gnaphalium fastigiatum (169)
Gnaphalium filagineum (163)
Gnaphalium gnaphalioides (63)
Gnaphalium guatemalense (158)
Gnaphalium heteroides (162)
Gnaphalium involucratum (229)
Gnaphalium jamesonii (222)
Gnaphalium mendocinum (171)
Gnaphalium paniculatum (170)
Gnaphalium pensylvanicum (164)
Gnaphalium peregrinum (164)
Gnaphalium philippi (169)
Gnaphalium platense (165)
Gnaphalium purpureum var. *americanum* (158)
Gnaphalium purpureum var. *falcatum* (162)
Gnaphalium purpureum var. *simplicicaule* (166)
Gnaphalium purpureum var. *spathulatum* (164)
Gnaphalium purpureum var. *spicatum* (161)
Gnaphalium purpureum var. *stachydifolium* (167)
Gnaphalium retusum (149)
Gnaphalium satureioides (5)
Gnaphalium simplicicaule (166)
Gnaphalium spathulatum (164)
Gnaphalium spicatum (161)
Gnaphalium stachydifolium (167)
Gnaphalium stachydifolium var. *falcatum* (162)
Gnaphalium stagnale (162)
Gnaphalium suaveolens (253)
Gnaphalium subfalcatum (158)
Gnaphalium subnudum (173)
Gnaphalium valdivianum (170)
Gnaphalium virescens (222)
Gnaphalium virgatum (261)
Gochnatia genistoides (122)
Grindelia anomala (179)
Grindelia bergii (175)
Grindelia brachystephana var. *bergii* (175)
Grindelia diffusa (175)
Grindelia diffusa (178)
Grindelia discoidea (179)
Grindelia foliosa (177)
Grindelia pectinata (180)
Grindelia pulchella var. *discoidea* (179)
Grindelia pulchella var. *normalis* (178)
Grindelia pulchella var. *serratifolia* (178)
Grindelia pulchella var. *sublinearis* (178)
Grindelia resinosa (177)
Grindelia scorzonerifolia var. *pectinata* (180)
Grindelia scorzonerifolia var. *subintegra* (180)
Grindelia speciosa (177)
Grindelia speciosa var. *integrifolia* (177)
Grindelia tehuelches (175)
Grindelia volkensii var. *angustifolia* (177)
Grindelia volkensii var. *latifolia* (177)
Guntheria megapotamica (154)
Gutierrezia leucantha (182)
Gutierrezia mandonii subsp. gilliesii (182)
Gutierrezia spathulata var. *gillesii* (182)
Gymnocoronis attenuata (183)
Gymnocoronis spilanthoides var. *attenuata* (183)
Gymnocoronis subcordata (184)
Gymnolomia connata (303)
Gymnopsis helianthoides (23)
Gymnostyles alata (307)
Gymnostyles anthemifolia (305)
Gymnostyles lusitanica (308)
Gymnostyles nasturtiifolia (308)
Gymnostyles pterosperma (307)
Gymnostyles stolonifera (308)
Gynheteria incana (325)
Gynheteria incana (326)
Gynura aspera (128)
Gynura malasica (128)
Gynura zeylanica var. *malasica* (128)
Gyptis artemisiifolia (129)
Gyptis commersonii (136)
Gyptis pinnatifida (146)
Haplopappus acuminatus (237)
Haplopappus calendulaceus (237)
Haplopappus diffusus (240)
Haplopappus hoorebekia (177)
Haplopappus patagonicus (175)
Haplopappus sericeus (243)
Haplopappus tehuelches (175)
Hatschbachiella tweediana (148)
Hebeclinium hecathantum (137)
Hebeclinium urolepis (137)
Hedypnois cretica (185)
Hedypnois polymorpha (185)
Helenium alternifolium (186)
Helenium heterophyllum (186)
Helenium mattfeldianum (186)
Helianthus aridus (187)
Helianthus australis (177)
Helianthus copiapanus (351)
Helianthus erythrocarpus (187)
Helianthus esculentus (190)
Helianthus indicus (187)
Helianthus integrifolius (189)
Helianthus integrifolius var. *gracilis* (189)
Helianthus laetiflorus var. *tricuspis* (188)
Helianthus laevis (65)
Helianthus lenticularis (187)
Helianthus macrocarpus (187)
Helianthus multiflorus (187)
Helianthus ovatus (187)
Helianthus patens (189)
Helianthus petiolaris var. *patens* (189)
Helianthus platycephalus (187)
Helianthus praecox (189)
Helianthus scaberrimus (188)
Helianthus serotinus (190)
Helianthus tricuspis (188)
Helianthus tubaeformis (187)
Helichrysum montevidense (222)
Helichrysum retusum (149)
Helminthia echioides (250)
Helminthotheca echioides (250)
Heterochaeta hispida (213)
Heterothalamus spartioides (54)
Heterothalamus tenellus (58)
Hieracium paraguayense subsp. ventanicum var. *chacoense* (192)
Hieracium variegatum (212)
Hippia stolonifera (308)
Holocheilus ochroleucus (195)
Homoianthus donianus (249)
Homoianthus echinulatus (249)
Homoianthus inermis (249)
Homoianthus patagonicus (249)
Homoianthus pectinatus (249)
Homoianthus triceps (249)
Hoorebekia chiloensis (177)
Hymenatherum belenidium (329)
Hymenatherum candolleanum (329)
Hymenatherum thurberi (329)
Hymenopappus anthemoides (198)
Hymenoxys haenkeana (198)
Hymenoxys parodii (198)
Hyoseris cretica (185)
Hyoseris taraxacoides (220)
Hypochaeris brasiliensis (201)
Hypochaeris brasiliensis var. *albiflora* (207)
Hypochaeris brasiliensis var. *microcephala* (206)
Hypochaeris brasiliensis var. *tweediei* (201)
Hypochaeris glauca (202)
Hypochaeris glauca f. halofila (202)
Hypochaeris halophila (202)
Hypochaeris tweediei (201)
Hypochaeris variegata var. *acutibracteata* (211)
Hypochaeris variegata var. *glaucescens* (212)
Hypochaeris variegata var. *nana* (212)
Hypochaeris variegata var. *pinnatifida* (211)
Hysterionica intermedia (213)
Icma involucrata (38)
Inulae primulaefolia (114)
Jaegeria bellidioides (215)
Jaegeria discoidea (215)
Jaegeria hirta var. *glabra* (215)
Jaegeria mniodes (215)
Jaegeria parviflora (215)
Jaegeria repens (215)
Jaumea linearis (216)
Kentrophyllum lanatum (79)
Kleinia linearifolia (216)
Kleinia linifolia (257)
Kleinia obscura (257)
Kremeria myconis (104)
Lactuca scariola (218)

Lancisia australis (117)
Lancisia coronopifolia (118)
Lappa glabra (17)
Lappa minor (17)
Lapsana capillaris (119)
Leighia anchusaefolia (349)
Leighia baldwiniana (349)
Leighia dissitifolia (349)
Leighia ecliptifolia (351)
Leighia inmarginata (349)
Leighia lomatoneura (349)
Leighia silphioides (23)
Leighia stenophylla (350)
Leontodon chilense (201)
Leontodon laevigatus (323)
Leontodon nudicaulis (220)
Leontodon taraxacum (324)
Leontodon variegatum (212)
Leontodon vulgare (324)
Leptalea apiculata (149)
Leria cespitosa (99)
Leria exscapa (91)
Leria integrifolia (93)
Leria lutescens (93)
Leria lyrata (94)
Leria nutans (94)
Leria nutans var. *integrifolia* (93)
Leria nutans var. *sinuata* (97)
Leria sinuata (97)
Lessingianthus mollissimus (343)
Lessingianthus rubricaulis (347)
Leucanthemum balsamita (320)
Leucanthemum myconis (104)
Leucanthemum parthenium (321)
Leuceria conyzoides (196)
Leuceria echioides (195)
Leuceria thrincioides (196)
Leucopsis acuminata (237)
Leucopsis calendulacea (237)
Leucopsis diffusa (240)
Leucopsis gnaphalioides (241)
Leucopsis sericea (243)
Lieberkhuna bracteata (95)
Lorentzia pascalaides (351)
Loxodon brevipes (91)
Loxodon longipes (96)
Lucilia acutifolia f. virescens (222)
Lucilia argentea (63)
Lucilia gnaphalioides (63)
Lucilia jamesonii (222)
Lucilia lundii (222)
Lucilia microphylla (222)
Marsea bonariensis var. *leiotheca* (109)
Matricaria chamomilla (224)
Matricaria discoidea (223)
Matricaria parthenium (321)
Melampodium australe (1)
Microgyne trifurcata (225)
Micropsis bonaerensis (228)
Micropsis herterii (229)
Micropsis involucrata (229)
Mikania araucana (235)
Mikania auricularis (235)
Mikania cordifolia var. *tomentosa* (230)
Mikania glechomaefolia (233)
Mikania humilis (235)
Mikania niederleinii (235)
Mikania orinocensis (233)
Mikania satureiifolia (315)
Mikania scandens f. intermedia (231)
Mikania scandens subsp. cynanchifolia (231)
Mikania scandens subsp. paraguayensis (235)
Mikania scandens var. *cynanchifolia* (231)
Mikania scandens var. *intermedia* (231)
Mikania scandens var. *mollis* (231)
Mikania scandens var. *periplocifolia* (235)
Mikania scandens var. *sagittifolia* (235)
Mikania scandens var. *subcymosa* (233)
Mikania scandens var. *umbellifera* (233)
Mikania subcrenata (233)
Mikania subcymosa (233)
Mikania umbellifera (233)
Milleria contrayerba (151)
Milleria chiloensis (151)
Molina articulata (30)
Molina crispa (34)
Molina cylindrica (34)
Molina microcephala (43)
Molina parviflora (53)
Molina phyteumoides (47)
Molina salicifolia (53)
Molina striata (53)
Molina trimera (61)
Molina viscosa (53)
Mutisia dealbata (236)
Mutisia dealbata var. *guaranitica* (236)
Mutisia hayenbeckii (236)
Mutisia speciosa var. *dealbata* (236)
Mutisia speciosa var. *elliptica* (236)
Neja pinifolia (214)
Neoceis carduifolia (128)
Neomolina darwinii (35)
Neomolina ulicina (62)
Nothites satureiifolia (315)
Noticastrum calendulaceum (237)
Noticastrum marginatum f. acaulis (242)
Noticastrum montevidense (240)
Noticastum album (243)
Noticastum haplopappus (243)
Noticastum phillipii (243)
Oligogyne magapotamica (74)
Oligogyne synedrelloides (74)
Onoseris montevidensis (240)
Onoseris stricta (121)
Orcya adhaerens (1)
Oreophila chondrilloides (202)
Ormenis mixta (89)
Oxydon bicolor (96)
Pachyrhynchus xeranthemoides (222)
Pamphalea tweedii (246)
Parthenium glomeratum (247)
Pascalia glauca (351)
Pectis pinnata (262)
Pectis violacea (314)
Perdicium brasiliense (195)
Perdicium piloselloides (95)
Perdicium recurvatum (249)
Perezia aletes (248)
Perezia beckii (249)
Perezia doniana (249)
Perezia flavescens (249)
Perezia ochroleuca (195)
Perezia pampeana (121)
Perezia patagonica (249)
Perezia patagonica var. *intermedia* (249)
Perezia pectinata (249)
Perezia recurvata subsp. beckii (249)
Perezia recurvata subsp. patagonica (249)
Perezia recurvata subsp. triceps (249)
Perezia reflexa (249)
Perezia sonchifolia (248)
Perezia sonchifolia var. *tandilensis* (248)
Perezia triceps (249)
Pharthenium lobatum (247)
Pharthenium pinnatifidum (247)
Picrosia australis (251)
Picrosia longifolia var. *angustissima* (251)
Pingraea angustifolia (48)
Pingraea articulata (30)
Pingraea crispa (34)
Pingraea punctulata (50)
Pingraea salicifolia (53)
Pingraea viscosa (53)
Piptocarpha nitidula (344)
Platycheilus ochroleucus (195)
Pluchea absinthioides (325)
Pluchea quitoc (253)
Pluchea suaveolens (253)
Podocoma primulaefolia (254)
Podopappus hirsutus (255)
Podopappus pubescens (254)
Polygine inconspicua (126)
Polymnia andrei (303)
Polymnia connata (303)
Polymnia silphioides (303)
Polymnia silphioides var. *perennis* (303)
Polypteris brasiliensis (154)
Porcellites brasilienses (201)
Porophyllum lineare (257)
Prenanthes subdentata (251)
Pseudobaccharis spartioides (54)
Pseudobaccharis tenella (58)
Pseudognaphalium cheiranthifolium (170)
Pseudognaphalium gaudichaudianum (171)
Pseudognaphalium leucopeplum (172)
Pseudognaphalium montevidense (173)
Psila spartioides (54)
Psila tenella (58)
Psilopogon albiflorus (251)
Pterocaulon interruptum (258)
Pterocaulon malmeanum (260)
Pterocaulon paniculatum (258)
Pterocaulon pilcomayense (261)
Pterocaulon polystachyum var. *tomentosa* (258)
Pterocaulon pompilianum (261)
Pterocaulon subspicatum (261)
Pterocaulon subvirgatum (261)
Pterocaulon virgatum f. subpaniculata (258)
Pterocaulon virgatum f. subvirgata (261)
Pterocaulon virgatum var. *angustifolia* (260)
Pterocaulon virgatum var. *spicata* (260)
Pyrethrum balsamita (320)
Pyrethrum balsamitoides (320)
Pyrethrum majus (320)
Pyrethrum parthenium (321)
Pyrethrum vulgare (322)
Ranunculus alatus (307)
Raulinoreitzia tremula (147)
Rothia pinnata (262)
Rothia pinnata var. *pallida* (262)
Rothia pinnata var. *purpurascens* (264)
Rudbeckia bellidioides (6)
Rudbeckia decumbens (7)
Santolina suaveolens (223)
Schkuhria abrotanoides (263)
Schkuhria abrotanoides var. *isopappa* (263)
Schkuhria abrotanoides var. *pomasquiensis* (263)
Schkuhria advena (262)
Schkuhria bonariensis (263)
Schkuhria coquimbana (262)
Schkuhria isopappa (262)
Schkuhria octoaristata (264)
Senecio albicaulis (274)
Senecio albicaulis var. *gilliesii* (274)
Senecio albicaulis var. *glabriusculus* (300)
Senecio albicaulis var. *pinnatifidus* (283)
Senecio albolanatus (274)
Senecio amabilis (270)
Senecio andryaloides (273)
Senecio argentinensis (298)
Senecio argentinus (300)
Senecio burchelli (284)
Senecio cacalioides (128)
Senecio candolleanus (282)
Senecio cannabinifolius (270)

Senecio carduifolius (128)
Senecio caricifolius (274)
Senecio ceratophyllus (272)
Senecio ceratophyllus var. *macrodon* (272)
Senecio ceratophyllus var. *major* (272)
Senecio crassiflorus var. *andryaloides* (273)
Senecio crassiflorus var. *tricuspis* (273)
Senecio cuspidatus (287)
Senecio cuspidatus var. *ceratophylloides* (272)
Senecio cuspidatus var. *ceratophyllus* (272)
Senecio cuspidatus var. *macrodon* (272)
Senecio cuspidatus var. *montevidensis* (287)
Senecio chilensis (287)
Senecio chilensis var. *ceratophyllus* (272)
Senecio chilensis var. *macrodon* (272)
Senecio doeringii (274)
Senecio doroniciflorus (294)
Senecio fischeri (128)
Senecio gilliesianus var. *arachnoidea* (275)
Senecio hieracifolius (128)
Senecio ico glossus var. *araneosus* (292)
Senecio in ognitus (284)
Senecio le iscus (274)
Senecio le oldtii (274)
Senecio m donadensis (281)
Senecio megapotamicus (270)
Senecio mendocinus (296)
Senecio meyeni (274)
Senecio ochroleucus var. *ß* (269)
Senecio pinnatus var. *achalensis* (300)
Senecio pinnatus var. *glandulosus* (299)
Senecio quenselii (274)
Senecio rhodaster (269)
Senecio sagittarioides (269)
Senecio sagittifolius (269)
Senecio scandens (286)
Senecio sericeus (274)
Senecio sericeus var. *gilliesii* (274)
Senecio sericeus var. *glabriusculus* (300)
Senecio sericeus var. *pinnatifidus* (300)
Senecio stipellatus (275)
Senecio subulatus var. *elatior* (295)
Senecio subulatus var. *macranthus* (296)
Senecio subulatus var. *prostratus* (295)
Senecio tripartitus (270)
Seriola brasiliensis (201)
Seriola brasilienses var. *parviflora* (206)
Seriola petiolaris (209)
Seriola tweediei (201)
Serratula acutifolia (222)
Solidago linearifolia (304)
Solidago linearifolia var. *brachypoda* (304)
Solidago microglossa var. *linearifolia* (304)
Soliva acaulis (308)
Soliva alata (307)
Soliva anthemifolia var. *acaulis* (308)
Soliva barclayana (307)
Soliva lusitanica (308)
Soliva nasturtiifolia (308)
Soliva pterosperma (307)
Soliva sessilis (307)
Soliva tenella (117)
Soliva urbica (308)
Sonchus agrestis (128)
Sonchus brasiliensis (128)
Sonchus occidentalis (128)
Sonchus oleraceus var. *asper* (310)
Spilanthes affinis (8)
Spilanthes americana var. *stolonifera* (7)
Spilanthes americana var. *stolonifera f. ciliatifolia* (8)
Spilanthes americana var. *stolonifera f. longiinternodiata* (9)
Spilanthes arnicoides (6)
Spilanthes arnicoides f. setosa (6)
Spilanthes arnicoides var. *intermedia* (6)
Spilanthes arnicoides var. *macropoda* (7)
Spilanthes bellidioides (6)
Spilanthes blepharicarpa (6)
Spilanthes decumbens (7)
Spilanthes decumbens var. *macropoda* (7)
Spilanthes doronicoides (6)
Spilanthes ecliptoides (215)
Spilanthes eurycarena (8)
Spilanthes grandis (6)
Spilanthes grisea var. *intermedia* (6)
Spilanthes grisea var. *micra* (6)
Spilanthes grisea var. *setosa* (6)
Spilanthes helenioides (7)
Spilanthes karvinskiana (215)
Spilanthes longifolia (6)
Spilanthes macropoda (7)
Spilanthes mariannae (215)
Spilanthes micralloeophylla (8)
Spilanthes pusilla (9)
Spilanthes sessilifolia (215)
Spilanthes sphaerocephala (6)
Spilanthes stolonifera (7)
Spilanthes stolonifera var. *pusilla* (9)
Spilanthes wedelioides (124)
Stephananthus junceus (40)
Stevia aristata var. *typica* (313)
Stevia hirsuta (314)
Stevia laxa (314)
Stevia megapotamica (314)
Stevia multiaristata (315)
Stevia multiaristata var. *patagonica* (316)
Stevia polycephala (313)
Stevia satureiifolia var. *angustifolia* (315)
Stevia satureiifolia var. *genuina* (315)
Stevia satureiifolia var. *laxa* (314)
Stevia satureiifolia var. *multiaristata* (314)
Stevia violacea (314)
Strongylosperma australe (117)
Symphyotrichum graminifolium (24)
Symphyotrichum graminifolium (25)
Tagetes belenidium (329)
Tagetes bonariensis (319)
Tagetes glandulifera (319)
Tagetes glandulosa (319)
Tagetes porophyllum (319)
Taraxacum dens-leonis (324)
Taraxacum erythrospermum (323)
Taraxacum vulgare (324)
Tessaria absinthioides var. *ambigua* 327)
Tessaria ambigua (327)
Tessaria dentata (326)
Tessaria integrifolia var. *polyandra* (327)
Tessaria legitima (326)
Thelesperma scabiosoides (328)
Thymophylla belenidium (329)
Thymophylla gracilis (329)
Thymophylla thurberi (329)
Thyrsanthema ebracteata (94)
Thyrsanthema nutans (94)
Tragopogon fritillarioides (251)
Tragopogon majos (330)
Tragopogon picroides (337)
Trichocline heterophylla (121)
Tripolium conspicuum (24)
Tripolium moelleri (24)
Tripolium oliganthum (24)
Tripolium subulatum var. *brasilianum* (24)
Trixis brasiliensis (195)
Trixis brasiliensis var. *genuina* (195)
Trixis brasiliensis var. *sellowii* (195)
Trixis flexuosa (336)
Trixis glaberrima (335)
Trixis glabrata (335)
Trixis hieracioides (196)
Trixis megapotamica (335)
Trixis missionum (336)
Trixis mollissima (336)
Trixis ochroleuca (195)
Trixis ochroleuca (196)
Trixis ochroleuca f. pusilla (196)
Trixis ochroleuca f. robusta (196)
Trixis ochroleuca f. subintegra (196)
Trixis ochroleuca var. *hieracioides* (196)
Trixis ochroleuca var. *thrincioides* (196)
Trixis othonoides (195)
Trixis rosea (335)
Trixis sellowii (195)
Trixis sonchoides (196)
Trixis stricta (121)
Trixis stricta (335)
Trixis suaveolens (335)
Trixis thrincioides (196)
Trixis verbasciformis (335)
Trixis verbasciformis var. *glaberrima* (335)
Trixis verbasciformis var. *intermedia* (335)
Tussilago exscapa (91)
Tussilago integerrima (93)
Tussilago lyrata (94)
Tussilago nutans (94)
Tussilago sarmentosa (99)
Tussilago sinuata (95)
Tussilago vaccina (94)
Urolepis hecatantha (137)
Verbescina brasiliana (11)
Verbesina alba (126)
Verbesina auriculata (339)
Verbesina australis (338)
Verbesina conyzoides (126)
Verbesina heterosperma (339)
Verbesina megapotamica (125)
Verbesina prostrata (126)
Verbesina scabra (338)
Vermifuga corymbosa (151)
Vernonia arechavaletae (344)
Vernonia gochnatioides (344)
Vernonia inmunis (342)
Vernonia intermedia (347)
Vernonia linearis (347)
Vernonia lingua (340)
Vernonia mollissima var. *microcephala* (343)
Vernonia montevidensis (341)
Vernonia nitidula var. *acutifolia* (344)
Vernonia oreophila (340)
Vernonia rubricaulis var. *australis* (346)
Vernonia rubricaulis var. *pseudoincana* (346)
Vernonia salicifolia (347)
Vernonia sororia (348)
Vernonia spegazzinii (340)
Viguiera stenophylla (350)
Vittadinia multifida (62)
Vittadinia trifurcata (225)
Wedelia buphtalmiflora (356)
Wedelia chrysostephana (351)
Wedelia copiapana (351)
Wedelia ecliptaefolia (351)
Wedelia pascalioides (22)
Wedelia silphioides (23)
Wiborgia acmella (157)
Wiborgia oblongifolia (126)
Wiborgia parviflora (157)
Willoughbya cordifolia (230)
Wollastonia prostrata (124)
Xanthium australe (353)
Xeranthemum cespitosum (99)
Ximenesia encelioides (338)
Ximenesia microptera (338)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amaral Franco, J. M. A. do. 1976a. Carduus. En T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burgess, D.M. Moore, R.H. Valentine, S. M. Walters & D. A. Webb (eds.), Fl. *Europea* 4: 220-232.

—. 1976b. Onopordum. En T. G. Tutin, V. H. Heywood, N. A. Burgess, D. M. Moore, R. H. Valentine, S. M. Walters & D. A. Webb (eds.), Fl. *Europea* 4: 244-248.

Amat, A. G. 1985. *Matricaria matricarioides* (Less.) Porter (Compositae, Anthemideae) adventicia en la provincia de Buenos Aires. Notas Mus. La Plata, *Bot.* 21: 1-4.

Ariza Espinar, L. 1967a. Las especies de Tagetes (Compositae) de la región central argentina. *Kurtziana* 4: 51-71.

—. 1967b. Contribución al conocimiento de las Compuestas Adventicias en la Argentina. *Kurtziana* 4: 73-82.

—. 1973. Las especies de Baccharis (Compositae) de Argentina Central. *Bol. Acad. Nac. Ci.* 50: 175-305.

__. 1979. Contribución al conocimiento del género Tessaria (Compositae). *Kurtziana* 12-13: 47-62.

—. 1982a. *Conyza albida* (Compositae) en la Argentina. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 21: 269-271.

—. 1982b. Notas sobre Compositae Argentinas II. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 20: 267-270.

—. 1993a. Nota sobre las especies argentinas de Helenium (Asteraceae). *Kurtziana* 22: 107-108.

—. 1993b. Notas críticas y novedades en Compuestas centroargentinas. *Kurtziana* 22: 103-106.

—. 1994. Familia Asteraceae: I.Tribu Vernonieae, II. Tribu Eupatorieae. Prodromo de Fl. *Fanerog. de Argentina Central*: 1-65.

—. 1997. Tribu VII. Anthemideae. En A.T. Hunziker (ed.), *Flora Fanerogámica Argentina* 46: 3-35.

—. & **G. Delucchi.** 1998a. Tribu X. Arctoteae. En A.T. Hunziker (ed.), *Flora Fanerogámica Argentina* 59: 1-6.

—. & —. 1998b. Tribu XI. Cardueae. En A.T. Hunziker (ed.), Flora Fanerogámica Argentina 60: 1-26.

—. & **E. Urtubey**. 1998. Asteraceae. Tribu XIII Lactuceae (excepto Hypochoeris y Hieracium). *Flora Fanerogámica Argentina* 61: 1-30.

Barroso, G. M. 1976. Compositae-Subtribo Baccharidinae Hoffmann. Estudo das espécies ocorrentes no Brasil. *Rodriguésia* 28: 3-273.

Bártoli, A. & R. D. Tortosa. 1994. Tres nuevas especies de Grindelia (Asteraceae) afines a *G. chiloenis* (Corn.) Cabrera. *Kurtziana* 23: 131-150.

—.& —. 1999. Revisión de las especies sudamericanas de Grindelia (Asteraceae: Astereae) *Kurtziana* 27 (2): 327-359.

—. & **G. G. Roitman**. 1990. Novedades sobre Compuestas Argentinas II. *Darwiniana* 30 (1-4): 281-282.

Belcher, R. O. 1956. A revision of the genus Erechtites (Compositae), with inquires into Senecio and Arrhenechthites. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 43: 1-85.

Biddulph, S. F. 1944. A revision of the genus Gaillardia. *Res. Stud. State Coll. Wash.* 12: 195-256.

Bierner, M. W. 1987. Taxonomy of Helenium Sect. Actinea (Asteraceae). *Sida* 12: 253-271.

— & **Cabrera, A. L.** 1986. Novedades para la Flora de Jujuy. *Darwiniana* 27: 1-8.

Bremer, K. & C. J. Humphries. 1993. Generic monograph of the Asteraceae-Anthemideae. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), *Bot.* 23: 71-177.

Burkart, A. 1944. Estudio del género de Compuestas Chaptalia, con especial referencia a las especies argentinas. *Darwiniana* 6: 505-594.

Cabrera, A. L. 1931. Revisión de las especies sudamericanas del género Grindelia. *Revista Mus. La Plata*, Sec. *Bot.* 33: 207-249.

—. 1932. Compuestas nuevas de la República Argentina. Notas Prelim. Mus. La Plata 1: 323-332.

—. 1934. Las especies argentinas del género Haplopappus. Notas Prelim. Mus. La Plata 2: 233-257.

—. 1935. Notas sobre los Senecio sudamericanos III. Notas Mus. La Plata, *Bot.* 1: 91-112.

—. 1936. Las especies argentinas y uruguayas del género Trixis. *Revista Mus. La Plata*, Secc. *Bot.* 2: 31-86.

—. 1937. Compuestas argentinas nuevas o interesantes. Notas Mus. La Plata, *Bot.* 2: 171-204.

—. 1939. Las especies tucumanas del género Senecio (Compositae). *Lilloa* 15: 65-120.

—. 1941. Compuestas bonaerenses. Revisión de las Compuestas de la Provincia de Buenos Aires, la Capital Federal y la Isla Martín García. *Revista Mus. La Plata*, Secc. *Bot.* 4: 1-450.

—. 1944. Compuestas sudamericanas nuevas o críticas. Notas Mus. La Plata, *Bot.* 9: 243-259.

—. 1946. El género Hysterionica en el Uruguay y en la República Argentina. Notas Mus. La Plata, *Bot.* 11: 349-358.

—. 1949a. El género Senecio en Chile. *Lilloa* 15: 27-501.

—. 1949b. Sinopsis del género Soliva (Compositae). Notas Mus. La Plata, Bot. 14 *Bot.* 70: 123-139.

—. 1951. Notas sobre Compuestas de la América Austral. *Darwiniana* 9: 363-386.

—. 1953. Las especies del género Pamphalea (Compositae). Notas Mus. La Plata, *Bot.* 16: 225-237.

—. 1957. El género Senecio (Compositae) en Brasil, Paraguay, Uruguay. *Arch. Jar. Bot. Rio de Janeiro* 15: 163-269.

—. 1961. Observaciones sobre las Inuleae-Gnaphalineae (Compositae) de América del Sur. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 9: 359-386.

—. 1963. Compositae. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 4(6a): 1-443.

—. 1965. Revisión del género Mutisia (Compositae). *Opera Lilloana* 13: 5-227.

—. 1968. Rehabilitación del género Holocheilus Cassini (Compositae). *Revista Mus. La Plata*, Secc. *Bot.* 11: 1-15.

—. 1971. Compositae. En M. N. Correa (ed.), Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 8(7): 1-451.

—. 1974. Compositae. En A. Burkart (ed.), Fl. Il. Entre Ríos, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 6(6a): 106-554.

—. 1976. Materiales para una revisión del género Hypochoeris I. *Hypochoeris chillensis* (H.B.K.) Hieron. *Darwiniana* 20: 312-322.

—. 1978. Compositae. En A. L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Jujuy, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 13(10):1-726.

—. 1985. El género Senecio (Compositae) en Bolivia. *Darwiniana* 26: 79-217.

—. 1991 (1989). Compostas. Tribo: Eupatorieae. En R. Reitz (ed.) Fl. Il. Catarinense Monografía Comp. pp. 415-760.

—. 1996. Compositae III Asteroideae, Eupatorieae (excepto Mikania) En. R. Spichiger & L. Ramella (ed.) Flora del Paraguay 25: 8-349.

—. 1997. Una nueva especie de Vernonia (Compositae) del este de Salta, Argentina. *Hickenia* 2: 255-256.

—. & **Fabris, H. A.** 1958. Una Centaurea nueva para la Argentina. *Revista Argent. Agron.* 25: 45-46.

—. & **Freire, S. E.** 1997. Eupatorieae (excepto Mikania). En A.T. Hunziker (ed.), *Flora Fanerogámica Argentina* 47(8): 3-54, 76-104.

—. & **A. M. Ragonese.** 1978. Revisión del género Pterocaulon (Compositae). *Darwiniana* 21: 185-257.

Brachyclados megalanthus ???

—. & **N. Vittet**. 1954. Catálogo de las Eupatorieas argentinas (Compositae). *Revista Mus. La Plata*, Secc. *Bot.* 8: 179-263.

—. & —. 1963. Compositae Catharinenses II. Eupatorieae. *Sellowia* 15: 149-258.

—. & **Zardini, E. M.** 1978. Manual de la Flora de los alrededores de Buenos Aires. Ed. Acme. Buenos Aires.

—. & —. 1980. Sinopsis preliminar de las especies argenti-

nas del género Senecio (Compositae). *Darwiniana* 22: 427-491.

Caro, J. A. 1961. Las especies de Cotula (Compositae) del centro de la República Argentina. *Kurtziana* 1: 289-298.

Cerana, M. M. 1997. Mikania. En A. T.Hunziker (ed.) *Flora Fanerogámica Argentina* 47: 54-76.

Covas, G. 1965. Catálogo de las plantas naturalizadas o adventicias en La Pampa. Apuntes Fl. Pampa 16: 63-64.

Correa, R.F. & G. Delucchi. 1997. Análisis comparativo de las plantas adventicias de valor económico en la provincia de Buenos Aires. Actas Etnobotánicas 92(1): 403-414.

Del Aguila, J. 1964. Las cardos y abrepuños de La Pampa. Apuntes Fl. *Pampa* 5: 17-20.

Delucchi, G. & R. F. Correa. 1992. Las especies vegetales amenazadas en la provincia de Buenos Aires. Situación ambiental de la provincia de Buenos Aires 2(14): 1-39. CIC.

Delucchi, G. & L. Ariza Espinar. 1997. Asteraceae: tribu IX Calenduleae. En A.T. Hunziker (ed.), *Flora Fanerogámica Argentina* 48: 2-4.

Dimitri, M.J. & E. N. Orfila. 1986. Acerca del nuevo taxon Flaveria haumanii Dim et Orf. (Compositae) de la flora argentina. *Sociedad Científica Argentina*: 1-13.

Dostál, J. 1976a. Acroptilon. En T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burgess, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & D.A. Webb (eds.), *Flora Europea* 4: 254.

—. 1976b. Centaurea. En Tutin, T.G., V.H. Heywood, N.A. Burgess, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & D.A. Webb (eds.), *Flora Europea* 4: 254-301.

Ezcurra, C. 1985. Revisión del género Chuquiraga (Compositae- Mutisieae). *Darwiniana* 26: 219-284.

—. 1996. Chuquiraga. En A.T. Hunziker (ed.), *Flora Fanerogámica Argentina* 31: 5-13.

Ferraro, M. 1955. Las especies argentinas del género Tagetes (Compositae). *Bol. Soc. Argent. Bot.* 6: 30-39.

FontQuer, P. 1993. Plantas Medicinales. El Dioscórides Renovado. Tomo III. Ed Labor.

Freire, S. E. 1986. Revisión del género Lucilia (Compositae, Inuleae). *Darwiniana* 27: 431-490.

—. 1996. Mutisieae, Gochnatiinae (excepto Gochnatia). En A.T. Hunziker (ed.), *Flora Fanerogámica Argentina* 28: 3-17.

—. 1997. Notas críticas en la tribu Inuleae (Compositae) para la Flora del Paraguay. Candollea 52: 214-215.

—. 1998. Compositae. En R. Spichiger & Ramella (eds.). Flora del Paraguay 27: 9-100.

—. & **L. Iharlegui, L.** 1997. Sinopsis preliminar del género Gamochaeta (Asteraceae, Gnaphalieae). *Bol. Soc. Argent. Bot.* 33: 23-35.

Giangualani, R. A. 1976. Las especies argentinas del género Achyrocline (Compositae). Darwiniana 20: 549-576.

Grau, H. R. J. 1975. Podocoma und Vittadinia-Zwei vermeintlich Bikontinentale Gattungen. Mitt. Bot. Staatssamml. *München* 12: 181-194.

Hauman, L. L. 1925. Les phanérogames adventices de la flore Argentine. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 33: 319-345.

Heiser, C. B. 1945. A revision of the genus Schkuhria. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 32: 265-278.

Hicken, C. M. 1910. *Chloris platensis* Argentina. Apuntes Hist. Nat. 9: 1-292.

Holmes, W. C. 1993. Mikania (Compositae) of the United States. *Sida* 9: 147-158.

—. **& McDaniel**. 1996. Compositae III . Mikania. En R. Spichiger & L. Ramella (eds.), *Fl. Paraguay* 25: 208-271.

Holmgren, P. K., N. H. Holmgren & L. C. Barnett. 1990. Index Herbariorum. Part I: The Herbaria of the World. New York: New York Botanical Garden

Ibarra, F. E. & J. S. La Porte. 1944. *Centaurea repens*, invasora de cultivos en la República Argentina. *Revista Argent. Agron.* 11: 287-293.

Jansen, R. K. 1985. The systematics of Acmella (Asteraceae-Heliantheae). Syst. Bot. Monogr. 8: 1-115.

Katinas, L. 1994. Un nuevo género de Nassauvinae (Asteraceae, Mutisieae) y sus relaciones cladísticas con los géneros afines de la subtribu. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 30: 59-70.

—. 1995. Asteraceae, parte 1. Tribu XII. Mutisieae. Subtribu 4. Nassauviinae. En A.T. Hunziker (ed.), *Flora Fanerogámica Argentina* 13: 5-54.

—. 1996a. 280. Asteraceae, parte 4. Tribu XII. Mutisieae. Subtribu 3. Mutisiinae. En A.T. Hunziker (ed.), *Flora Fanerogámica Argentina* 29: 3-40.

—. 1996b. Revisión de las especies sudamericanas del género Trixis (Asteraceae, Mutisieae). *Darwiniana* 34: 27-108.

Kazmi, S. M. A. 1964. Revision der Gattung Carduus (Compositae). *Mitt. Bot. Staatssamml. München* 5: 279-550.

Lourteig, A. & J. Cuatrecasas. 1985. Nomenclatura Plantarum Americanarum III. Compositae. *Phytologia* 58(7): 475.

Marzocca, A. 1997. Vademécum de Malezas Medicinales de la Argentina Indígenas y Exóticas. Orientación Gráfica Editoras S.R.L. Buenos Aires. 363 pp.

Meikle, R. B. 1976. Calendula. En T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burgess, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & D.A. Webb (eds.), *Fl. Europea* 4: 206-207.

Montes, L., J. C. Cerono & M. Nuciari. 1993. Bidens aurea (Asteraceae: Heliantheae): Adventive cytotypes in Argentina. *Phytologia* 75: 192-198.

Moore, D. M. 1983. Flora of Tierra del Fuego 1-396. A. Nelson-Missouri Botanical Garden. England-USA.

Moore, R. J. & C. Frankton. 1974. The thistles of Canada. Res. Branch, Dept. Agric. Monogr. 10: 1-111.

Nesom, G. L. 1990. Taxonomic status of Gamochaeta (Asteraceae-Inuleae) and the species of the United States. *Phytologia* 68: 186-198.

—. 1994a. Taxonomic overview of Podocoma (Asteraceae-Astereae) with the incorporation of two species from Conyza. *Phytologia* 76: 106-114.

—. 1994b. Review of the taxonomy of Aster sensu lato (Asteraceae, Astereae), emphasizing the new world species. *Phytologia* 76: 141-297.

Novara, L. J. 1993. Asteraceae, Cardueae. Flora del Valle de Lerma. Aportes Bot. Salta, sér. *Flora* 2(2): 1-13.

Parker, K. F. 1962. The South American species of Hymenoxys (Compositae). *Leafl. W. Bot.* 9: 197-209.

Parodi, L. R. 1926. Las malezas de los cultivos en el Partido de Pergamino, con un estudio de los cuerpos extraños del lino y del trigo. *Revista Fac. Agron. Veterin.* 5: 75-171.

—. 1930. Ensayo fitogeográfico sobre el partido de Pergamino. Estudio de la pradera pampeana en el norte de la provincia de Buenos Aires. *Revista Fac. Agr. Vet. Buenos Aires* 7: 65-271.

—. 1956. Una nueva maleza en los campos bonaerenses. *Revista Argent. Agron.* 23: 132-137.

Petenatti, E. M. & L. Ariza Espinar. 1997. Asteraceae, parte 6. Tribu VI Helenieae. En A. T. Hunziker (ed.) *Flora Fanerogámica Argentina* 45: 3-35.

Powell, A. M. 1978. Systematics of Flaveria (Flaveriinae-Asteraceae). *Ann. Missouri Bot. Gard.* 65: 590-636.

Pruski, J. F. 1998. Compositae of the Guayana Highland. XIII. New combinations in Conyza (Astereae), Proxelis (Eupatorieae) and Riencourtia (Heliantheae) based on names proposed by L.C.M. Richard. *Brittonia* 50(4): 473-482.

Robinson, B.L. 1930a. Records preliminary to a general treatment of the Eupatorieae. VIII. *Contr. Gary Herb.* 90: 3-36.

—. 1930b. The Stevias of the Argentine Republic. *Contr. Gray Herb.* 90: 58-79.

—. 1933. Taxonomic notes on several South American

Eupatoriums. *Ostenia* pp. 349-358.
—. 1934. Records preliminary to a general treatment of the Eupatorieae. *XI. Contr. Gray Herb.* 104: 3-49.
Roig, F. A. 1971. Compuestas, flora y vegetación de la Reserva Forestal de Ñacuñan. *Deserta* 1: 171-199.
Ruiz Leal, R. A. & F. A. Roig. 1961. Malezas y plantas adventicias nuevas para la Provincia de Mendoza- *I. Bol. Soc. Argent. Bot.* 9: 151-171.
Sáenz, A. A. 1979. El género Viguiera (Compositae) en la Argentina. *Darwiniana* 22: 45-66.
—. 1996. Compositae. En H.B. Lahitte & J.A. Hurrell (dirs.) Plantas hidrófilas de la Isla Martín García (Buenos Aires, República Argentina). CIC (Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires), Serie Informe Nro. 52: 196-216.
— & **G. Delucchi**. Inéd. El género Cosmos (Asteraceae-Heliantheae) en la Argentina.
Sala, C. A., A. M. Echarte & R. Rodríguez. 1990. Una nueva especie de Helianthus (Compositae) para la flora argentina. *Darwiniana* 30: 293-295.
Simpson Vuilleumier, B. B. 1969. The systematics and evolution of *Perezia sect.* Perezia (Compositae). *Contr. Gray Herb.* 199: 1-163.
Sleumer, H.O. 1956. Die Hieracien Argentiniens unter Berucksichtigung der Nachbarlander. *Bot. Jahrb. Syst.* 77: 85-148.
Solbrig, O.T. 1966. The South American species of Gutierrezia. *Contr. Gray Herb.* 197: 3-42.
Strother, J. L. 1969. Systematics of *Dyssodia cavanilles* (Compositae: Tageteae). Univ. Calif. *Publ. Bot.* 48: 1-88.
—. 1986. Renovation of Dyssodia (Compositae: Tageteae). *Sida* 11: 371-378.
Tortosa, R. D. & D. Medan. 1977. Chondrilla L. (Compositae) nuevo género para la Argentina. *Darwiniana* 21: 115-119
Troiani, H. O. 1984. Heliánteas (Heliantheas) pampeanas. Apuntes *Fl. Pampa* 89-92: 353-367.
—. 1985. Las especies de Baccharis (Compositae) de la Provincia de La Pampa. *Revista Fac. Agron.* Univ. Nac. La Pampa 1: 35-80.
—. & **P.H. Steibel**. 1999. Sinopsis de las Compuestas (Compositae Giseke) de la provincia de La Pampa, Rep. Argentina. *Rev. Fac. Agronomía* 10. Supl. 1: 1-90.
Urtubey, E. 1996. Subtribu Barnadesiinae (excepto género Chuquiraga). En A.T. Hunziker (ed.), *Flora Fanerogámica Argentina* 31: 3-4; 14-24.
Villamil, C. B. & M. A. Long. 1999. *Crepis vesicaria* (Asteraceae) Nueva cita para la Argentina. *Hickenia* 3 (6): 12-20.
Webb, C. J., W. R. Sykes & P. J. Garnock-Jones. 1988. Flora of New Zealand IV. Naturalised Pteridophytes, Gymnosperms, Dicotyledons. *Christchurch*, 1-1365.
Xifreda, C. C. 1985. Sobre el nombre científico correcto de la manzanilla (*Matricaria recutita* L., Asteraceae). *Darwiniana* 26: 373-375.
Zardini, E. M. 1975. Revisión del género Trichocline (Compositae). *Darwiniana* 19: 618-733.
—. 1984a. Etnobotánica de Compuestas Argentinas con Especial Referencia a su Uso Farmacológico. Acta Fam. Bonaerense 3(1): 77-99.
—. 1984b. Etnobotánica de Compuestas Argentinas con Especial Referencia a su Uso Farmacológico. Acta Fam. Bonaerense 3(2): 169-194.
—. 1985. Revisión del género Noticastrum (Compositae - Asteraceae). *Revista Mus. La Plata*, sec. *Bot.* 86, 13: 313-424.
Zuloaga, F. O. & O. Morrone (Eds.) 1999. Catálogo de las plantas vasculares de la República Argentina II. vol. 1: 98-353 (Asteraceae). Monographs of Systematic Botany from the Museum Botanical Garden No. 74.

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL

Provincia de Buenos Aires

Calle 12 e/ 53 y 54. Torre 11 - Piso 14. Tel. (0054221) 4295524/5548. Telefax: 429-5567
1900 La Plata . Provincia de Buenos Aires, Argentina